



2025\٩\٩	التاريخ:		الاسم:
15	العلامة:	الكيمياء	المادة:
عشر دقائق	مدة الامتحان:	12-أكاديمي	الصف:

يحتوي هذا الاختبار على 15 فقرات اختيار من متعدد، عدد الصفحات 3

اختر رمز الإجابة الصحيحة :

1- يتناسب ضغط كمية محددة من غاز طرديا مع درجة حرارته المطلقة عند ثبات حجمه تتفق هذه العبارة مع قانون:

(أ) بويل (ب) جاي لوساك (ج) شارل (د) أفوجادرو

2- أحد الجمل الآتية صحيحة في ما يتعلق بتفسير نظرية الحركة الجزيئية لقانون جاي - لوساك:

(أ) تقليل درجة حرارة الغاز تؤدي إلى تقليل سرعة وتصادم جزيئاته مما يقلل من ضغطه عند ثبات حجمه.

(ب) زيادة درجة حرارة الغاز تؤدي إلى زيادة ضغطه عند تغير حجمه.

(ج) زيادة درجة حرارة الغاز تزيد من ضغطه بثبات الحجم فيقترب سلوكه من سلوك الغاز المثالي.

(د) ينطبق قانون جاي - لوساك على الغاز غير محصور.

3- إذا كان ضغط غاز محصور عند درجة حرارة 300K فكم يكون الضغط عند درجة حرارة 450K مع ثبات الحجم:

(أ) 150kPa (ب) 120kPa (ج) 75kPa (د) 200kPa

4- إذا تم تسخين غاز في وعاء مغلق من 27°C إلى 127°C وكان الضغط الأولى 1 atm فإن الضغط النهائي بوحدة atm

(أ) 1.25 (ب) 1.33 (ج) 1.5 (د) 2

5- كتلة معينة من الهواء حجمها 6 لتر وضغطها 1 atm اذا انخفض الضغط الى 0.25 atm وأصبحت درجة حرارتها المطلقة مثل درجة حرارتها الأصلية فإن حجمها يصبح:

- (ا) مثلي الحجم الأصلي
(ب) 4 أمثال الحجم الأصلي
(ج) نصف الحجم الأصلي
(د) 8 أمثال الحجم الأصلي

6- اسطوانة تحتوي على عينة من غاز محصور حجمه (V) سخن من درجة حرارة 25°C الى 150°C فإن إحدى الخصائص تبقى ثابتة:

- (ا) متوسط سرعة جزيئات الغاز
(ب) ضغط الغاز
(ج) متوسط الطاقة الحرارية للجزيئات
(د) حجم الغاز

7- زجاجة مكمة الإغلاق تحتوي على غاز الهيليوم ودرجة حرارتها 20°C غمرت الزجاجة في حمام مائي متواجدة إحدى العبارات الآتية غير صحيحة:

- (ا) يقل ضغط الغاز
(ب) يزداد حجم الغاز

(ج) يقل متوسط الطاقة الحرارية لجزيئات الغاز
(د) يقل عدد التصادمات وتقل قوتها مع جدار الزجاجة

8- عند ثبوت درجة الحرارة إذا انخفض حجم الغاز إلى النصف فإن ضغط الغاز:

- (ا) ينخفض إلى النصف
(ب) يتضاعف
(ج) يبقى ثابتا
(د) يقل إلى الربع

9- عينة من غاز محصورة في وعاء مغلق عند ضغط 2 atm وحجم 0.4 L إذا تم تقليل الحجم إلى النصف مع بقاء درجة الحرارة ثابتة فإن الضغط الجديد للغاز (atm) :

- (ا) 1
(ب) 2
(ج) 4
(د) 8

10- إذا تضاعف الضغط المؤثر على غاز مثالي وللحفاظ على درجة حرارة ثابتة فإن الحجم:

- (ا) يزداد إلىضعف
(ب) ينخفض إلى النصف
(ج) يبقى ثابتا
(د) ينخفض إلى الربع

11- عند خفض حجم عينة غازية مع بقاء درجة الحرارة ثابتة فإن عدد التصادمات بين الجزيئات وجدران الوعاء.

- (ا) يزداد
(ب) يقل
(ج) يبقى ثابت
(د) يعتمد على نوع الغاز

12- إذا كان ضغط عينة من الغاز يساوي 0.3 atm عند درجة حرارة 0°C فحتى يصبح ضغط العينة 0.6 atm يجب أن ترتفع درجة حرارتها بمقدار يساوي:

- (ا) 273°C
(ب) 173°C
(ج) 100°C
(د) 546°C

13- عينة غاز نسبه حجمها إلى درجة حرارتها المطلقة تساوي 0.01 فإن درجة الحرارة (C) لهذه العينة عندما يكون حجمها 5L تساوي:

- د) 773 ج) 500 ب) 227 أ) 273
-
-
-

14- ينفخ غواص وهو على عمق 10m تحت الماء فقاعة هواء حجمها 0.75L وعندما ارتفعت فقاعة الهواء إلى السطح تغير ضغطها من 2.25atm إلى 1.03atm فإن حجم فقاعة الهواء على السطح بوحدة L يساوي:

- د) 1.64 ج) 1.68 ب) 0.77 أ) 0.34
-
-
-

15- ينص قانون بويل على أن.

- أ) الحجم يتتناسب طرديا مع درجة الحرارة عند ثبات الضغط.
ب) الضغط يتتناسب طرديا مع درجة الحرارة عند ثبات الحجم.
ج) الحجم يتتناسب عكسياً مع الضغط عند ثبات الحرارة.
د) الحجم يتتناسب عكسياً مع درجة الحرارة عند ثبات الضغط.

انتهت الاسئلة مع تمنياتي لكم بالنجاح
معلمتمكم: دانا الطرابيشي