



الرياضيات

الصف التاسع - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الثاني

9

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

هبه ماهر التميمي إبراهيم أحمد عميرة أيمن ناصر صندوقه

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:

โทรศัพthing 06-5376262 / 237 البريد الإلكتروني 06-5376266 P.O.Box: 2088 Amman 11941

الصف التاسع - كتاب الطالب

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (8/2022)، تاريخ 15/12/2022 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (131/2022)، تاريخ 28/12/2022 م، بدءاً من العام الدراسي 2022 / 2023 م.

© HarperCollins Publishers Limited 2022.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 407 - 1

المملكة الأردنية الهاشمية

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(2023/2/783)

373.19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

كتاب الطالب: الصف التاسع: الفصل الدراسي الثاني / المركز الوطني لتطوير المناهج. - عمان: المركز، 2023
(174) ص.

ر.إ.: 2023/2/783

الواصفات: / الرياضيات / / الكتب الدراسية / / أساليب التدريس / / التعليم الإعدادي /

يتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مُصنفه، ولا يُعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

2022 هـ / 1443 م

2023 م - 2024 م

الطبعة الأولى (التجريبية)

أعيدت طباعته

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسلیحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معييناً على الارتقاء بمستوى الطلبة المعرفي، ومجاراة الأقران في الدول المتقدمة. ولمّا كانت الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية التي تُنمّي لدى الطلبة مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فقد أُولى المركز هذا المبحث عنايةً كبيرةً، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المُتبعة عالمياً على أيدي خبرات أردنية؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبية لاحتياجات طلبتنا.

روعى في إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بصورة سلسة، ضمن سياقات حياتية شائقة، تزيد رغبة الطلبة في التعلم، ووظفت فيها التكنولوجيا لتسهيل في جعل الطلبة أكثر تفاعلاً مع المفاهيم المقدمة لهم.

احتوى هذا الكتاب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلم الطلبة المفاهيم والمهارات الواردة فيها وإثرائها. ولأنَّ التدرب المكثف على حل المسائل يُعدُّ إحدى أهم طرائق ترسیخ المفاهيم الرياضية وزيادة الاتساق الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أعدَّ كتاب التمارين على نحو يُقدم للطلبة ورقة عمل في كل درس، تُحلُّ بوصفها واجباً منزلياً، أو داخل الغرفة الصحفية إنْ توافر الوقت الكافي. ولأنَّنا ندرك جيداً حرص الكوادر التعليمية الأردنية على تقديم أفضل ما لديها للطلبة؛ فقد جاء كتاب التمارين أداةً مساعدةً توفر عليها جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

من المعلوم أنَّ الأرقام العربية تُستخدم في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية، لا سيما في شبكة الإنترنت التي أصبحت أداةً تعليميةً مُهمةً؛ لِما تزخر به من صفحات تُقدم محتوى تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً متنا على ألا يفوتنا طلبتنا أيُّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسر الهُوَّة بين طلبتنا والمحتوى الرقمي العلمي الذي ينمو بتسارع في عالم يخطو نحو التعليم الرقمي بوتيرة متسارعة.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب، نأمل أنْ ينال إعجاب أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية الأردنية، ويجعل تعليم الرياضيات وتعلمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعد بأنْ نستمر في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

الوحدة 5 العلاقات في المثلثات والنسب المثلثية

6	مشروع الوحدة: الهندسة والفن
7	الدرس 1 الأجزاء المتناسبة في المثلثات
8	معلم برمجية جيوجبرا: توسيع: مثلث القطع المنصفة
18	الدرس 2 مُنْصَفَاتُ في المُثَلَّثِ
19	نشاط مفاهيمي: القطع المتوسطة في المثلث
30	الدرس 3 القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث
31	نشاط مفاهيمي: النسب المثلثية
39	الدرس 4 النسب المثلثية
40	الدرس 5 تطبيقات النسب المثلثية
49	اختبار نهاية الوحدة

الوحدة 6 المقادير الأسيّة والمقادير الجذرية

60	مشروع الوحدة: المُجَسَّماتُ والمقادير الأسيّة والجذرية
61	الدرس 1 تبسيط المقادير الأسيّة
62	الدرس 2 العمليات على المقادير الجذرية
69	الدرس 3 حل المعادلات الجذرية
79	اختبار نهاية الوحدة

قائمة المحتويات

الوحدة 7 المقادير الجبرية النسبية

90	مشروع الوحدة: ملعب كرة القدم
91	الدرس 1 ضرب المقادير الجبرية النسبية وقسمتها
92	الدرس 2 جمع المقادير الجبرية النسبية وطرحها
101	الدرس 3 حل المعادلات النسبية
108	اختبار نهاية الوحدة
116	

الوحدة 8 الإحصاء والاحتمالات

118	مشروع الوحدة: جمع البيانات، وتنظيمها، وتحليلها
119	الدرس 1 مقاييس التشتت
120	الدرس 2 الجداول التكرارية ذات الفئات
135	الدرس 3 المدربات التكرارية
144	الدرس 4 الاحتمالات وأشكال قن
153	الدرس 5 الاحتمال الهندسي
165	اختبار نهاية الوحدة
172	

العلاقات في المثلثات والنسب المثلثية

Relationships in Triangles and Trigonometric Ratios

ما أهمية هذه الوحدة؟

المثلث هو أبسط المضلعات، لكن أضلاعه وزواياه تمتاز بخصائص فريدة جعلته أحد أكثر الأشكال الهندسية استعمالاً في التطبيقات العلمية والحياتية. فمثلاً، يستعمل المهندسون المثلثات لتصميم جسور قوية تتوزع فيها الأحمال على الأعمدة بالتساوي، ويستعملون النسب بين أطوال أضلاع المثلثات لتحديد المسافات التي يصعب قياسها بصورة مباشرة.

سأتعلم في هذه الوحدة:

- ◀ تطبيق النظريات الخاصة بالأجزاء المتناسبة في المثلث، واستعمالها لإيجاد قياسات مجهولة.
- ◀ استعمال منصّفات المثلث العمودية ومنصّفات زوايا المثلث لإيجاد قياسات مجهولة.
- ◀ إيجاد مركز مثلث، وملتقى ارتفاعاته.
- ◀ تميّز جيب الزاوية، وجيب تمامها، وظلها، بوصفها نسباً بين أضلاع مثلث قائم الزاوية، واستعمالها لإيجاد قياسات مجهولة في المثلث.

تعلّمت سابقاً:

- ✓ تحديد المثلثات المتشابهة باستعمال حالات التشابه: SAS، و SSS، و AA.
- ✓ تحديد المثلثات المتطابقة باستعمال الحالات الآتية: SSS، و SAS، و AAS، و ASA، و HL.
- ✓ توظيف نظرية فيثاغورس في إيجاد أطوال مجهولة في المثلث قائم الزاوية.
- ✓ إيجاد المسافة بين نقطتين في المستوى الإحداثي.
- ✓ استعمال تشابه المثلثات لإيجاد قياسات مجهولة.

مشروع الوحدة

الهندسة والفن

توظيف مفاهيم هندسية في عمل لوحة فنية.

فكرة المشروع



ورقة مقاسها (A3)، ألوان، أدوات هندسية.

المواد والأدوات



خطوات تنفيذ المشروع:



- 1 أرسم على الورقة مجموعة من المثلثات المختلفة، بحيث تكون مُتدللة في ما بينها، وتمتد على مساحة الورقة كله.
- 2 أختار مُثلثين من هذه المثلثات، ثم أرسم مُثلث القطع المنصفة لكلاً منهما.
- 3 أشاهد مقطع الفيديو في الرمز المجاور الذي تظهر فيه خطوات رسم الدائرة الخارجية للمثلث.
- 4 أختار مُثلثين من الشكل، ثم أرسم لكلاً منهما دائرة خارجية، مُتيّعا الخطوات الواردة في مقطع الفيديو.



- 5 أشاهد مقطع الفيديو في الرمز المجاور الذي تظهر فيه خطوات رسم الدائرة الداخلية للمثلث.
- 6 أختار مُثلثين من الشكل، ثم أرسم لكلاً منهما دائرة داخلية، مُتيّعا الخطوات الواردة في مقطع الفيديو.
- 7 أختار مُثلثاً من الشكل، ثم أرسم ارتفاعاته الثلاثة.
- 8 ألون أجزاء اللوحة بألوان مناسبة.
- 9 أختار ثلاثة مُثلثات قائمة من اللوحة، ثم أجده جميع النسب المثلثية لزواياها الحادة.

- 10 أختار مُثلثاً من اللوحة، ثم أكتب مسألة لإيجاد طول ضلع مجهول في هذا المثلث، ثم أطلب إلى زميل لي إيجاد الطول المجهول.
- 11 أختار مُثلثاً من اللوحة، ثم أكتب مسألة لإيجاد قياس زاوية حادة في هذا المثلث، ثم أطلب إلى زميل لي إيجاد قياس الزاوية المجهولة.


عرض النتائج:

أصمّ مطويةً أعرض فيها:

- خطوات عمل المشروع، والنتائج التي توصلت إليها.
- شرحاً مختصراً عن العلاقات في المثلثات التي ظهرت في اللوحة.
- معلومة إضافية عرفتها عن المثلثات في أثناء العمل في المشروع.

الدرس 1

الأجزاء المتناسبة في المثلثات Proportional Parts in Triangles



تعرف الأجزاء المتناسبة في المثلث، واستعمالها لإيجاد قياسات مجهولة.

القطعة المتناسبة في المثلث.
يُمثل الشكل المجاور بحيرة شيد فوقها الجسر \overline{CD} .
أجد طول الجسر.

فكرة الدرس




المصطلحات



مسألة اليوم



الأجزاء المتناسبة في المثلث




يُبين الشكل المجاور للمثلث ABC ، حيث $\overleftrightarrow{DE} \parallel \overleftrightarrow{BC}$ ، و \overleftrightarrow{DE} يقطع \overleftrightarrow{AB} في D ، و \overleftrightarrow{DE} في E . ما العلاقة بين ΔADE و ΔABC ؟

يمكن استكشاف هذه العلاقة عن طريق تنفيذ النشاط الهندسي الآتي.

الناسب في المثلث

نشاط هندسي

الإجراءات:



الخطوة 1: أرسم المثلث ABC مختلف الأضلاع كما في الشكل المجاور.

الخطوة 2: أقسم أحد أضلاع المثلث، وليكن \overline{AC} إلى أربعة أجزاء متساوية، ثم أستعملها لرسم قطع مستقيمة مُوازية للصلع \overline{CB} كما في الشكل المجاور.

أحلل النتائج:

1 كم مثلاً في الشكل يُشابه المثلث ABC ؟ أبُرُّ إجابتي.

2 ما علاقه طول كل قطع من القطع المستقيمة المُوازية بطول \overline{CB} ؟ أبُرُّ إجابتي.


أذكر

تعلمتُ سابقاً أنه يمكن إثبات تشابه مُثلثين باستعمال عدد من المسلمات والنظريات، مثل: التشابه بزوايا (AA)، والتشابه بثلاثة أضلاع (SSS)، والتشابه بضلعين وزاوية محصورة (SAS).

الوحدة 5

أستنتج من النشاط السابق أنه عند رسم مستقيم يوازي أحد أضلاع المثلث، ويقطع ضلعه الآخرين، فإنه يمكن إثبات أن المثلثين الناتجين متشابهان، وذلك باستعمال مسلمة الشابهة AA. وبما أن المثلثين متشابهان، فإن أطوال أضلاعهما متناسبة، وهذا يقودنا إلى النظرية الآتية.

التناسب في المثلث



نظريّة

بالكلمات: إذا وازى مستقيم ضلعاً من أضلاع مثلث، وقطع ضلعيه الآخرين، فإنه يقسمهما إلى قطع مستقيمة متناظرة أطوالها متناسبة.

بالرموز: إذا كان $\frac{BA}{CB} = \frac{DE}{CD}$, فإن $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$

أتذكّر

تنص مسلمة الشابهة بزاويتين (AA) على أنه إذا طبّقت زاويتان في مثلث آخر، فإن المثلثين متشابهان.


إثبات نظرية

الخطوة 1: أحدد المعطيات والمطلوب.

المعطيات: $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$

المطلوب: إثبات أن $\frac{BA}{CB} = \frac{DE}{CD}$

الخطوة 2: أخطّط للبرهان باتّباع الخطوات الآتية:



- أسمى الزوايا كما هو مبين في الشكل المجاور.
- استعمل مسلمة الشابهة AA لإثبات أن $\Delta ACE \sim \Delta BCD$

- استعمل شابهة المثلثات وتناسب الأضلاع في المثلثات المتشابهة لإثبات التناسب المطلوب.

التناسب في المثلث (يتبع)

نظريّة

أذكّر

تعلّمتُ سابقاً أنَّه إذا فطعَ مستقيمُ مستقيمين مُتوازيَّين في المستوى نفسه، فإنَّ هذا يقودُ إلى مجموعةٍ من النظريات عن العلاقة بينَ أزواج الروايا الناتجةٍ من هذا التقاطع، مثل النظرية التي تنصُّ على أنَّ الزوايا المُتَنَاظِرَة مُنطَابِقةً.

الخطوة 3: أُبرِهنُ.

- بما أنَّ $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$ ، فإنَّ $\angle 1 \cong \angle 4$ ، و $\angle 3 \cong \angle 2$ ، وفقاً لِمُسْلَمَةِ الزاويتين المُتَنَاظِرَتَين. وبذلك، فإنَّ $\Delta ACE \sim \Delta BCD$ بحسبِ مُسْلَمَةِ التشابه (AA).
- بناءً على تعريفِ المُضْلَعاتِ المُتَشَابِهَةِ، فإنَّ $\frac{CA}{CB} = \frac{CE}{CD}$.
- بما أنَّ $CE = DE + CD$ ، فإنَّهُ يُمْكِنُ إيجادُ التَّنَاسِبِ المطلوبِ على النحوِ الآتي:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{CE}{CD}$$

تعريفُ المُضْلَعاتِ المُتَشَابِهَةِ

$$\frac{BA + CB}{CB} = \frac{DE + CD}{CD}$$

بالتعرِيفِ

$$\frac{BA}{CB} + \frac{CB}{CB} = \frac{DE}{CD} + \frac{CD}{CD}$$

توزيعِ المقامِ على البَسْطِ

$$\frac{BA}{CB} + 1 = \frac{DE}{CD} + 1$$


$$\frac{CB}{CB} = 1, \frac{CD}{CD} = 1$$

$$\frac{BA}{CB} = \frac{DE}{CD}$$

طرحِ 1 من طرفيِ المُعادلةِ

يُمْكِنُ استعمالُ نظريةِ الأجزاءِ المُتَنَاسِبَةِ في المثلثِ لإيجادِ أطوالِ قطعِ مستقيمةٍ مجهولةٍ.

مثال 1



في ΔPQR ، إذا كانَ $ST \parallel QR$ ، فإنَّ $SQ = 5$ ، $PT = 9$ ، $TR = 3$ ، فأجُد PS .

$$\frac{SQ}{PS} = \frac{TR}{PT}$$

نظريةُ الأجزاءِ المُتَنَاسِبَةِ

$$\frac{5}{x} = \frac{3}{9}$$

بالتعرِيفِ

$$\frac{5}{x} = \frac{1}{3}$$

بالتَّبَسيطِ


$$x = 15$$

باستعمالِ خاصيَّةِ الضربِ التَّبَادِلِيِّ

أفَكُرْ

هلُّ يُمْكِنُ كتابةُ التَّنَاسِبِ بطريقةٍ أخرى؟

الوحدة 5



أتحقق من فهمي


في ΔRTS ، إذا كان $RL = 5$, $RT = 9$, $WS = 6$.
 RW , فأجد $\overline{LW} \parallel \overline{TS}$

عكس نظرية التناسب في المثلث

إنَّ عكس نظرية التناسب في المثلث صحيحٌ أيضًا، وهذا ما نصُّ عليه النظرية الآتية.

عكس نظرية التناسب في المثلث

نظرية




بالكلمات: إذا قطع مستقيمٌ ضلعين في مُثلث، وقسمَهُما إلى قطعٍ مستقيمة مُتناظرةٍ أطوالُها مُتناسبةٌ، فإنَّ المستقيم يوازي الضلع الثالث للمُثلث.

بالرموز: إذا كان $\overline{BD} \parallel \overline{AE}$, فإنَّ $\frac{BA}{CB} = \frac{DE}{CD}$

إثباتُ النظرية جاء في صورة تدريب في المسألة 17.

مثال 2



في ΔQMP ، إذا كان $MN = 12$, $NP = 3$, $MR = 16$, $RQ = 4$. فاحددُ إذا كان $\overline{RN} \parallel \overline{QP}$ ، مبررًا إجابتي.

$$\frac{RQ}{MR} = \frac{4}{16}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$MR = 16, RQ = 4$$

بتعويض

بالتبسيط

$$\frac{NP}{MN} = \frac{3}{12}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$MN = 12, NP = 3$$

بتعويض


بالتبسيط

ومنْ ثمَّ، فإنَّ:

$$\frac{RQ}{MR} = \frac{NP}{MN} = \frac{1}{4}$$

إذن، وبحسب عكس نظرية التناسب في المثلث، فإنَّ $\overline{RN} \parallel \overline{QP}$.

أتحقق من فهمي




في ΔAEC ، إذا كان

$ED = 12, DC = 20, BC = 25, AB = 15$

فاحدد إذا كان $DB \parallel AE$ ، مبرراً إجابتي.

القطعة المنصفة في المثلث



القطعة المنصفة في المثلث (midsegment) هي قطعة

مستقيمة طرفاها نقطتاً متصفان بضلعين في المثلث، وفي

كل مثلث ثلاثة قطع منصفة. فمثلاً، القطع المنصفة في


المجاور ΔPQR هي:

سأستكشف في النشاط الآتي العلاقة بين أضلاع المثلث وقطعة منصفة فيه.


القطعة المنصفة في المثلث

نشاط هندسي

الإجراءات:





الخطوة 1: أرسم مثلاً قائم الزاوية، ثم أقصه، وأسمّي رؤوسه: A, B, C كما في الشكل المجاور.



الخطوة 2: في المثلث ABC ، أطوي A على C لإيجاد نقطة متصف \overline{AC} ، وأسمّيها L ، ثم أطوي B على C لإيجاد نقطة متصف \overline{BC} ، وأسمّيها N ، ثم أرسم \overline{LN} .

الخطوة 3: أطوي المثلث حول \overline{LN} ، ثم أطوي كلاً من A و B على C كما في الشكل الآتي.



الخطوة 4: أرسم مثلاً حاد الزوايا، ومثلاً منفرج الزاوية، وأكرر ما فعلته في الخطوات السابقة.

أحل النتائج:

1 ما علاقه طول \overline{LN} بطول \overline{AB} ؟ أبّر إجابتي.

2 أعطي تخميناً يختص بعلاقة القطعة المنصفة لضلعين في مثلث بالضلع الثالث فيه، مبرراً إجابتي.

3 أقارن إجابتي بإجابات زملائي.


الوحدة 5

تُوجَدُ علاقتان بين القطعة المُنَصَّفة في المُثَلَّث والضلع المُقَابِل لها، وهما مُوضَحتان في النَّظَرِيَّةِ الآتِيَّةِ.

القطعة المُنَصَّفة في المُثَلَّث

نظريَّة

بالكلمات: القطعة المُنَصَّفة في المُثَلَّث توازي الضلع المُقَابِل لها، وطُولُها يساوي نصف طول ذلك الضلع.



بالرموز: إذا كانت النقطة D والنقطة E هما نقطتاً متضarity على الترتيب، فإنّ: $DE \parallel BC$ و $DE = \frac{1}{2} AC$


أتعلَّم

تُعَدُّ نَظَرِيَّةُ الْقَطْعَةِ الْمُنَصَّفَةِ فِي الْمُثَلَّثِ حَالَةً خَاصَّةً مِنْ عَكْسِ نَظَرِيَّةِ التَّنَاسُبِ فِي الْمُثَلَّثِ.

إثبات النَّظَرِيَّةِ جاءَ فِي صُورَةِ تَدْرِيْبٍ فِي الْمَسَأَلَةِ 18.

يُمْكِنُ استِعْمَالُ نَظَرِيَّةِ الْقَطْعَةِ الْمُنَصَّفَةِ فِي الْمُثَلَّثِ لِإِيجَادِ أَطْوَالِ قِيَاسَاتِ مَجْهُولَةٍ.

مَثَلٌ 3



أَسْتَعْمَلُ الْمَعْلُومَاتِ الْمُعَطَّةَ فِي الْشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ لِإِيجَادِ كُلِّ مَا يَأْتِي:

طُولُ \overline{JL} .

$$PN = \frac{1}{2} JL$$

نظريَّةُ الْقَطْعَةِ الْمُنَصَّفَةِ فِي الْمُثَلَّثِ

$$36 = \frac{1}{2} JL$$

بِتَعْوِيْضِ $PN = 36$

$$JL = 72$$

بِالْتَّبَسيْطِ

طُولُ \overline{PM} .

2

$$PM = \frac{1}{2} LK$$

نظريَّةُ الْقَطْعَةِ الْمُنَصَّفَةِ فِي الْمُثَلَّثِ

$$= \frac{1}{2} (97)$$

بِتَعْوِيْضِ $LK = 97$

$$= 48.5$$

بِالْتَّبَسيْطِ

قياس $\angle MPN$.

3

$$\angle MPN \cong \angle JMP$$

نظرية الزاويتين المُتَبَدِّلَتَيْنِ داخلياً

$$m\angle MPN = m\angle JMP$$

تعريف تطابق الزوايا

$$= 102^\circ$$

بالتعمير

أذكّر

بما أن $\overline{PN} \parallel \overline{JL}$, فإن


$$\angle MPN \cong \angle JMP$$

لأنهما زاويتان مُتَبَدِّلَتَانِ

داخلياً.

أتحقق من فهمي

أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل المجاور لإيجاد كلّ مما يأتي:




. طول \overline{XY} (a)

. طول \overline{AX} (b)

. قياس $\angle YZC$ (c)

يمكن استعمال نظرية القطعة المنصفة في كثير من التطبيقات الحياتية.

مثال 4 : من الحياة



حديقة: يُبيّنُ الشكل المجاور مُخططاً لحديقة عامة على شكل مثلث قائم الزاوية، وفي داخلها ممراً مشاةً بحاجة إلى إعادة تبليط، هما: \overline{VW} ، \overline{TV} ، \overline{VZ} . أجد تكلفة تبليط الممررين التي ستدفعها إدارة البلدية، علمًا بأنَّ تكلفة تبليط المتر الطولي الواحد للمتر هي 12 JD.

الخطوة 1: أجد طول كلّ من الممررين.

أجد طول الممر \overline{VW} .

$$VW = \frac{1}{2} XZ$$

نظرية القطعة المنصفة في المثلث

$$= \frac{1}{2} (24)$$

بتعويض $XZ = 24$

$$= 12$$

بالتبسيط

الوحدة 5

أجد طول الممّر \overline{TV}

$$TV = \frac{1}{2} YZ$$

$$= \frac{1}{2} (18)$$

$$= 9$$

نظريّة القطعة المُنصّفة في المثلث

بتعويض $YZ = 18$

بالتبسيط

إذن، مجموع طول الممّرين معًا هو: $9 \text{ m} + 12 \text{ m} = 21 \text{ m}$


الخطوة 2: أجد التكالفة.

لإيجاد تكالفة إعادة تبليط الممّرين، أضرب تكالفة تبليط المتر الطولي الواحد في مجموع طولي الممّرين على النحو الآتي:

$$12 \times 21 = 252$$


إذن، تكالفة تبليط الممّرين التي ستدفعها إدارة البلدية هي: JD 252

اتحّق من فهمي




مروز: يبيّن الشكّل المجاور مخططاً لمنطقة من مدينة عمان على شكل مثلث قائم الزاوية. تقدُّم غدير سيارتها في هذه المنطقة أثناء توجّهها إلى عملها، وتسير على الطريق \overline{GF} والطريق \overline{FT} . أجد المسافة التي تقطعها غدير بسيارتها يوميًّا.

أتدرب وأحل المسائل




في $\triangle XYZ$ ، إذا كان $XY = 10$ ، $XM = 4$ ، $XN = 6$ ، $NZ = 9$ ، $\overline{NM} \parallel \overline{YZ}$ ، فأجد ZN .

1




في $\triangle PRS$ ، إذا كان $PR = 30$ ، $QR = 9$ ، $PT = 12$ ، $PS = 18$ ، فأحدّد إذا كان $\overline{RS} \parallel \overline{QT}$ ، مبرّزا إجابتي.

2



في ΔHJK ، إذا كان $HM = 15$, $HN = 10$, $HJ = 2JK$ ، فأُحَدِّدُ إذا كان $\overline{NJ} \parallel \overline{MK}$ مُبِرّأً إجابتي. 3



أَسْعَمُ الْمَعْلُومَاتِ الْمُعْطَاءَ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ لِإِيجَادِ كُلِّ مَا يَأْتِي:

4 GJ


5 RQ

6 RJ

7 $m\angle PQR$

8 $m\angle HGJ$

9 $m\angle GPQ$




10 JL


11 PM

12 $m\angle MPN$

أَجُدُّ قِيمَةَ x فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:




13




14

15



أَجُدُّ مَحِيطَ ΔDEF الْمُبَيَّنِ فِي الشَّكْلِ الْأَتَيِ. 16




الوحدة 5

أثبت كلاً من النظريتين الآتتين باستعمال البرهان ذي العمودين:

إذا قطع مستقيمٌ ضلعين في مثلثٍ، وقسمَهُما إلى قطعٍ مستقيمةٍ مُتناظرةٍ أطوالُها مُتناسبةٌ، فإنَّ المستقيم يوازي الضلع الثالث لل مثلثٍ. 17


القطعة المُنصفة في المثلث توازي أحد أضلاعه، وطولُها يساوي نصف طول ذلك الضلع. 18




طائرة ورقية: صنعت هديل طائرة ورقية، طول قطريها 80 cm و 60 cm، ثم استعملت شريطًا لربط نقاطٍ متصفٍ بارتفاع الطائرة. أجد طول الشريط. 19

أحل المسألة الواردة بدايةً الدرس. 20

مهارات التفكير العليا




اكتشف الخطأ: قال خالد: "بما أن $DE = \frac{1}{2} BC$ في الشكل المجاور، فإن $\overline{AD} \cong \overline{BD}$ بحسب نظرية القطعة المُنصفة في المثلث". هل ما قاله خالد صحيح؟ أبُرّر إجابتي. 21



تبير: أجد قيمة x في الشكل المجاور، مُبِّرِّرًا إجابتي. 22

تحدد: إذا كانت مساحة ΔABC هي 48 cm^2 ، وكانت النقطة D والنقطة E هما نقطتيٍ متصفٍ بارتفاع \overline{AC} و \overline{AB} على الترتيب، فأجد مساحة ΔADE ، مُبِّرِّرًا إجابتي. 23




تبير: في الشكل المجاور، إذا كانت \overline{MN} هي قطعةٍ متصفٍ في ΔABC ، فأجد ميل \overline{MN} بطريقتين مختلفتين، مُبِّرِّرًا إجابتي. 24

توسّع: مُثلث القطع المُنْصَفَةِ

Extension: Midsegment Triangle


مُثلث القطع المُنْصَفَةِ هو مُثلث ناتج من القطع المُنْصَفَةِ الثلاثِ في المُثلث. يمكن استعمال برمجية جيوجبرا لاستكشاف علاقة مساحة مُثلث القطع المُنْصَفَةِ بمساحة المُثلث الأصلي.

نشاط



أرسِمُ المُثُلَّثَ مُخْتَلَفَ الأَضْلاعِ $\triangle ABC$ فِي الْمَسْتَوِيِ الإِحْدَائِيِّ، وَذَلِكَ بِتَحْدِيدِ ثَلَاثَ نَقَاطٍ فِي الْمَسْتَوِيِ باسْتِعْمَالِ أَيْقُونَةِ منْ شَرِيطِ الْأَدَوَاتِ، ثُمَّ اخْتِيَارِ أَيْقُونَةِ منْ شَرِيطِ الْأَدَوَاتِ، ثُمَّ الضَّغْطُ بِالْمُؤَثِّرِ عَلَى مَوْلَعِ النَّقَاطِ الَّتِي تُمَثِّلُ رُؤُوسَ المُثُلَّثِ فِي الْمَسْتَوِيِ الإِحْدَائِيِّ، ثُمَّ نَقِرُ الرَّأْسِ الْأَوَّلِ لِإِغْلَاقِ الشَّكْلِ.

أَحْدُّ نَقْطَةٍ مُنْصَفِ كُلِّ ضَلَعٍ مِنْ أَضْلاعِ المُثُلَّثِ باخْتِيَارِ أَيْقُونَةِ منْ شَرِيطِ الْأَدَوَاتِ، ثُمَّ الضَّغْطُ عَلَى كُلِّ ضَلَعٍ مِنْ أَضْلاعِ المُثُلَّثِ.



أَرسِمُ مُثُلَّثَ الْقَطْعِ الْمُنْصَفَةِ، مُتَّبِعًا إِلَيْهِ إِجْرَاءَاتِ نَفْسَهَا الْوَارِدَةَ فِي الْخَطْوَةِ 1.

أَجِدُ مَسَاحَةَ $\triangle ABC$ ، وَمَسَاحَةَ مُثُلَّثِ الْقَطْعِ الْمُنْصَفَةِ باخْتِيَارِ أَيْقُونَةِ منْ شَرِيطِ الْأَدَوَاتِ، ثُمَّ النَّقِيرُ دَاخِلُ كُلِّ مُثُلَّثٍ.

أَمْلِأُ الْفَرَاغَ بِمَا هُوَ مَنْاسِبٌ فِي الْجَمْلَةِ الْآتِيَّةِ:

تُعَادِلُ مَسَاحَةُ مُثُلَّثِ الْقَطْعِ الْمُنْصَفَةِ مَسَاحَةُ $\triangle ABC$.

أَكْرِرُ الْخَطْوَاتِ السَّابِقَةَ، وَأَطْبَقُهَا عَلَى مُثُلَّثٍ حَادٍ الزَّوَالِيَّةِ، وَمُثُلَّثٍ قَائِمِ الزَّاوِيَّةِ، ثُمَّ أَدْوُنُ التَّتِيَّجَةَ الَّتِي أَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا.

أَثْبِتُ التَّتِيَّجَةَ باسْتِعْمَالِ الْبَرْهَانِ الإِحْدَائِيِّ.

1

2

3

4

5

6

7

الدرس 2

مُنْصَفَاتُ فِي الْمُثَلَّثِ Bisectors in Triangle

• تعرُّفُ نظرية المُنْصَفَاتِ العمودية لِلْمُثَلَّثِ، واستعمالُها لإيجاد قياساتِ مجهولة.

• تعرُّفُ نظرية مُنْصَفَاتِ زوايا المُثَلَّثِ، واستعمالُها لإيجاد قياساتِ مجهولة.

المُنْصَفُ العموديُّ، مركُزُ الدائرةِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْمُثَلَّثِ، مركُزُ الدائرةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْمُثَلَّثِ.



يظهرُ في الصورةِ المُجاوِرَةِ جزءٌ منْ جسْرِ كمالِ الشاعِرِ في العاصِمَةِ عُمَانَ. إِذَا كَانَتْ حَافَةُ الجسْرِ عموديَّةً عَلَى الدَّاعِمَةِ \overline{BD} ، وَكَانَ $\overline{CB} = \overline{AB}$ ، فَمَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ $AD = CD$ ؟


فكرةُ الدرس



المصطلحات



مسألةُ اليوم



المُنْصَفُ العموديُّ

المُنْصَفُ العموديُّ (perpendicular bisector)

لقطَعَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ هُوَ مُسْتَقِيمٌ عموديٌّ عَلَى الْقَطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ عَنْدَ نَقْطَةٍ مُنْصَفِهَا.


لِلْمُنْصَفِ العموديِّ بعْضُ الْخَصَائِصِ الَّتِي تُمَثِّلُهَا النَّظَرِيَّاتُ الْآتِيَّاتُ.

المُنْصَفُ العموديُّ

نظريتان

• نظرية المُنْصَفِ العموديِّ:

كُلُّ نَقْطَةٍ عَلَى الْمُنْصَفِ العموديِّ لِقَطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ تَكُونُ عَلَى بُعْدَيْنِ مُتَسَاوِيَّيْنِ مِنْ طَرَفِيِّ الْقَطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ.




مَثَلٌ: إِذَا كَانَ l مُنْصَفًا عموديًّا لـ \overline{AB} ، فَإِنَّ $AX = BX$ ، لَأَيِّ نَقْطَةٍ X عَلَى l .

أتذَكَّرُ

يشيرُ الرَّمْزُ AB إِلَى طُولِ الْقَطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ $.AB$.


• عَكْسُ نظرية المُنْصَفِ العموديِّ:

كُلُّ نَقْطَةٍ عَلَى بُعْدَيْنِ مُتَسَاوِيَّيْنِ مِنْ طَرَفِيِّ قَطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ تَقْعُدُ عَلَى الْمُنْصَفِ العموديِّ لِتَلَكَّ الْقَطْعَةِ.



مَثَلٌ: إِذَا كَانَ $AX = BX$ ، وَكَانَ l مُنْصَفًا عموديًّا لـ \overline{AB} ، فَإِنَّ X تَقْعُدُ عَلَى l .

مثال 1



أجد كلاً ممّا يأتي:

1. طول \overline{HJ} .

الخطوة 1: أجد قيمة x .

نظريّة المُنْصَفِ العموديّ

$$HJ = HK$$

$$3x + 1 = 5x - 3$$

$$x = 2$$

بالتعويض

بحلّ المعادلة لـ x

الخطوة 2: أجد طول \overline{HJ} .


$$HJ = 3(2) + 1$$

$$x = 2$$

$$= 7$$

بالتبسيط

2. طول \overline{AB}



بما أنّ $AC = BC$ ، و t عموديّ على \overline{AB} ، فإنّ t مُنْصَفٌ عموديّ لـ \overline{AB} بحسب عكس نظرية المُنْصَفِ العموديّ:

$$AB = 2AD$$

تعريف المُنْصَفِ العموديّ

$$= 2(2.5)$$

بالتعويض

$$= 5$$

بالتبسيط

أتعلّم


أن يكون $AC = BC$ لا يُعد شرطاً كافياً للحكم على أن t هو مُنْصَفٌ عموديّ لـ \overline{AB} .

أتحققُ من فهمي

أجد كلاً ممّا يأتي:

a. طول \overline{TS}

b. طول \overline{RS}



الوحدة 5

تعلّمتُ سابقاً أنه يمكن إيجاد معادلة أيّ مستقيم إذا عُلِمَ ميلُه ونقطةٌ يمرُّ بها. ومن ثم، فإنَّه يمكن إيجاد معادلة المُنْصَف العموديّ كما في المثال الآتي.

مثال 2

أجدُ معادلة المُنْصَف العموديّ للقطعة المستقيمة \overline{PQ} ، حيث: $P(-1, 4)$ ، و $Q(1, 2)$.

الخطوة 1: أجدُ نقطةً متصفَّةً للقطعة المستقيمة \overline{PQ} .

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \quad \text{صيغة نقطة المتصف في المستوى الإحداثي}$$

$$M\left(\frac{-1 + 1}{2}, \frac{4 + 2}{2}\right) \quad (x_1, y_1) = (-1, 4), (x_2, y_2) = (1, 2) \quad \text{بتعويض}$$

$$M(0, 3) \quad \text{بالتبسيط}$$

إذن، إحداثياً النقطة M الواقعة متصفَّةً \overline{PQ} ، هما: $(0, 3)$.

أتذَّكُر

إذا تعاَدَ مسْتَقِيمَانِ كُلُّ منْهُمَا لِيَسَّ رَأْسِيًّا، فإنَّ حاصلَ ضَرِبِ مَيْلِيهِمَا هُوَ -1 ؛ أيْ إِنَّ مَيْلَ أَحَدِهِمَا يُساوِي سَالِبَ مَقْلُوبِ مَيْلِ الْآخِرِ.

الخطوة 2: أجدُ ميلَ المُنْصَف العموديّ.

مُيلَ المُنْصَف العموديّ يُساوِي سَالِبَ مَقْلُوبِ مَيْلِ القطعة المستقيمة نفسها؛ لذا أجدُ أَوَّلَ ميلَ القطعة المستقيمة:

$$\begin{aligned} m &= \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} & \text{صيغة الميل} \\ &= \frac{2 - 4}{1 - (-1)} & (x_1, y_1) = (-1, 4), (x_2, y_2) = (1, 2) \\ &= \frac{-2}{2} = -1 & \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

إذن، مُيلَ المُنْصَف العموديّ هُوَ سَالِبَ مَقْلُوبِ مَيْلِ \overline{PQ} ، ويُساوِي 1 .

أتذَّكُر

يمكِّنُ كتابةً معادلةً مستقيمٍ بصيغةِ الميل ونقطةٍ إذا عُلِمَ ميلُه ونقطةٍ إذا عُلِمَ ميلُه ونقطةٍ يمرُّ بها.

الخطوة 3: أجدُ معادلةً المُنْصَف العموديّ.

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{صيغة الميل ونقطة}$$

$$y - 3 = 1(x - 0) \quad (x_1, y_1) = (0, 3), m = 1 \quad \text{بتعويض}$$


$$y = x + 3 \quad \text{بالتبسيط، وإعادة ترتيب المعادلة}$$

إذن، معادلةً المُنْصَف العموديّ للقطعة المستقيمة \overline{PQ} هي: $y = x + 3$.

الدعم البياني

أستعمل برمجية جبر الإيجاد معادلة المُنْصَف العمودي لقطعة مستقيمة، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

- أحدّ نقطتي نهايتي القطعة المستقيمة، وذلك باختيار أيقونة  من شريط الأدوات، ثم الضغط على موقعي النقطتين في المستوى الإحداثي.
- أرسم القطعة المستقيمة الواقلة بين النقطتين، وذلك باختيار أيقونة  من شريط الأدوات، ثم الضغط على النقطتين.
- أختار أيقونة  لإظهار المُنْصَف العمودي في المستوى الإحداثي، وإظهار معادلته في شريط المعادلة.



أتحقق من فهمي

أجد معادلة المُنْصَف العمودي لقطعة المستقيمة \overline{PQ} ، حيث: $P(-1, -5)$ ، $Q(3, 1)$.

المُنْصَفُ العموديُّ لِلْمُثَلَّثِ، وَمَرْكُزُ الدَّائِرَةِ الْخَارِجِيَّةِ


إذا تلاقت ثلاثة مستقيماتٍ أو أكثر في نقطةٍ مشتركةٍ، فإنَّ هذه المستقيمات تُسمى مستقيماتٍ مُتلاقيَّة، وتُسمى النقطة التي تلتقي فيها المستقيمات نقطةً التلاقي.

بما أنَّ للمُثَلَّث ثلاثة أضلاع، فإنَّ له ثلاثة مُنْصَفاتٍ عموديةٍ تلتقي في نقطةٍ واحدةٍ كما ثبَّتَ النظرية الآتية.

الوحدة 5

المنصفات العمودية للمثلث

نظريّة




تلقي المنصفات العمودية لأضلاع مثلث في نقطة لها البعد نفسه عن كل من رؤوس المثلث.

مثال: إذا كانت \overline{PJ} , \overline{PL} , \overline{PK} هي المنصفات العمودية لـ $\triangle ABC$, وكانت النقطة P هي نقطة تلاقيه، فإن $PA = PB = PC$.


إثبات النظريّة جاء في صورة تدريب في المسألة 14.

نقطة تلاقي المنصفات العمودية لأضلاع مثلث ما هي **مركز الدائرة الخارجية للمثلث** (circumcenter of the triangle)؛ وهي دائرة تمر برؤوس المثلث جميعها؛ إذ إنّ نقطة تلاقي المنصفات العمودية لأضلاع مثلث ما تبعد المسافة نفسها عن كل من رؤوسه؛ لذا فهي مركز للدائرة الخارجية.


يعتمد موقع مركز الدائرة الخارجية للمثلث على نوع المثلث كما في الأشكال الآتية:




مثلث حاد الزوايا، وفيه تقع P داخل المثلث.



مثلث قائم الزاوية، وفيه تقع P على وتر المثلث.



مثلث منفرج الزاوية، وفيه تقع P خارج المثلث.



إذا كانت النقطة P هي مركز الدائرة الخارجية لـ $\triangle XYZ$ في الشكل المجاور، فأجد كلاً ممّا يأتي:

مثال 3

طول \overline{PX} .

طول \overline{PY} .

$$PX = PY$$

نظريّة المنصفات العمودية للمثلث

$$= 9$$

بتعويض $PY = 9$

أتعلّم

يوجُد فرقٌ بين المنصف العمودي للمثلث والقطعة المنصفة في المثلث. فالقطعة المنصفة تصطف الضلعين اللذين يتقاطعان معها، ولا يكون التقاطع عمودياً بالضرورة. أمّا المنصف العمودي فهو منصف لضلع واحد في المثلث، وهو عمودي بالضرورة على ذلك الضلع.

طُول \overline{PM}

2

$$(PX)^2 = (MX)^2 + (PM)^2$$

نظريّة فيثاغورس

$$(9)^2 = (8)^2 + (PM)^2$$

$$PX = 9, MX = 8$$

$$81 = 64 + (PM)^2$$

بِإِيجادِ الْقُوَى

$$(PM)^2 = 17$$

بِطْرَحِ 64 مِنْ طَرْفِيِّ الْمَعَادِلَةِ

$$PM = \pm \sqrt{17}$$


بِأَخْدِ الْجُنْدِ التَّرْبِيعِيِّ لِطَرْفِيِّ الْمَعَادِلَةِ

بِمَا أَنَّ الْطُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سَالِبًا، فَإِنَّ $PM = \sqrt{17}$.

أَذْكُرْ

بِالرَّجُوعِ إِلَى تَعْرِيفِ
الْمُنْصَفِ الْعَمُودِيِّ، فَإِنَّ:

$$MX = ZM = 8$$




أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ G هِيَ مَرْكَزُ الدَّائِرَةِ الْخَارِجِيَّةِ لِالشَّكْلِ الْمُجاوِرِ، فَأَجْدُ كُلَّا مِمَّا يَأْتِي:

$$\text{(b) طُول } \overline{GY} \quad \text{(a) طُول } \overline{AG}$$

$$\text{(c) طُول } \overline{CZ}$$

مُنْصَفُ الزَّاوِيَّةِ




تَعْلَمْتُ سَابِقًا أَنَّ مُنْصَفَ الزَّاوِيَّةِ شَعَاعٌ يُقْسِمُ الزَّاوِيَّةَ إِلَى زَوَّايتَيْنِ مُنْطَابِقَيْنِ، وَتَعْلَمْتُ أَيْضًا أَنَّ الْبُعْدَ بَيْنَ مَسْتَقِيمٍ وَنَقْطَةٍ لَا تَقْعُدُ عَلَيْهِ هُوَ طُولُ الْقَطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الْعَمُودِيَّةِ عَلَى الْمَسْتَقِيمِ مِنْ تِلْكَ النَّقْطَةِ. وَمِنْ ثَمَّ، فَإِنَّ \overrightarrow{PS} فِي الشَّكْلِ الْمُجاوِرِ مُنْصَفٌ لـ $\angle QPR$ ، وَإِنَّ الْبُعْدَ بَيْنَ النَّقْطَةِ S وَ \overrightarrow{PQ} هُوَ SQ .

رَمَوْزُ رِيَاضِيَّةٍ

يُسْتَعْمَلُ الرَّمَزُ \overrightarrow{PS} لِلدلالةِ عَلَى الشَّعَاعِ الَّذِي يَبْدُأُ بِالنَّقْطَةِ P ، وَيَمْرُّ بِالنَّقْطَةِ S .

مُنْصَفُ الزَّاوِيَّةِ

نظريّات




• نَظَرِيَّةُ مُنْصَفِ الزَّاوِيَّةِ:

كُلُّ نَقْطَةٍ عَلَى مُنْصَفِ الزَّاوِيَّةِ تَكُونُ عَلَى بُعْدَيْنِ مُتَسَاوِيْنِ مِنْ ضَلَعِهَا.

مَثَالٌ: إِذَا كَانَ \overrightarrow{PC} مُنْصَفًا لـ $\angle APB$ ، فَإِنَّ $CA = CB$ ، $\overline{CA} \perp \overline{PA}$ ، $\overline{CB} \perp \overline{PB}$ ، وَكَانَ $\angle APB$ مُنْصَفًا لـ $\angle APB$.


الوحدة 5



• عَكْسُ نَظَرِيَّةِ مُنْصَفِ الزَّاوِيَّةِ:

إذا وقعت نقطة داخل زاوية، وكانت على بعدين متساوين من ضلعيها، فإنها تقع على منصف الزاوية.

مثال: إذا كان \overrightarrow{PC} منصف $\angle APB$, $CA = CB$, $\overline{CA} \perp \overrightarrow{PA}$, $\overline{CB} \perp \overrightarrow{PB}$.



$$\angle PYM \cong \angle WYM$$

$$m\angle PYM = m\angle WYM$$

$$4x + 1 = 2x + 5$$

$$x = 2$$

مثال 4

أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل المجاور لإيجاد $m\angle PYM$.

الخطوة 1: أجد قيمة x .

عكس نظرية منصف الزاوية

تعريف تطابق الزوايا

بالتعمير

بحل المعادلة لـ x

الخطوة 2: أجد $m\angle PYM$.

$$m\angle PYM = (4x + 1)^\circ \quad \text{معطى}$$

$$= (4(2) + 1)^\circ \quad x = 2$$


$$= 9^\circ \quad \text{بالتبسيط}$$

أتحقق من فهمي

أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل المجاور لإيجاد QA .

أتعلم

أن يكون $MP = MW$ لا يُعد شرطاً كافياً للحكم على أن \overrightarrow{YM} هو منصف $\angle PYW$, وإنما يشتَرط أن يكون $\overline{MW} \perp \overline{YW}$ و $\overline{MP} \perp \overline{YP}$.




منصفات زوايا المثلث، ومركز الدائرة الداخلية للمثلث

بما أن المثلث ثالث زوايا، فإن له ثلاثة منصفات لزوايا تلتقي في نقطة واحدة كما تُبيّن النظرية الآتية.

مُنْصَفَاتُ زُوَايَا الْمُثَلَّثِ

نظريّة




تلتقي مُنْصَفَاتُ زُوَايَا الْمُثَلَّثِ في نقطة لها البُعدُ نفسُه عنْ كُلِّ مِنْ أَضْلاعِ الْمُثَلَّثِ.


مُثَالٌ: إذا كانت \overline{PX} , \overline{PY} , \overline{PZ} هي مُنْصَفَاتِ زُوَايَا ΔXYZ ، وكانت النقطة P هي نقطة تلاقيه، فإنَّ

$$PM = PN = PO$$

إثبات النظريّة جاءَ في صورة تدريب في المسألة 15.



نقطة تلاقي مُنْصَفَاتِ زُوَايَا الْمُثَلَّثِ هي **مرْكُزُ الدَّائِرَةِ الدَّاخِلِيَّةِ** (incenter of the triangle)؛ وهي دائرة تمسُّ أضلاعَ الْمُثَلَّثِ جميعَها؛ ذلك أنَّ نقطة تلاقي مُنْصَفَاتِ زُوَايَا الْمُثَلَّثِ تبعدُ المسافةَ نفسها عنْ كُلِّ مِنْ أَضْلاعِهِ؛ ما يعني أنَّها مرْكُزُ الدَّائِرَةِ الدَّاخِلِيَّةِ.



$$(MZ)^2 = (LM)^2 + (LZ)^2$$

$$(8)^2 = (5)^2 + (LZ)^2$$

$$64 = 25 + (LZ)^2$$

$$(LZ)^2 = 39$$

$$LZ = \pm \sqrt{39}$$

أَسْتَعْمِلُ الْمُعْلَوَمَاتِ الْمُعْطَاهُ فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ لِإِيَاجَادِ LZ .

مُثَال٥

نظريّة فيثاغورس

بتعويض $MZ = 8$, $LM = MJ = 5$

بإيجاد القوى

بطرح 25 من طرفي المعادلة

بأخذ الجذر التربيعي لطرفي المعادلة

بما أنَّ الطولَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ سالبًا، فإنَّ $LZ = \sqrt{39}$

أَتَذَكَّرُ

بحسب نظرية $LM = MJ$
مُنْصَفَاتِ زُوَايَا الْمُثَلَّثِ.

الوحدة 5


أتحقق من فهمي

أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل الوارد في المثال 5 لإيجاد XL .



أتدرب وأحل المسائل

أجد كل قياس ممّا يأتي:

1 AB



2 FG



3 GA

4 AY

5 AC

أجد كل قياس ممّا يأتي:


أجد معادلة المُنْصَف العمودي للقطعة المستقيمة \overline{PQ} المعطى نهايتها في كل ممّا يأتي:

6 $P(-2, 0), Q(6, 12)$


7 $P(-7, 5), Q(1, -1)$


أجد كل قياس ممّا يأتي:

8 $m\angle MFZ$



9 TU






إذا كانت النقطة D هي مركز الدائرة الداخلية لـ ΔXYZ ، فأجذ كل قياسٍ مما يأتي:

10) DB

11) CZ

12) YZ



إذا كانت النقطة P هي مركز الدائرة الخارجية لـ ΔXYZ ، فأستعمل المعلومة المعطاة تالياً لإيجاد PY .

$$PX = 4x + 3$$


$$PZ = 6x - 11$$

أثبت كلاً من النظريتين الآتيتين:

14) نظرية منصفات العمودية للمثلث.

15) نظرية منصفات زوايا المثلث.


اتصالات: ترغب شركة اتصالات في بناء برج للبث على أبعاد متساوية من ثلاثة مبانٍ كبيرة. أوضح كيف يمكن استعمال الشكل الآتي لتحديد موقع البرج.



أحل المسألة الواردة بداية الدرس.

17

الوحدة 5





يريد فنان أن يضع قطعة دائريةً من الزجاج الملون داخل إطار على شكل مثلث أبعاده مبينة في الشكل المجاور، وأن يجعل الزجاج يلامس كلاً من جوانب الإطار. أجد طول قطر قطعة الزجاج الدائرية لأقرب جزء من عشرة.

18



اكتشف الخطأ: قالَتْ أحَلَامُ: "قيمة x في الشكَلِ الآتِي هي 6 بحسب نظرية منصف الزاوية". أكتشف الخطأ في قولِ أحَلَامَ، ثُمَّ أُصْحِحُهُ.



إذا كانت النقاط D ، E ، و F هي منصفات أضلاع $\triangle ABC$ في الشكَلِ المجاور، فاستعمل المعلومات المعلوَّة في الشكَلِ للإجابة عن الأسئلة الآتية، مبررًا إجابتي:

أيُّ نقاطِ الشكَلِ هي مركزُ الدائرة المارَّة بالنَّقاطِ A ، B ، و C ؟


20

أيُّ نقاطِ الشكَلِ هي مركزُ دائرةٍ تمسُّ كلَّ ضلعٍ من أضلاع $\triangle ABC$ ؟

21

إذا كان $TA = 8.2$ ، فما طول \overline{TC} ؟

22



تحدّ: أجد مركزَ الدائرةِ الْخَارِجِيَّةِ للْمُثَلَّثِ في المستوى الإحداثيِّ المجاور.

23

القطّعُ المُتوسّطةُ فِي المُثُلّثِ


Medians of Triangle

نشاطٌ مفاهيميٌّ

الهدف: استكشاف العلاقة بين طول القطعة المستقيمة الواصلية بين رأس المثلث ونقطة توازن المثلث، وطول القطعة المستقيمة الواصلية بين نقطة متصفٍ ضلع المثلث والرأس المقابل لها.


نشاط 1

الخطوة 3:




أحدّد نقطة توازن المثلث، ثم أضع علامةً عندَها.

الخطوة 2:



أضع المثلث على قلم الرصاص، ثم أعدل موقعه حتى يتوازن.

الخطوة 1:




أرسم مثلاً على قطعة من الورق المقوّى، ثم أقصُه.

نشاط 2


الخطوة 3:

أسمّي المثلث كما في الشكل الآتي.



الخطوة 2:

أرسم قطعةً مستقيمةً تصلُ بين كل متصفٍ ضلعٍ ورأس المثلث المُقابل له.



الخطوة 1:

أستعمل المسطرة لتحديد نقطة المتصف لكلٍ من أضلاع المثلث الذي رسمته في النشاط 1.



أَهْلُ النَّتَائِجِ:

3 ما العلاقة بين طول القطعة المستقيمة الواصلية بين رأس المثلث والنقطة P ، وطول القطعة المستقيمة الواصلية بين متصفٍ ضلع المثلث والنقطة P ؟


4 ما العلاقة بين طول القطعة المستقيمة الواصلية بين رأس المثلث والنقطة P ، وطول القطعة المستقيمة الواصلية بين متصفٍ ضلع المثلث والرأس المقابل له؟

1 ما العلاقة بين النقطة P في النشاط 2 ونقطة توازن المثلث في النشاط 1؟

2 أستعمل المسطرة لأملاً الفراغ في الجدول الآتي:

$AD =$ _____	$BF =$ _____	$CE =$ _____
$AP =$ _____	$BP =$ _____	$CP =$ _____
$PD =$ _____	$PF =$ _____	$PE =$ _____

القطع المتوسطة والارتفاعات في المثلث Medians and Altitudes in Triangle



• تعرّف نظرية مركز المثلث، واستعمالها لإيجاد قياسات مجهولة.

• إيجاد ملتقى ارتفاعات المثلث في المستوى الإحداثي.

القطعة المتوسطة، مركز المثلث، ارتفاع المثلث، ملتقى الارتفاعات.

تمثّل النقطة P في الشكل المجاور موقع مستشفى حكومي في إحدى المحافظات الأردنية، وتمثّل النقطة الأخرى في الشكل عدداً من المناطق السكنية القريبة منه. إذا كان بعد المنطقة S عن المنطقة Z هو 8 km ، فما بعد المستشفى عن المنطقة Z ؟


فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



القطعة المتوسطة في المثلث

القطعة المتوسطة للمثلث (median of triangle)

هي القطعة المستقيمة الواصلة بين أحد رؤوس المثلث ومتصرف الضلع المقابل له.


أتعلم

يقع مركز المثلث دائمًا داخل المثلث.

لكل مثلث ثالث قطع متوسطة تلتقي في نقطة واحدة تسمى **مركز المثلث** (centroid)، وكانت قد توصلت في النشاط المفاهيمي الذي يسبق هذا الدرس إلى أنها نقطة اتزان المثلث.

مركز المثلث

نظرية



يعد مركز المثلث عن كل من رؤوسه ثلاثي طول القطعة المستقيمة الواصلة بين ذلك الرأس ومتصرف الضلع المقابل له.


مثال: إذا كانت النقطة P هي مركز ΔABC ، فإن:

$$AP = \frac{2}{3} AE, BP = \frac{2}{3} BF, CP = \frac{2}{3} CD$$

أتعلم

نسبة بعد مركز المثلث عن الرأس إلى بعده عن متصرف الضلع المقابل له هي $2:1$.

مثال 1



إذا كانت النقطة P هي مركز ΔLMN ، وكان $NQ = 30$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

طول \overline{NP} .

$$NP = \frac{2}{3} NQ$$

نظريّة مركز المثلث

$$= \frac{2}{3} (30)$$

بتعويض $NQ = 30$

$$= 20$$

بالتبسيط

طول \overline{PQ} .

2

$$NP + PQ = NQ$$

نظريّة مركز المثلث

$$20 + PQ = 30$$


بتعويض $NQ = 30, NP = 20$

$$PQ = 10$$

بطرح 20 من طرفي المعادلة

أتعلّم

$$PQ = \frac{1}{3} NQ$$



إذا كانت النقطة Q هي مركز ΔLMN ، وكان $NP = 20$ ، فأجد كلاً ممّا يأتي:


طول \overline{NQ} (a)

طول \overline{QP} (b)

يمكن إيجاد مركز أي مثلث في المستوى الإحداثي إذا علمت إحداثيات رؤوسه.

الوحدة 5

مثال 2



يظهر ΔABC في المستوى الإحداثي المجاور.
أجد إحداثيّي مركز هذا المثلث.

الخطوة 1: أجد نقطةً منتصف أحد أضلاع المثلث.

أستعمل صيغة نقطة منتصف لإيجاد منتصف \overline{AC}
ولتكن D :

$$D\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

صيغة نقطة منتصف في المستوى الإحداثي

$$D\left(\frac{2+6}{2}, \frac{1+3}{2}\right)$$

بتعويض $(x_1, y_1) = (2, 1)$, $(x_2, y_2) = (6, 3)$


$$D(4, 2)$$

بالتبسيط

الخطوة 2: أجد مركز المثلث.

أعين النقطة D في المستوى الإحداثي، ثم
أرسم \overline{DB} .

الاحظ أن \overline{DB} رأسية، وأنه يمكن إيجاد طولها
على النحو الآتي:



$$DB = |y_2 - y_1|$$

صيغة طول قطعة مستقيمة رأسية

$$= |5 - 2|$$

بتعويض $y_1 = 2$, $y_2 = 5$

$$= 3$$

بالتبسيط، وإيجاد القيمة المطلقة

إذن، طول \overline{DB} هو 3 وحدات.

أفترض أن النقطة P هي مركز ΔABC . ومن ثم، فإن $DB = \frac{2}{3}BP$; لذا يقع المركز على
بعد $2 \cdot \frac{2}{3} = 2 \frac{2}{3}$ وحدة أسفل الرأس B .

إذن، إحداثيّي مركز هذا المثلث (إحداثيّي النقطة P) هما: $(3, 2 \frac{2}{3})$.


أتعلم

يمكن إيجاد طول القطعة المتوسطة \overline{DB} بسهولة؛ لأنها رأسية، ولأن الصلع \overline{AC} هو الذي اختياره في بادئ الأمر؛ ما يعني أن اختيار الصلع المناسب للمثلث يسهل أحيانا إجراءات الحل.

أتعلم

يمكن التحقق من صحة الحل باستخدام قطعة متوسطة أخرى لإيجاد مركز المثلث.

الدعم البياني:



أستعمل برمجية جيوجبرا لإيجاد مركز مثلث، وذلك باتباع الخطوتين الآتتين:

(1) أرسم المثلث في المستوى الإحداثي، متبوعاً الخطوات التي تعلمتها سابقاً.

(2) أحدد مركز المثلث باختيار أيقونة


من شريط الأدوات، ثم النقر في وسط المثلث لإظهار إحداثي مركز المثلث في شريط المعادلة.

• Midpoint or Center


أتحقق من فهمي

يظهر ΔABC في المستوى الإحداثي المجاور. أجد إحداثي مركز هذا المثلث.

ارتفاعات المثلث




ارتفاع المثلث (altitude of a triangle) هو القطعة المستقيمة العمودية النازلة من أحد رؤوس المثلث إلى الضلع المقابل له، أو إلى المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل له.




أحد رؤوس المثلث إلى الضلع المقابل له، أو إلى المستقيم الذي يحوي الضلع المقابل له.


لكل مثلث ثلاثة ارتفاعات تتقاطع في نقطة مشتركة تسمى ملتقى الارتفاعات (orthocenter)، ويعتمد موقعها على نوع المثلث كما في الأشكال الآتية:



مثلث حاد الزوايا، وفيه تقع P داخل المثلث.



مثلث قائم الزاوية، وفيه تقع P عند رأس القائمة.




مثلث منفرد الزاوية، وفيه تقع P خارج المثلث.

أتعلم

الاحظ في الأشكال المجاورة أن ساق المثلث قائم الزاوية هما من ارتفاعاته، وأن رأس الزاوية القائمة هو ملتقى ارتفاعاته.

الوحدة 5



مثال 3

إذا كانت: $K(0, 0)$, $M(3, 12)$, $L(10, 5)$, فأجد
إحداثي ملتقى ارتفاعات رؤوس $\triangle KLM$.

الخطوة 1: أمثل $\triangle KLM$ بيانياً.

الخطوة 2: أجد ميل ضلعين من أضلاع المثلث.

$$m_{\overline{KL}} = \frac{5 - 0}{10 - 0} = \frac{1}{2} \quad \text{ميل } \overline{KL}$$

$$m_{\overline{LM}} = \frac{12 - 5}{3 - 10} = -1 \quad \text{ميل } \overline{LM}$$

الخطوة 3: أجد معادلة الارتفاع العمودي على كل من الضلعين اللذين اخترتهما في الخطوة السابقة.

معادلة الارتفاع العمودي على \overline{KL} :

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{صيغة الميل ونقطة}$$

$$y - 12 = -2(x - 3) \quad \text{بالتعميض } -2 \quad (x_1, y_1) = (3, 12), m = -2$$

$$y = -2x + 18 \quad \text{بالتبسيط، وإعادة ترتيب المعادلة}$$

معادلة الارتفاع العمودي على \overline{ML} :

$$y - y_1 = m(x - x_1) \quad \text{صيغة الميل ونقطة}$$

$$y - 0 = 1(x - 0) \quad \text{بالتعميض } 1 \quad (x_1, y_1) = (0, 0), m = 1$$

$$y = x \quad \text{بالتبسيط، وإعادة ترتيب المعادلة}$$

الخطوة 4: أحلل نظام المعادلتين الناتج لإيجاد إحداثي ملتقى ارتفاعات.

بما أنَّ المعادلة الثانية مكتوبة بالنسبة إلى y , فإنَّني أُعُوّض x بدلاً من y في المعادلة الأولى:

$$y = -2x + 18 \quad \text{المعادلة الأولى}$$

$$x = -2x + 18 \quad \text{بالتعميض عن } y \text{ بـ } x$$

$$3x = 18 \quad \text{بجمع } 2x \text{ لطرف المعادلة}$$

$$x = 6 \quad \text{بقسمة طرف المعادلة على 3}$$

بما أنَّ $x = 6$, فإنَّ $y = 6$, وذلك بتعويض قيمة x في أيٍ من المعادلتين.

إذن، إحداثياً ملتقى ارتفاعات رؤوس $\triangle KLM$ هما: $(6, 6)$.

رموز رياضية

يشير الرمز $m_{\overline{KL}}$ إلى ميل القطعة المستقيمة \overline{KL} .


أتعلم

- الرأس M هو الرأس المقابل لـ \overline{KL} ; لذا يقع على الارتفاع العمودي على \overline{KL} .
- ميل الارتفاع العمودي على \overline{KL} يساوي سالب مقلوب ميل \overline{KL} ; أي إنَّه يساوي -2 .

أتعلم

- الرأس K هو الرأس المقابل لـ \overline{ML} ; لذا يقع على الارتفاع العمودي على \overline{ML} .
- ميل الارتفاع العمودي على \overline{ML} يساوي سالب مقلوب ميل \overline{ML} ; أي إنَّه يساوي 1 .

الدعمُ البيانيُّ



أَسْتَعْمَلُ بِرْمَجِيَّةَ جِيُوجِبْرَا لِإِيْجَادِ مُلْتَقِيِّ ارْتِفَاعَاتِ مُثَلَّثٍ، وَذَلِكَ بِاتِّبَاعِ الْخَطَوَتَيْنِ الْآتَيْتَينِ:

(1) أَرْسِمُ الْمُثَلَّثَ فِي الْمَسْتَوِيِّ الْإِحْدَاثِيِّ، مُتَبَّعًا الْخَطَوَاتِ الَّتِي تَعْلَمْتُهَا سَابِقًا.

(2) أَرْسِمُ جَمِيعَ الْأَرْتِفَاعَاتِ فِي الْمُثَلَّثِ، وَذَلِكَ

بِالْخِيَارِ أَيْقُونَةَ مِنْ شَرِيطِ الْأَدَوَاتِ، ثُمَّ الضَّغْطُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ زَوْيَّةٍ وَالْبَلْعِ المُقَابِلِ لَهَا.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي

إِذَا كَانَتْ: $A(-5, -1), B(-2, 4), C(3, -1)$ ، فَأَجَدُ إِحْدَاثِيًّا مُلْتَقِيِّ ارْتِفَاعَاتِ ΔABC رَؤُوسِ.


أُفَكْرُ

لِمَا يُعَدُّ إِيْجَادُ إِحْدَاثِيٍّ نَقْطَةَ التَّقَاءِ ارْتِفَاعَيْنِ مِنَ الْأَرْتِفَاعَاتِ الْثَّلَاثَةِ كَافِيًّا لِتَحْدِيدِ مُلْتَقِيِّ الْأَرْتِفَاعَاتِ؟ أَبْرُزُ إِجَابَتِي.

قطْعٌ مُسْتَقِيمَةٌ وَنَقْاطٌ خَاصَّةٌ فِي الْمُثَلَّثِ


مُلْخَصُ الْمَفْهُومِ

الارتفاعاتُ	القطعُ الْمُتَوَسِّطُ	مُنْصَفَاتُ الزَّوَالِيَا	مُنْصَفَاتُ الْعَمُودِيَّةِ	
مُلْتَقِيِّ الْأَرْتِفَاعَاتِ.	مَرْكُزُ الْمُثَلَّثِ.	مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ الدَّاخِلِيَّةِ لِلْمُثَلَّثِ.	مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ الْخَارِجِيَّةِ لِلْمُثَلَّثِ.	نَقْطَةُ التَّلَاقِيِّ
النَّقْطَةُ P هِيَ مُلْتَقِيِّ ارْتِفَاعَاتِ ΔABC .	النَّقْطَةُ P مَرْكُزُ ΔABC ، وَهِيَ تَبْعُدُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ ثَلَاثِيِّ طَوْلِ الْدَّاخِلِيَّةِ ΔABC ، وَهِيَ قَعْدُ الْوَاصِلَةِ بَيْنَ ذَلِكَ الرَّأْسَ وَمَنْتَصِفِ الْبَلْعِ الْمُقَابِلِ لَهُ.	النَّقْطَةُ P مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ الدَّاخِلِيَّةِ ΔABC ، وَهِيَ قَعْدُ الْوَاصِلَةِ بَيْنَ ذَلِكَ الرَّأْسَ وَمَنْتَصِفِ الْبَلْعِ الْمُقَابِلِ لَهُ.	النَّقْطَةُ P مَرْكُزُ الدَّائِرَةِ الْخَارِجِيَّةِ ΔABC ، وَهِيَ قَعْدُ الْوَاصِلَةِ بَيْنَ ذَلِكَ الرَّأْسَ وَمَنْتَصِفِ الْبَلْعِ الْمُقَابِلِ لَهُ.	الخَاصِيَّةُ
				مَثَلٌ




إذا كانت النقطة W هي مركز $\triangle QRS$ ، وكان $RX = 48$, $QW = 30$ ، فأجد كلاً مما يأتي:

- 1 RW
- 2 WX
- 3 QZ
- 4 WZ



أجد كلاً مما يأتي:


- 5 PZ
- 6 PX
- 7 QZ
- 8 YZ



يظهر ΔABC في المستوى الإحداثي المجاور. 9
أجد إحداثي مركز هذا المثلث.

أجد إحداثي مركز المثلث المعطاة إحداثيات رؤوسه في كل مما يأتي:

- 10 $F(1, 5), G(-2, 7), H(-6, 3)$
- 11 $A(5, 5), B(11, -3), C(-1, 1)$



يظهر ΔABC و ΔGFH في الشكل المجاور. أحدد إذا كانت كل قطعة مستقيمة في ما يأتي تمثل ارتفاعاً، أو عموداً، منصفاً، أو قطعة متوسطة، أو منصف زاوية:


- 12 BD
- 13 FJ
- 14 CE
- 15 KL

أجد إحداثي ملتقى ارتفاعات المثلث المعطاة إحداثيات رؤوسه في كلٌ مما يأتي:

16) $X(-2, -2), Y(6, 10), Z(6, 6)$

17) $A(4, -3), B(8, 5), C(8, -8)$

أحل المسألة الواردة بداية الدرس.




مهارات التفكير العليا

18)


اكتشف الخطأ: يمثل الشكل المجاور حل خالد لإيجاد طول \overline{DE} في $\triangle ABC$, حيث D مركز المثلث. اكتشف الخطأ في حل خالد، ثم أصححه.

19)



تبسيط: يظهر في المستوى الإحداثي المجاور $\triangle ABC$ الذي مركزه النقطة P . إذا حركت النقطة B إلى اليمين على المحور x , وظللت كل من النقطة A والنقطة C في موقعها، فما تأثير ذلك في موقع كل من مركز $\triangle ABC$ ومثلث ارتفاعاته؟ أبرز إجابتي.

20)



تحدي: يبيّن الشكل المجاور $\triangle JKL$. أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل للإجابة عن السؤالين الآتيين:

21)

أجد مساحة كل من $\triangle JKM$, $\triangle KML$, و $\triangle KML$ بدلالة h , مقارنًا بين مساحتي المثلثين.

في السؤال السابق، هل تختلف العلاقة بين مساحتي المثلثين الناتجين من القطعة المتوسّطة للمثلث بعًا لاختلاف نوع المثلث، مبررًا إجابتي؟

22)


النسب المثلثية

Trigonometric Ratios

نشاط مفاهيمي

الهدف: استقصاء النسب بين أطوال أضلاع المثلثات ذات الزوايا القائمة.

نشاط



الخطوة 1: أرسم الشكل المجاور على ورقة مربعات.

الخطوة 2: في كل من مثلثات الشكل، أجد طول الضلع المقابل للزاوية، وطول الضلع المجاور لها، وطول الوتر، مقرّباً إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية (إن لزم)، ثم أدوّن ما أتوصل إليه في الجدول التالي.

الخطوة 3: أجد النسب المطلوبة في الجدول الآتي، مقرّباً إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية.

المثلث	طول الضلع المقابل للزاوية A	طول الضلع المجاور للزاوية A	طول الوتر	النسب		
				$\frac{\text{(الم مقابل)}}{\text{(الوتر)}}$	$\frac{\text{(المجاور)}}{\text{(الوتر)}}$	$\frac{\text{(الم مقابل)}}{\text{(المجاور)}}$
$\Delta AB_1 C_1$						
$\Delta AB_2 C_2$						
$\Delta AB_3 C_3$						
ΔABC						

أحلل النتائج:


1 ما قياس الزاوية A لكُل مثلث في الشكل؟

2 ما العلاقة بين المثلثات جميعها في الشكل؟ أُبّرّر إجابتي.

3 أدرس النسب بين أطوال الأضلاع في الجدول، ثم أكتب ثلثاً جمل لوصف النمط الذي يظهر.

أفكّر:

أكتب ثلاثة تناسب باستعمال أطوال ساقين المثلثين المجاورين.



الدرس 4

النسب المثلثية

Trigonometric Ratios

تعرفُ جيب الزاوية الحادة، وجيب تمامها، وظلها، بوصفها نسبًا بين أضلاع مثلث قائم الزاوية.

النسب المثلثية، الجيب، جيب تمام، الظل، معكوس النسبة المثلثية، مُنطابقة فيثاغورس.



فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم




تبين الصورة المجاورة آلية حاسبة علمية. فيم يُستعمل كل من المفاتيح الثلاثة المشار إليها؟

النسب المثلثية

النسبة المثلثية (trigonometric ratio) هي نسبة بين طولي ضلعين من أضلاع المثلث قائم الزاوية.

تتضمن النظرية الآتية ثلاث نسب مثلثية مشهورة، لها أسماء ورموز خاصة بها.

النسب المثلثية



إذا كان ΔABC قائم الزاوية، وكانت $\angle A$ زاوية حادة فيه، فإن نسب المثلث التي هي أكثر شيوعاً تُعرف بدلالة الوتر، والضلع المُقابل، والضلع المجاور كما يأتي:

- $\sin A = \frac{\text{(المُقابل)}}{\text{(الوتر)}} = \frac{a}{c}$ (sine) **الجيب**
- $\cos A = \frac{\text{(المجاور)}}{\text{(الوتر)}} = \frac{b}{c}$ (cosine) **جيب تمام**
- $\tan A = \frac{\text{(المُقابل)}}{\text{(المجاور)}} = \frac{a}{b}$ (tangent) **الظل**


نظرية

رموز رياضية

تشير الأحرف الكبيرة (A, B, C) إلى رؤوس المثلث، في حين تشير الأحرف الصغيرة (a, b, c) إلى الأطوال المُقابلة لتلك الرؤوس. فمثلاً، يشار إلى طول الضلع المُقابل للزاوية A بالحرف a ، وهكذا.

الوحدة 5

مثال 1



أجد قيمة النسبة المثلثية الثالث للزاوية A في المثلث المجاور، وأترك إجابتي في صورة كسرٍ:

الخطوة 1: أستعمل نظرية فيثاغورس لإيجاد b .

$$a^2 + b^2 = c^2$$

نظرية فيثاغورس

$$7^2 + b^2 = 10^2$$

$$a = 7, c = 10$$

$$49 + b^2 = 100$$

بالتبسيط

$$b^2 = 51$$

بطرح 49 من طرف في المعادلة

$$b = \pm \sqrt{51}$$

بأخذ الجذر التربيعي لطرف في المعادلة

بما أنَّ الطول لا يمكن أن يكون سالبًا، فإنَّ $b = \sqrt{51}$


الخطوة 2: أجد النسبة المثلثية الثالث.

$$\sin A = \frac{a}{c} = \frac{7}{10}$$

$$\cos A = \frac{b}{c} = \frac{\sqrt{51}}{10}$$

$$\tan A = \frac{a}{b} = \frac{7}{\sqrt{51}}$$

أتحقق من فهمي



أجد قيمة النسبة المثلثية الثالث للزاوية T في المثلث المجاور، وأترك إجابتي في صورة كسرٍ:

أفكّر

هل يمكن استعمال وصف النسبة المثلثية لإيجاد النسبة المثلثية للزاوية القائمة في المثلث قائم الزاوية؟ أبْرُرْ إجابتي.

النسبة المثلثية، والآلة الحاسبة

يمكن إيجاد قيمة النسبة المثلثية لروابي معلومة باستعمال الآلة الحاسبة.

مثال 2

أجد قيمة كل مما يأتي باستعمال الآلة الحاسبة، مقرّباً إجابتي إلى أقرب ثلث منازل عشرية:

1 $\sin 54^\circ$

أضغط على مفتاح \sin ، ثم أدخل القيمة 54، ثم أضغط على مفتاح $=$ ، فتظهر النتيجة:

$\sin \ 5 \ 4 \ = \ 0.8090169944$

بالتقريب إلى ثلث منازل عشرية، فإن النتيجة هي: 0.809

إذن، $\sin 54^\circ \approx 0.809$.

2 $\cos 80^\circ$

أضغط على مفتاح \cos ، ثم أدخل القيمة 80، ثم أضغط على مفتاح $=$ ، فتظهر النتيجة:

$\cos \ 8 \ 0 \ = \ 0.1736481777$

بالتقريب إلى ثلث منازل عشرية، فإن النتيجة هي: 0.174

إذن، $\cos 80^\circ \approx 0.174$.

3 $\tan 25^\circ$

أضغط على مفتاح \tan ، ثم أدخل القيمة 25، ثم أضغط على مفتاح $=$ ، فتظهر النتيجة:

$\tan \ 2 \ 5 \ = \ 0.4663076582$

بالتقريب إلى ثلث منازل عشرية، فإن النتيجة هي: 0.466

إذن، $\tan 25^\circ \approx 0.466$.

أتعلم

أضيّط الآلة الحاسبة على خيار (DEGREES) قبل استعمالها.

الوحدة 5

أتحققُ من فهمي

أجدُ قيمةَ كُلٌّ مِمَّا يأتِي باستعمالِ الآلةِ الحاسِبةِ، مُقرّبًا إِجابتِي إِلَى أَقْرَبِ ثلَاثٍ مِنَازِلَ عَشْرِيَّةٍ:

a) $\sin 36^\circ$

b) $\cos 70^\circ$

c) $\tan 82^\circ$

لغةِ الرياضياتِ

- يُقْرَأُ معكوسُ الجيبِ: \sin^{-1} ، ويرمزُ إليه بالرمز \sin^{-1} .
- يُقْرَأُ معكوسُ جيبِ التمامِ: \cos^{-1} ، ويرمزُ إليه بالرمز \cos^{-1} .
- يُقْرَأُ معكوسُ الظلِّ: \tan^{-1} ، ويرمزُ إليه بالرمز \tan^{-1} .

مثال 3

أجدُ قياسَ $\angle A$ الحادَّةِ في كُلٍّ مِمَّا يأتِي، مُقرّبًا إِجابتِي إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ:

1) $\sin A = \frac{3}{8}$

$\sin A = \frac{3}{8}$

النسبةُ المُعطاَةُ

$m\angle A = \sin^{-1} \left(\frac{3}{8} \right)$

معكوسُ الجيبِ

وَالآنَ أَسْتَعْمِلُ الآلةَ الحاسِبةَ لِإِيجادِ $\sin^{-1} \left(\frac{3}{8} \right)$ كَمَا يَأْتِي:

SHIFT sin (3 ÷ 8) = 22.024312837

بِالْتَّقْرِيبِ إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ، فَإِنَّ النَّتِيْجَةَ هِيَ: 22.0°

إِذْنُ، $m\angle A \approx 22.0^\circ$.

أتعلّمُ

تحتوي بعضُ الالاتِ الحاسِبةِ عَلَى مفاتيحٍ خاصَّةٍ بِمعكوسِ كُلِّ مِنَ النسبِ المُثليَّةِ، وَيُمْكِنُ استعمالُ هَذِهِ المفاتيحِ مباشِرَةً مِنْ دونِ استعمالِ مفتاحِ SHIFT.

2) $\cos A = \frac{10}{13}$

$\cos A = \frac{10}{13}$

النسبةُ المُعطاَةُ

$m\angle A = \cos^{-1} \left(\frac{10}{13} \right)$

معكوسُ جيبِ التمامِ

والآن أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد $\cos^{-1}\left(\frac{10}{13}\right)$ كما يأتي:

SHIFT cos (10 ÷ 13) = 39.7151372318

بالتقرير إلى أقرب عشر درجة، فإن النتيجة هي: 39.7°
 $m\angle A \approx 39.7^\circ$ إذن،

3) $\tan A = \frac{12}{5}$

$$\tan A = \frac{12}{5}$$

النسبة المغطاة

$$m\angle A = \tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)$$

معكوس الجيب

والآن أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد $\tan^{-1}\left(\frac{12}{5}\right)$ كما يأتي:


SHIFT tan (12 ÷ 5) = 67.380135052

بالتقرير إلى أقرب عشر درجة، فإن النتيجة هي: 67.4°
 $m\angle A \approx 67.4^\circ$ إذن،

أتحقق من فهمي

أجذب قياس $\angle A$ الحادة في كل مما يأتي، مقرراً إجابتي إلى أقرب عشر درجة:

- a) $\sin A = \frac{4}{9}$ b) $\cos A = 0.64$ c) $\tan A = 0.707$



العلاقة بين الجيب وجيب التمام

في المثلث المجاور، إذا كان $\sin A = \frac{a}{c}$, $\cos A = \frac{b}{c}$ ،
 $\sin^2 A + \cos^2 A$ فما قيمة

يمكن إيجاد قيمة $\sin^2 A + \cos^2 A$ باتباع الخطوات الآتية:

$$\sin^2 A + \cos^2 A = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2$$

بالتعمير

$$= \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2}$$

بالتبسيط

أتعلم

$(\sin A)^2$ تعني $\sin^2 A$
 $(\cos A)^2$ تعني $\cos^2 A$.

الوحدة 5

$$= \frac{a^2 + b^2}{c^2}$$

بجمع الكسور

$$= \frac{c^2}{c^2}$$

باستعمال نظرية فيثاغورس

$$= 1$$

بالتبسيط

إذن، $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ (Pythagorean identity)، وسمى هذه العلاقة **مُطابقة فيثاغورس**.


مُطابقة فيثاغورس

نظرية

في أي مثلث قائم الزاوية، حيث A زاوية حادة فيه، فإنَّ

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

مثال 4



في المثلث المُجاور، إذا كان $\sin N = \frac{2}{3}$ ، فأجد $\cos N$.

$$\sin^2 N + \cos^2 N = 1$$

مُطابقة فيثاغورس

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cos^2 N = 1$$

$$\sin N = \frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{9} + \cos^2 N = 1$$

بالتربيع

$$\cos^2 N = \frac{5}{9}$$

بطرح $\frac{4}{9}$ من طرفي المعادلة

$$\cos N = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين


بما أنَّ جيب التمام للزاوية N في المثلث قائم الزاوية LMN هو ناتج قسمة طول الضلع المُجاور على الوتر، وبما أنَّ الأطوال لا يمكن أن تكون سالبة، فإنَّ $\cos N$ قيمة موجبة؛ أي

$$\cos N = \frac{\sqrt{5}}{3}$$


أتعلم

قيمة كل من الجيب، وجيب التمام، والظل موجبة لأي زاوية حادة.

أتحققُ من فهمي



في المثلث المجاور، إذا كان $\sin A = \frac{4}{5}$ ، فأجد $\cos A$.



تُعدُّ الزوايا الحادَّات في أي مُثلَّث قائم الزاوية مُتَتَامِتَين.

ولكن، ما العلاقة بين نسبهما المُثَانِيَة؟

في المثلث المجاور، ألاحظ أنَّ:

$$\sin A = \frac{a}{c}, \cos A = \frac{b}{c}, \sin B = \frac{b}{c}, \cos B = \frac{a}{c}$$

ومن ثم، يمكن استنتاج أنَّ جيب الزاوية الحادَّة في المثلث قائم الزاوية يساوي جيب تمام مُتممِّتها، وأنَّ جيب تمام الزاوية الحادَّة في المثلث قائم الزاوية يساوي جيب مُتممِّتها.

الجيب وجيب التمام للزوايا المُتَتَامَة

مفهوم أساسيٌّ

إذا كان A و B زاويتين مُتَتَامَتَين في مُثلَّث قائم الزاوية، فإنَّ:

$$\sin A = \cos (90^\circ - A) = \cos B \quad \sin B = \cos (90^\circ - B) = \cos A$$

$$\cos A = \sin (90^\circ - A) = \sin B \quad \cos B = \sin (90^\circ - B) = \sin A$$

مثال 5

إذا كان $\sin 56^\circ = 0.829$ ، فأجد $\cos 34^\circ$.

$$\cos A = \sin (90^\circ - A)$$

تعريفُ الجيب وجيب التمام للزوايا المُتَتَامَة

$$\cos 34^\circ = \sin (90^\circ - 34^\circ)$$

$$\cos 34^\circ = \sin (90^\circ - 34^\circ)$$

$$\cos 34^\circ = \sin 56^\circ$$

$$\cos 34^\circ = \sin 56^\circ$$

$$\sin 56^\circ = 0.829$$

$$\cos 34^\circ = 0.829$$




أتحققُ من فهمي

إذا كان $\cos 20^\circ = 0.9397$ ، فأجد $\sin 70^\circ$.

أذكُر

الزوايا المُتَتَامَات هما زوايا مجموع قياسيهما 90° .

أجد قيمة النسب المثلثية للزاوية A في كل مما يأتي، تاركًا إجابتي في صورة كسرٍ:



أجد قيمة كل مما يأتي باستعمال الآلة الحاسبة، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب ثالث منازل عشرية:

4 $\sin 43^\circ$

5 $\sin 67.2^\circ$

6 $\sin 90^\circ$

7 $\cos 80^\circ$

8 $\cos 22^\circ$

9 $\cos 90^\circ$

10 $\tan 20^\circ$

11 $\tan 45^\circ$

12 $\tan 30^\circ$

13 $4 \sin 63^\circ$

14 $7 \tan 52^\circ$

15 $9 \cos 8^\circ$

16 $\frac{5}{\sin 31^\circ}$

17 $\frac{3}{\tan 64^\circ}$

18 $\frac{7}{\cos 60^\circ}$

أجد قياس $\angle B$ الحادّة في كل مما يأتي، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجةٍ:

19 $\sin B = 0.5$

20 $\sin B = 0.999$

21 $\sin B = 0.877$

أجد قياس $\angle N$ الحادّة في كل مما يأتي، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجةٍ:

22 $\cos N = 0.2$

23 $\cos N = 0.5$


24 $\cos N = 0.999$

أجد قياس $\angle M$ الحادّة في كل مما يأتي، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب عشر درجةٍ:

25 $\tan M = 0.6$

26 $\tan M = 2.67$

27 $\tan M = 4.38$




في المثلث المُجاور، إذا كان $\cos A = \frac{8}{17}$ ، فأجد $\sin A$. 28

إذا كان $\sin 35^\circ = 0.57358$ ، فأجد $\cos 55^\circ$. 29

إذا كان $\sin 12^\circ = 0.9781$ ، فأجد $\cos 78^\circ$ ، و $\sin 12^\circ$. 30



مهارات التفكير العليا



تبرير: أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل المُجاور للإجابة عن الأسئلة الآتية، مبرراً إجابتي:

أحد النسب المثلثية المتساوية في الشكل. 31

ما قياس كل من الزوايا X ، والزاوية Z ? 32


أكتب استنتاجاً بناءً على إجابتي عن السؤالين السابقين. 33

تبرير: إذا كان ΔLMN قائم الزاوية في M ، فأثبت صحة كل مبادئه مما يأتي:

34 $\sin L < 1$

35 $\cos L < 1$

تحدد: معتدلا الشكل الآتي، أثبت أن $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$. 36



تطبيقات النسب المثلثية

Applications of Trigonometric Ratios

استعمال النسب المثلثية لإيجاد قياسات مجهولة في المثلث.

فكرة الدرس




زاوية الارتفاع، زاوية الانخفاض.

المصطلحات



مسألة اليوم




يبين الشكل المجاور رافعة، في نهاية ذراعها حبل متين يرفع حاوية كبيرة. إذا كانت الزاوية بين الجبل والذراع 54° ، وكان بعد الحاوية عن بداية الذراع 3.5 m ، فأجد طول ذراع الرافعة.

استعمال النسب المثلثية لإيجاد قياسات مجهولة في المثلث

يمكن استعمال النسب المثلثية لإيجاد أطوال أضلاع مجهولة في المثلث في كثير من السياقات الحياتية والعلمية.

مثال 1: من الحياة



بناء: يبيّن الشكل المجاور الممر المنحدر الخاص بذوي الإعاقة الحركية في أحد الأبنية. إذا كان ارتفاع نهاية هذا الممر عن سطح الأرض هو 45 cm ، وكانت الزاوية التي يصنعها الممر مع الأرض هي 4.8° ، فأجد طوله، مُقرّباً إجابتي إلى أقرب عدد صحيح.

الاحظ من الشكل أنَّ الزاوية المقيسة هي 4.8° ، ولتكن A ، وأنَّ طول الضلع المُقابل لها هو 45 cm ، وأنَّ الضلع المجهول هو الوتر، ولتكن d ؛ لذا أستعمل نسبة الجيب لإيجاد طول الممر المنحدر.

$$\sin A = \frac{\text{(المُقابل)}}{\text{(الوتر)}}$$

نسبة الجيب

$$\sin 4.8^\circ = \frac{45}{d}$$

بالتعويض

$$d(\sin 4.8^\circ) = 45$$

بضرب طرف المعادلة في d

$$d = \frac{45}{\sin 4.8^\circ}$$

بقسمة طرف المعادلة على $\sin 4.8^\circ$

$$d \approx 538$$


باستعمال الآلة الحاسبة

أفّكر

هل يمكن استعمال نسبة مُثلثة أخرى لإيجاد طول الممّر المُنحدر؟ أبّرّ إجابتي.

إذن، طول الممّر المُنحدر هو 538 cm تقريباً.

أتحقق من فهمي




يُبيّن الشكل المجاور برج اتصالات، طول ظله 10 m. إذا كانت الزاوية التي تصنّعها أشعة الشمس مع نهاية الظل على سطح الأرض هي 72°، فأجد ارتفاع البرج.

تعلّمتُ في المثال السابق استعمال النسب المُثلثة لإيجاد قياسات مجهولة في المثلث. والآن سأتعلّم كيف أجد قياسات زوايا مجهولة في المثلث باستعمال النسب المُثلثة ومعكوس النسب المُثلثة.

مثال 2

أجد قياس $\angle A$ في كل مُثلث مما يأتي، مقرّباً إجابتي إلى أقرب عشرة درجة:

1



بما أنّ طول الضلع المُقابل لـ $\angle A$ وطول الوتر معلومان، فإنّني أستعمل الجيب:

$$\sin A = \frac{3}{10}$$

تعريف الجيب

$$m\angle A = \sin^{-1} \left(\frac{3}{10} \right)$$

معكوس الجيب

الوحدة 5


والآن أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد $\sin^{-1}\left(\frac{3}{10}\right)$ كما يأتي:

SHIFT sin (3 ÷ 10) = 17.4576031237

بالتقرير إلى أقرب عشر درجة، فإن النتيجة هي: 17.5°

إذن، $m\angle A \approx 17.5^\circ$.

2



بما أن طول الضلع الملاجئ لـ $\angle A$ وطول الوتر معلومان،
فإنني أستعمل جيب التمام:

$$\cos A = \frac{5}{8} \quad \text{تعريف جيب التمام}$$

$$m\angle A = \cos^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \quad \text{معكوس جيب التمام}$$

والآن أستعمل الآلة الحاسبة لإيجاد $\cos^{-1}\left(\frac{5}{8}\right)$ كما يأتي:

SHIFT cos (5 ÷ 8) = 51.3178125465


بالتقرير إلى أقرب عشر درجة، فإن النتيجة هي: 51.3°

إذن، $m\angle A \approx 51.3^\circ$.


أتحقق من فهمي

أجد قياس $\angle L$ في كل مثلث مما يأتي، مقررا إجابتي إلى أقرب عشر درجة:


a)




b)



c)




استعمال النسب المثلثية في المثلثات الخاصة



يُبيّن الشكل المجاور المثلث $90^\circ - 45^\circ - 45^\circ$ ، وهو مُثلث قائم الزاوية، ومُتطابقُ الضلعين.

يمتاز هذا المثلث بأن طول وتره يساوي $\sqrt{2}$ مَرَّة طول كل ساق من ساقيه.



أما الشكل المجاور فيُبيّن المثلث $90^\circ - 60^\circ - 30^\circ$ الذي يمتاز بأن طول وتره يساوي مثلي طول الساق المُقابلة للزاوية 30° ، وبأن طول الساق المُقابلة للزاوية 60° يساوي $\sqrt{3}$ مَرَّة طول الساق المُقابلة للزاوية 30° .

أتعلّم

بكلماتٍ أخرى، فإنَّ طول الضلع المُقابل للزاوية 30° في المثلث $60^\circ - 30^\circ - 90^\circ$ يساوي نصف طول الوتر.


تُستعمل النسب المثلثية للزوايا الخاصة: $45^\circ, 30^\circ, 60^\circ$ لإيجاد قياسات مجهولة في المثلث. وفي ما يأتي تلخيص لهذه النسب.

النسب المثلثية للزوايا الخاصة

مفهوم أساسيٌّ

المثلث	الجيب	جيب التمام	الظل
	$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\tan 45^\circ = 1$
	$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$	$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$ $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

الوحدة 5



مثال 3

أجد قيمة x في المثلث المُجاور.

نسبة جيب التمام

$$\cos A = \frac{(\text{المُجاور})}{(\text{الوتر})}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{x}{100}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{100}$$


$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{100\sqrt{3}}{2} = x$$

بضرب طرفي المعادلة في 100

$$x = 50\sqrt{3}$$



بالتبسيط



أتحقق من فهمي


أجد قيمة x في المثلث المُجاور.

يُطلق على الزاوية المحصورة بين خط النظر إلى الأعلى والخط الأفقي اسم زاوية الارتفاع (angle of elevation)، مثل الزاوية المحصورة بين خط النظر من سطح الأرض إلى طائرة في السماء والخط الأفقي. ويُطلق على الزاوية المحصورة بين خط النظر إلى الأسفل والخط الأفقي اسم زاوية الانخفاض (angle of depression)، مثل الزاوية المحصورة بين خط النظر من منارة إلى سفينة في البحر والخط الأفقي.




يمكن استعمال زوايا الارتفاع والانخفاض لإيجاد قياسات مجهولة في المثلث قائم الزاوية.

مثال 4 : من الحياة



قارب: ينظر على من أعلى جرف إلى قارب في البحر بزاوية انخفاض مقدارها 42° . إذا كان ارتفاع الجرف عن سطح البحر هو 100 m، فأجد بعده القارب عن قاعدة الجرف.



افتراض أن زاوية الانخفاض هي A ، وأن بعده القارب عن قاعدة الجرف هو x :

$$\tan A = \frac{\text{(المقابل)}}{\text{(المجاور)}}$$

نسبة الظل

$$\tan 42^\circ = \frac{100}{x}$$

بالتعمير

$$x \tan 42^\circ = 100$$

بضرب طرف المعادلة في x

$$x = \frac{100}{\tan 42^\circ}$$


بقسمة طرف المعادلة على $\tan 42^\circ$

$$x \approx 111$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، بعده القارب عن قاعدة الجرف هو 111 m تقريرًا.

أتحقق من فهمي












طائرة: رصدت ليلي طائرة في السماء بزاوية ارتفاع مقدارها 21° لحظة مرورها فوق سطح أحد المنازل. إذا كان بعده ليلي عن المنزل هو 3.8 km، فأجد ارتفاع الطائرة عن المنزل.







أتعلم
الخط الأفقي ومستوى سطح البحر مُتوازيان؛ لذا فإن الزاوية المحصورة بين خط النظر والخط الأفقي والزاوية المحصورة بين خط النظر وسطح البحر مُتبايلتان داخلياً، إذن، فهما متطابقان.




أجد قيمة x في كل مثلث مما يأتي، معتبرا إجابتي إلى أقرب جزء من مئة:






أجد قيمة x في كل مثلث مما يأتي، معتبرا إجابتي إلى أقرب عشر درجة:






16) وضعَ هوائيًّا بِثُ فوَقَ بُرجَ مُحَطَّةً إِذاعِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ سَلَكٌ دَاعِمٌ طُولُهُ 76 m لِسَبِيلِ طَرْفِ الْهَوَائيِّ بِسَطْحِ الْأَرْضِ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ. إِذَا كَانَ ارْتِفَاعُ الْبُرجِ وَالْهَوَائيِّ هُوَ 60 m، فَأَجِدُ قِيَاسَ الزَّاوِيَّةِ بَيْنَ السَّلَكِ وَسَطْحِ الْأَرْضِ مُقْرَبًا إِجَابَتِي إِلَى أَقْرَبِ عُشْرِ درَجَةٍ.


أَسْتَعْمَلُ النَّسْبَ المُثَلَّثِيَّ لِإِيجَادِ قِيمَةِ x فِي كُلِّ مُثَلَّثٍ مِمَّا يَأْتِي:




20) يُبَيَّنُ الشَّكْلُ الْآتِي ΔABC . أَسْتَعْمَلُ الْمَعْلُومَاتِ الْمُعَطَّةَ فِي الشَّكْلِ لِإِيجَادِ أَقْصَرِ مَسَافَةِ بَيْنَ النَّقْطَيْ B وَ \overline{AC} .



21) يُبَيَّنُ الشَّكْلُ الْآتِي الْمُرَبَّعَ $ABCD$ الَّذِي طُولُ ضَلْعِهِ 40 cm. إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ P تَقْعُدُ دَاخِلَ الْمُرَبَّعِ كَمَا فِي الشَّكْلِ، فَأَجِدُ بُعْدَ هَذِهِ النَّقْطَةِ عَنْ كُلِّ مِنْ \overline{AB} ، \overline{AD} ، وَ \overline{CD} .



الوحدة 5




22. وضع سلم على أحد أطراف مبنيٍ كما في الشكل المجاور، وكانت الزاوية التي يصنعها السلم مع الأرض هي 75° ؛ لتجنب السقوط عنه. أجد ارتفاع طرف السلم عن سطح الأرض في هذه الحالة إذا كان طوله 6 m.

23. وقف عصفور على شجرة ارتفاعها 12 m، مراقباً دودةً على سطح الأرض بزاوية انخفاضٍ مقدارها 34° . أجد المسافة بين الدودة والعصفور.


24. أحل المسألة الواردة بدايةً الدرس.

مهارات التفكير العليا

تبرير: أجد قيمة x في الشكل الآتي، مبرراً إجابتي.




25. تحد: يُبيّن الشكل الآتي خماسيًّا مُتظِّماً، طول نصف قطره 7. أستعمل المعلومات المعلوّمة المعطاة في الشكل لإيجاد مساحة الخماسي.




اختبار نهاية الودة


أجد قيمة x في كل مما يأتي:




أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:




- a) 9 b) 21 c) 45 d) 63



في الشكل المجاور، إذا كانت النقطة P هي مركز 2




- a) $PA = PB$
 - b) $YA = YB$
 - c) $PX = PY$
 - d) $AX = BZ$




أجْدُ إِحْدَائِيًّا مَلْقَى ارْتِفَاعَاتِ الْمُتَلَّثِ الْمُعَطَّةِ إِحْدَائِيًّا
رَؤُوسِهِ فِي كُلِّ مَا يَأْتِي:

- 9 $L(0, 5), M(3, 1), N(8, 1)$
10 $A(-4, 0), B(1, 0), C(-1, 3)$

جِبُّ تَمَامِ الزَّاوِيَّةِ 3
فِي الشَّكْلِ الْمُجاوِرِ
يُسَاوِي:



- a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{3}{4}$
c) $\frac{4}{5}$ d) $\frac{5}{4}$







في الشكل المُجاور،
 $DF = 24$, إذا كان: $BC = 6$, $DB = 8$


فأجد محيط ADF المُثلث

اختبار نهاية الوحدة

أجد قيمة x في كل مُثلثٍ ممّا يأتي، مقرّباً إجابتي إلى أقرب جزءٍ من عشرةٍ:




إذا كانت النقطة G هي مركز ΔABC المُبيَّن في الشكل الآتي، فاستعمل المعلومات المُعطاة في الشكل لإيجاد كل قياسٍ ممّا يلي:



11 FC

12 BF

13 يظهر ΔABC في المستوى الإحداثي المجاور. أجد إحداثيَّ مركز هذا المُثلث.




إذا كانت $(A, 1, 3)$ ، $B(1, 9)$ ، وكانت $(9, 1)$ فإنَّ النقطة التي تقع على المُنْصَف العموديِّ لـ \overline{AB} هي:

a) $(3, 3)$

b) $(1, 6)$

c) $(6, 6)$

d) $(3, 12)$




26 الوصفُ الصحيحُ لـ \overline{LN} في الشكلِ المجاورِ هو:

(b) قطعةٌ مُتوسِّطةٌ.

(a) مُنْصَفٌ عموديٌّ.

(d) ارتفاعٌ.

(c) مُنْصَفٌ زاويٌّ.



27 رُصدَ قارِبُ في البحْرِ منْ أعلى قِمَّةٍ

جُرْفٌ بزاوية انخفاضٍ مقدارُهَا 52° . إذا كانَ ارتفاعُ الجُرْفِ عن سطح البحْر 200 m ، فأجدُ بُعدَ القارِبِ عن قاعدةِ الجُرْفِ.

إذا كانت $\angle A$ زاويةٌ حادَّةٌ في مُثلثٍ، وكان $\cos A = \frac{4}{7}$ ، فأجد $\sin A$.

أجد قيمةَ كُلِّ ممّا يأتي باستعمالِ الآلةِ الحاسِبةِ، مقرّباً إجابتي إلى أقربِ ثلَاثٍ منازلٍ عشريةٍ:



15 $\sin 5^\circ$

16 $\sin 81^\circ$

17 $\cos 33^\circ$

18 $\tan 70^\circ$

أجدَّ قيمَ النسبِ المُثلَّثِيَّةِ الثلاثِيَّةِ E في كُلِّ ممّا يأتي:



المقادير الأسيّة والمقادير الجذرية

Exponential and Radical Expressions

ما أهميّة هذه الوحدة؟

تُسْتَعْمَلُ المقادير الأسيّة والمقادير الجذرية لنمذجة كثيّر من المواقف الحياتيّة والعلميّة، ويُمْكِنُ توظيفُ المعادلات الجذرية في تحديد قيم علميّة دقيقّة، مثل: سرعة الصوت، والزمن الذي يستغرقه البندول في أثناء حركته التذبذبيّة ذهاباً وإياباً.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ استعمال قوانين الأسس الصحيحة لتبسيط مقادير أسيّة.
- ◀ تبسيط المقادير الجذرية.
- ◀ إجراء العمليات على المقادير الجذرية.
- ◀ حلّ معادلات تحوي جذوراً.

تعلّمتُ سابقاً:

- ✓ تبسيط مقادير جبرية تحوي جذوراً صماء.
- ✓ استعمال قوانين الأسس الصحيحة لتبسيط مقادير أسيّة.
- ✓ استعمال قوانين الأسس النسبية لتبسيط مقادير أسيّة.
- ✓ حلّ المعادلات الخطية والمعادلات التربيعية.

مشروع الوحدة

المُجَسَّمَاتُ وَالْمَقَادِيرُ الْأُسْسِيَّةُ وَالْجَذْرِيَّةُ

تصميم مجسماتٍ، وتوظيف المقادير الأساسية والمقادير الجذرية في التعبير عن أبعادها.

فكرة المشروع



قطعٌ من البوليستر، أدواتٌ هندسية، مقصٌ.


المواد والأدوات




خطوات تنفيذ المشروع:

المهمة 1:

- أصنُع من قطع البوليستر مكعباً، وأعُبِّر عن طوله بمقدار a يحوي مُتغيّرٍ على الأقل.
- أجُد حجم المكعب ومساحة سطحه في أبسط صورة بدلالة مُتغيّرات المقدار الأساسية.
- أُنْشِئ في وسط المكعب متوازي مستطيلات قاعدته مُربعة، وطول ضلعها يقُول بمقدار 5 cm عن طول ضلع المكعب.
- أجُد حجم متوازي المستطيلات الذي أنشأته في الخطوة السابقة.
- أجُد مساحة سطح المكعب بعد إنشاء متوازي المستطيلات داخله في أبسط صورة.
- أعُبِّر عن طول ضلع المكعب بمقدار جبري آخر، وليكن مقداراً جذرياً.
- أجُد حجم المكعب ومساحة سطحه بدلالة المقدار الجذري في أبسط صورة.



المهمة 2:



- أصنُع من قطع البوليستر هرماً قاعدته مُربعة.
- أقُصُّ الهرم من الأعلى بموازاة القاعدة كما في الشكل المجاور.
- أجُد علاقةً يمكنُ بها إيجاد الارتفاع الجانبي للمجسم، مفترضاً أنَّ طول قاعدته الكبيرة هو b_1 ، وطول قاعدته الصغيرة هو b_2 ، وارتفاعه هو h ، وارتفاعه الجانبي هو ℓ .
- أقيس طول القاعدة الكبيرة، وطول القاعدة الصغيرة، والارتفاع الجانبي للمجسم إلى أقرب سنتيمتر، ثم أستعمل العلاقة التي توصلت إليها في الفرع السابق لإيجاد ارتفاع المجسم.

عرض النتائج:

- أعد عرضاً تقديميًّا يتضمن صوراً تُوضّح خطوات العمل في المشروع.
- أعرض المجسمات التي صمّمتها أمام طلبة الصف، موضحاً كيف وظفت ما تعلّمته في الوحدة في تنفيذ هذا المشروع.

تبسيط المقادير الأُسّيَّةِ

Simplifying Exponential Expressions


فكرة الدرس



مسألة اليوم



استعمال خصائص الأسس الصحيحة لتبسيط مقادير أُسّيَّةٍ.



يُبيّن الشكل المجاور مُكعبًا طول ضلعه $u^4 v^3$ وحدةً. أجد حجم المُكعب بدلالة u و v في أبسط صورةٍ.

تبسيط المقادير الأُسّيَّةِ باستعمال خصائص ضرب القوى

تعلّمتُ سابقاً كيف أستعمل الأسس للتعبير عن الضرب المُتكرّر لعدٍ في نفسه. وتعلّمتُ أيضاً أنَّ عددَ مراتِ تكرار الضرب يُسمّى الأساس، وأنَّ العدد نفسه يُسمّى الأساس، وأنَّ كُلّاً من الأساس والأسّ معًا يُسمّى القوَّةَ.

$$3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$$

أسس أسس
أساس أساس

الصيغة الأُسّيَّةُ

مراجعة المفهوم

إذا كان a عدداً حقيقياً، وكان n عدداً صحيحاً موجباً، فإنَّ:

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times a \times \dots \times a}_{\text{مرّة}} \quad n$$

حيثُ:

a : الأساس.

n : الأس.

أتذكّر

الصيغة الأُسّيَّةُ هي صيغة يُكتبُ فيها الضرب المُتكرّر باستعمال الأساس.

تعلّمتُ أيضاً كيف أستعمل خاصيَّةَ ضرب القوى، وقوَّةَ القوَّةِ، وقوَّةَ ناتجِ الضرب إذا كان الأساس عدداً حقيقياً. والآن سأتعلّمُ كيف أستعمل خصائص ضرب القوى هذه لتبسيط مقادير أُسّيَّةٍ تحوي مُتغيّراتٍ.

الوحدة 6

خصائص ضرب القوى

مفهوم أساسٍ

إذا كان a و b عددين حقيقيين أو مقدارين جبريين، وكان m و n عددين صحيحين، فإنَّ

الخاصية

مثال

1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ضرب القوى $x^3 \times x^7 = x^{3+7} = x^{10}$

2) $(a^m)^n = a^{mn}$ قوة القوة $(y^4)^5 = y^{4 \times 5} = y^{20}$

3) $(ab)^m = a^m b^m$ قوة ناتج الضرب $(6g)^3 = 6^3 g^3 = 216 g^3$

يكون المقدار الأسّي في أبسط صورة إذا توافرت فيه شروط معيّنة.

أبسط صورة للمقدار الأسّي

مفهوم أساسٍ

يكون المقدار الأسّي في أبسط صورة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- أن يظهر الأساس مَرَّةً واحدةً فقط، وأن تكون الأسّسُ جميعُها موجبةً، وصحيحةً في المقامِ.
- ألا يتضمن المقدار قوة القوة.
- أن تكون الكسور جميعُها في أبسط صورةٍ.

أتعلم

كتابة المقدار الأسّي في أبسط صورة تتطلّب كتابة مقدار مُكافِئ للمقدار الأسّي، تتوافر فيه الشروط الواردة في الصندوق المجاور.

مثال 1

أكتب كُلّاً ممّا يأتي في أبسط صورة:

1) $(3ry^5)(6r^2y^3)$

$(3ry^5)(6r^2y^3) = (3 \times 6)(r \times r^2)(y^5 \times y^3)$ بإعادة تجميع الثوابت والمُتغيّرات

$= (3 \times 6)(r^{1+2})(y^{5+3})$ ضرب القوى

$= 18r^3y^8$ بالتبسيط

أتعلم

إذا لم يظهرأسٌ فوق المُتغيّر، فإنَّأسٌ يكون؛ أي إنَّ

$$r = r^1$$

2 $((x^2)^5)^8$

$$\begin{aligned} ((x^2)^5)^8 &= (x^{2 \times 5})^8 && \text{قوَّةُ القوَّةُ} \\ &= (x^{10})^8 && \text{بالتبسيط} \\ &= x^{10 \times 8} && \text{قوَّةُ القوَّةُ} \\ &= x^{80} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

3 $(-2a^2 b)^3$

$$\begin{aligned} (-2a^2 b)^3 &= (-2)^3 (a^2)^3 b^3 && \text{قوَّةُ ناتجِ الضربِ} \\ &= -8a^6 b^3 && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

4 $(4x^5 y^3)(-3xy^5)^2$

$$\begin{aligned} (4x^5 y^3)(-3xy^5)^2 &= (4x^5 y^3)((-3)^2 (x)^2 (y^5)^2) && \text{قوَّةُ ناتجِ الضربِ} \\ &= (4x^5 y^3)(9x^2 y^{10}) && \text{قوَّةُ القوَّةُ} \\ &= (4 \times 9)(x^5 \times x^2)(y^3 \times y^{10}) && \text{بِإعادَةِ تجمِيعِ الثوابِتِ والمُنْغِيرَاتِ} \\ &= 36x^7 y^{13} && \text{ضربُ القوى} \end{aligned}$$

أتحقّقُ منْ فهمي

أكُبُ كُلَّا ممَّا يأْتِي في أبْسِطِ صُورَةٍ:

a) $(2m^5 n^{11})(m^2 n^4)$

b) $((v^2)^6)^9$

c) $(5x^3 y^7)^4$

d) $(5a^3 b^4)(ab^2)^7$

تبسيطُ المقاديرِ الأُسْسِيَّةِ باستعمالِ خصائصِ قسمةِ القوى

تعلَّمْتُ سابقاً كيَفَ أستعملُ خاصيَّةَ قسمةِ القوى، وخاصيَّةَ قوَّةِ ناتجِ القسمةِ إذا كانَ الأسسُ عدداً حقيقِيًّا. والآنَ سأتعلَّمُ كيَفَ أستعملُ هاتينِ الخاصيَّتينِ اللتينِ هما منْ خصائصِ قسمةِ القوى لتبسيطِ مقاديرِ أُسْسِيَّةٍ تحوي مُنْغِيرَاتٍ.

الوحدة 6

خصائص قسمة القوى

مفهوم أساسي

إذا كان a و b عددين حقيقيين أو مقدارين جبريين، حيث: $0 \neq a \neq 0$ و $b \neq 0$ ، وكان n عددين صحيحين، فإنَّ:

الخاصية

مثال

$$1) \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

قسمة القوى

$$\frac{x^7}{x^3} = x^{7-3} = x^4$$

$$2) \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

قوة ناتج القسمة

$$\left(\frac{6}{g}\right)^3 = \frac{6^3}{g^3} = \frac{216}{g^3}$$

مثال 2

أكتب كُلَّا ممّا يأتي في أبسط صورة، علماً بأنَّ أيَّاً منَ المُتغِيَّرات لا يساوي صفرًا:

$$1) \frac{u^2 v^6}{u v^2}$$

$$\frac{u^2 v^6}{u v^2} = \left(\frac{u^2}{u}\right) \left(\frac{v^6}{v^2}\right)$$

بإعادة تجميع المُتغِيَّرات

$$= (u^{2-1})(v^{6-2})$$

قسمة القوى

$$= u v^4$$

بالتبسيط

$$2) \left(\frac{-2x^3}{x^2 y^5}\right)^4$$

$$\left(\frac{-2x^3}{x^2 y^5}\right)^4 = \left(\frac{-2x^{3-2}}{y^5}\right)^4$$

قسمة القوى

$$= \left(\frac{-2x}{y^5}\right)^4$$

بالتبسيط

$$= \frac{(-2)^4 x^4}{(y^5)^4}$$

قوة ناتج القسمة

$$= \frac{16x^4}{y^{20}}$$

قوة العدة

أفكُر

هل يمكن حل الفرع 2 من المثال بطريقة أخرى؟
أبُرُّ إجابتي.

أتحقّق من فهمي

أكتب كُلَّا ممّا يأتي في أبسط صورة، علماً بأنَّ أيَّاً منَ المُتغِيَّرات لا يساوي صفرًا:

$$a) \frac{m^4 n^5}{m^2 n^3}$$

$$b) \left(\frac{a^8 b^6}{a^4}\right)^5$$

تبسيط المقادير الأُسّية باستعمال الأُسّ الصفرى والأسّ السالب

تعلّمتُ سابقاً أنَّ أيَّ عددٍ حقيقيٍ غير الصفرِ مرفوعاً إلى الأُسّ صفرٍ يساوي 1، وأنَّ القوَّةَ ذاتَ الأساسِ غير الصفرى والأُسّ السالبِ هي مقلوبُ القوَّةِ ذاتِ الأساسِ غير الصفرى والأُسّ الموجبِ، والعكسُ صحيحٌ. والآن سأتعلّمُ كيفَ أستعملُ هاتينِ الخاصيَّتينِ لتبسيطِ مقاديرِ أُسّيةٍ تحوي مُتغيِّراتٍ.

الأُسّ الصفرى والأُسّ السالب

مفهوم أساسىٌ

إذا كانَ a عدداً حقيقياً أو مقداراً جبرياً، حيثُ: $0 \neq a$ ، وكانَ n عدداً صحيحاً، فإنَّ:

الخاصية

مثال

$$1) \ a^0 = 1 \quad \text{الأُسّ الصفرى} \quad (2x^2)^0 = 1, x \neq 0$$

$$2) \ a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{الأُسّ السالب} \quad h^{-4} = \frac{1}{h^4}, h \neq 0$$

مثال 3

أكتبُ كُلَّ ممَّا يأتي في أبسطِ صورِهِ، علماً بأنَّ أيَّاً منَ المُتغيِّراتِ لا يساوي صفرًا:

$$1) \ \frac{4x^5 y^{-4}}{2x^3 y^2}$$

$$\frac{4x^5 y^{-4}}{2x^3 y^2} = \left(\frac{4}{2}\right) \left(\frac{x^5}{x^3}\right) \left(\frac{y^{-4}}{y^2}\right)$$

بإعادةِ تجميعِ المُتغيِّراتِ

$$= \left(\frac{4}{2}\right) (x^{5-3}) (y^{-4-2})$$

قسمةُ القوى

$$= 2(x^2)(y^{-6})$$

بالتبسيطِ

$$= 2(x^2) \left(\frac{1}{y^6}\right)$$

تعريفُ الأُسّ السالبِ

$$= \frac{2x^2}{y^6}$$

بالضربِ

الوحدة 6

2) $\frac{3x^4 y^{-1} z^{-2}}{x^2 y^0}$

$$\frac{3x^4 y^{-1} z^{-2}}{x^2 y^0} = \frac{3x^4 y^{-1} z^{-2}}{x^2}$$

$$= 3 \left(\frac{x^4}{x^2} \right) (y^{-1}) (z^{-2})$$

$$= 3(x^{4-2}) (y^{-1}) (z^{-2})$$

بِاعادةِ تجميعِ المُتغِيّراتِ

قسمةُ القوى

$$= 3(x^2) \left(\frac{1}{y} \right) \left(\frac{1}{z^2} \right)$$

تعريفُ الأُسِّ السالِبِ

$$= \frac{3x^2}{yz^2}$$

بِالضِّربِ

 أَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ فَهْمِي

أكتب كُلَّا ممّا يأتي في أبسطِ صورَةِ، علماً بأنَّ أيَّاً منَ المُتغِيّراتِ لا يساوي صفرًا:

a) $\frac{2h^3 j^{-3} k^4}{3jk}$

b) $\left(\frac{x^{-2} y^4}{x^0 y^5} \right)^{-3}$

 أَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ فَهْمِي

أَنْتَ تَعْلَمُ مِنْ فَهْمِي

1) $(3a^3 b^2)(4a^2 b)$

2) $(7a^4 b^5)(4ab^3)$

3) $(5x^2 b^4)(2ab^{-3})$

4) $(x^5 y^3)^3 (xy^5)^2$

5) $(x^4)^5 (x^3 y^2)^5$

6) $(5a^3 b^5)^4$

أكتب كُلَّا ممّا يأتي في أبسطِ صورَةِ، علماً بأنَّ أيَّاً منَ المُتغِيّراتِ لا يساوي صفرًا:

7) $(6a^2 b^3)(5a^{-4} b^{-5})$

8) $((-3x^2)^4)^{-7}$

9) $(m^{-3} n^4)^{-5}$

10) $\frac{12a^2 b^3}{6ab}$

11) $\frac{12a^{-3} b^4}{3a^2 b^{-3}}$

12) $\frac{(2a^2 bc^2)(6abc^3)}{4ab^0 c}$

13) $\left(\frac{v}{w^{-2}} \right)^3$

14) $\left(\frac{6x^2 y^4}{3x^4 y^3} \right)^{-2}$


15) $\frac{30a^{-2} b^{-6}}{60a^{-6} b^{-8}}$

أتذَكَّرُ


إذا كانَ a و b عدديَّنْ
 حقيقيَّيْنْ أوْ مقدارَيْنْ
 جرِيَّيْنْ، حيثُ: $a \neq 0$
 و $0 \neq b$ ، وكانَ m عدداً
 صحيحاً، فإنهُ يُمْكِنُ كتابة
 $\left(\frac{a}{b} \right)^{-m}$ بالصورةِ الآتية:
 $\cdot \left(\frac{b}{a} \right)^m$

أجُد مساحةَ كُلّ شكلٍ ممّا يأتي في أبسطِ صورَةِ:

16



17



أُحْلِيَّ المسألَةَ الواردةَ بدايةَ الدرسِ.

18



مهاراتُ التفكيرِ العليا



أَكْتَشِفُ الْخَطَاً: أَكْتَشِفُ الْخَطَاً فِي الْحَلِّ الْآتِيِّ، ثُمَّ أَصْحِحُهُ.

19

$$\begin{aligned}
 \frac{2a^2b}{(-2ab^3)^{-2}} &= \frac{2a^2b}{(-2)^{-2}a(b^3)^{-2}} \\
 &= \frac{2a^2b}{4ab^{-6}} \\
 &= \frac{2a^2bb^6}{4a} \\
 &= \frac{ab^7}{2}
 \end{aligned}$$

X


20

مسألَةٌ مفتوحةٌ: أجُدُّ مقدارِينِ أُسْسَيْنِ ناتِجٍ ضرِبِيْمَا هُوَ $18x^3 y^4$ (أُحْلِيَّ المسألَةَ بِطَرِيقَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ).

تَحْدِيدٌ: إِذَا كَانَ $y = x^n$ ، فَأُجِيبُ عَنِ السُّؤَالَيْنِ الْآتِيَيْنِ تَبَاعَّاً:

$$x^{2n+1} = xy^2 \quad \text{أُثِبُّ أَنَّ} \quad 21$$

$$x^{2n-1} \quad \text{أَجُدُّ مقدارًا بدلالةِ} \quad x \quad \text{و} \quad y \quad \text{يُكَافِيُ المُقْدَارَ} \quad 22$$




تَبَرِيرٌ: يُعبَّرُ المُقْدَارُ $27\pi x^8$ عَنْ حَجْمِ الْمِخْرُوطِ الْمُجاوِرِ بِالْوَحْدَاتِ الْمُكَعَّبِيَّةِ.
أَكْتُبُ مقدارًا جُبْرِيًّا أُسْسَيًّا بدلالةِ x يُعبَّرُ عَنْ كُلِّ مِنْ r, h, x مُبِرًّا إِجَابَتِي.

23

العمليات على المقادير الجذرية

Operations with Radical Expressions



$5 - \sqrt{10} \text{ cm}$

• تبسيط المقادير الجذرية.

• إجراء العمليات على المقادير الجذرية.

• المقادير الجذرية، إنطاق المقام، المُرافق.

يُبيّن الشكل المجاور مُثلاً مساحته 20 cm^2 . أجد ارتفاع المُثلث في أبسط صورة.

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



تبسيط المقادير الجذرية باستعمال خاصية الضرب

يُطلق على المقادير العدديّة أو المقادير الجبرية التي تحوي جذوراً اسم **المقادير الجذرية** (radical expressions)، ويكونُ كُلّ منها في أبسط صورة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- لا يتضمنَ أي مُجذورٍ عواملٍ (ما عدا العدد 1) يمكنُ كتابتها في صورة قوى دليل الجذر.
- لا يتضمنَ أي مُجذورٍ كسروًأ.
- لا يتضمنَ أي كسرٍ مقاماً يحوي جذوراً.

تعلّمتُ في الصّفّ الثامن خاصية ضرب الجذور التّربيعية. والآن سأتعلّمُ كيف أستعملُ هذه الخاصية لتبسيط المقادير الجذرية، علماً بأنّه يمكنُ بطريقة مُشابهة ضربُ أي جذرٍ لهما الدليل نفسه.

خاصية ضرب الجذور

مفهوم أساسيٌّ

لأي عددين حقيقيين a و b ، ولأي عدد صحيح n ، حيث $n > 1$:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} \quad (1)$$

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} \quad (2)$$

$$\sqrt{4 \times 5} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} = 2\sqrt{5} \quad , \quad \sqrt[3]{27 \times 4} = \sqrt[3]{27} \times \sqrt[3]{4} = 3\sqrt[3]{4}$$

أذكّر

رمز الجذر



المُجذور

إذا أردت تبسيط جذر زوجي لمقدار جبري أُس زوجي، وكان أُس المقدار الجبري الناتج من التبسيط فردياً، فإنه يتعين أخذ القيمة المطلقة للناتج، وبذلك لا يكون الجواب عدداً سالباً؛ لأنَّ الجذور الزوجية لا تكون سالبة، مثل:

$$\sqrt{x^2} = |x|, \quad \sqrt{x^4} = x^2, \quad \sqrt[4]{x^{12}} = |x^3|, \quad \sqrt[6]{(x-5)^6} = |x-5|$$

أتعلم

- إذا كان n عدداً فردياً،
 $\sqrt[n]{a^n} = a$ فإنَّ:
- إذا كان n عدداً زوجياً،
 $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ فإنَّ:

مثال 1

أكتب كلاً ممَّا يأتي في أبسط صورة:

$$1 \quad \sqrt{40x^4 y^3}, y > 0$$

$$\begin{aligned} \sqrt{40x^4 y^3} &= \sqrt{2^2 \times 2 \times 5 \times x^4 \times y^2 \times y} \\ &= \sqrt{2^2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{x^4} \times \sqrt{y^2} \times \sqrt{y} \\ &= 2 \times \sqrt{2} \times \sqrt{5} \times x^2 \times |y| \times \sqrt{y} \\ &= 2x^2 y \sqrt{10y} \end{aligned}$$

$$2 \quad \sqrt[4]{81(x+1)^{12}}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{81(x+1)^{12}} &= \sqrt[4]{3^4 \times ((x+1)^3)^4} \\ &= \sqrt[4]{3^4} \times \sqrt[4]{((x+1)^3)^4} \\ &= 3|(x+1)^3| \end{aligned}$$

$$3 \quad \sqrt[5]{m^{10} n^7}$$

$$\begin{aligned} \sqrt[5]{m^{10} n^7} &= \sqrt[5]{(m^2)^5 \times n^5 \times n^2} \\ &= \sqrt[5]{(m^2)^5} \times \sqrt[5]{n^5} \times \sqrt[5]{n^2} \\ &= m^2 n \sqrt[5]{n^2} \end{aligned}$$

أتعلم

إنَّ تحليل ما يُمكِّن تحليله في المقدار الجبري إلى عوامل مُربعة يُسَهِّل عملية تبسيط المقدار الجدري التربيعي.

أتعلم

ورد في السؤال أنَّ $y > 0$ ، لذا لا توجد ضرورة لكتابه رمز القيمة المطلقة.

أتعلم

لا أستعمل القيمة المطلقة في هذه المسألة؛ لأنَّ دليل الجذر فردي.

أتحقق من فهمي

أكتب كلاماً ممّا يأتي في أبسط صورة:

a) $\sqrt{12x^3y^2}$, $x > 0$

b) $\sqrt[6]{64(x^2 - 3)^6}$

c) $\sqrt[7]{98r^8q^9}$

تبسيط المقادير الجذرية باستعمال خاصية القسمة

تعلّمْتُ في الصف الثامن خاصية قسمة الجذور التربيعية. والآن سأتعلّمْ كيف أستعملْ هذه الخاصية لتبسيط المقادير الجذرية، علمًا بأنّه يمكن بطريقة مشابهة قسمة أي جذرٍ لهما الدليل نفسه.

خاصية قسمة الجذور

مفهوم أساسيٌّ

لأي عددين حقيقيين a و b ، ولأي عدد صحيح n ، حيث $n > 1$:

$$\cdot \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad \text{إذا كان } n \text{ عدداً زوجياً، وكان } a \geq 0, b > 0, \text{ فإن:} \quad (1)$$

$$\cdot \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad \text{إذا كان } n \text{ عدداً فردياً، وكان } 0 < b, \text{ فإن:} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2} \quad , \quad \sqrt[3]{\frac{8}{-27}} = \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{-27}} = \frac{2}{-3} \quad \text{مثال:}$$

تعلّمْتُ سابقاً أنَّ المقدار الجذري لا يكون في أبسط صورة إذا احتوى أي مقام فيه على جذور. والآن سأتعلّمْ كيف يمكن التخلص من الجذر الذي في المقام عن طريق عملية تسمى إنطاق المقام (rationalizing the denominator)، وتتضمن ضرب البسيط والمقام في مقدار جذري، بحيث لا يحوي ناتج الضرب جذوراً في المقام كما في الجدول الآتي:

المقام	ضرب البسيط والمقام في	مثال
\sqrt{a}	\sqrt{a}	$\frac{7}{\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}$
$\sqrt[n]{a^m}$	$\sqrt[n]{a^{n-m}}$	$\frac{7}{\sqrt[3]{5}} \times \frac{\sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[3]{5^2}} = \frac{7\sqrt[3]{5^2}}{5}$

مثال 2

أكتب كُلًا ممًا يأتي في أبسط صورة، علَمًا بِأَنَّ جمِيعَ الْمُتَغَيِّرَاتِ أَعْدَادٌ حَقِيقِيَّةٌ موجَّهَةٌ:

1 $\frac{\sqrt{7x}}{\sqrt{8}}$

$$\frac{\sqrt{7x}}{\sqrt{8}} = \frac{\sqrt{7x}}{\sqrt{2 \times 2^2}}$$

بتحليل ما يمكن تحليله إلى عوامل مُربعة

$$= \frac{\sqrt{7x}}{2\sqrt{2}}$$

بالتبسيط

$$= \frac{\sqrt{7x}}{2\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

بإنطاق المقام

$$= \frac{\sqrt{14x}}{4}$$

خاصية ضرب الجذور

2 $\sqrt{\frac{x}{y^5}}$

$$\sqrt{\frac{x}{y^5}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y^5}}$$

خاصية قسمة الجذور

$$= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{(y^2)^2 \times y}}$$

بتحليل ما يمكن تحليله إلى عوامل مُربعة

$$= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{(y^2)^2} \times \sqrt{y}}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \frac{\sqrt{x}}{y^2 \times \sqrt{y}}$$

بالتبسيط

$$= \frac{\sqrt{x}}{y^2 \times \sqrt{y}} \times \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$$

بإنطاق المقام

$$= \frac{\sqrt{xy}}{y^3}$$

$\sqrt{y} \times \sqrt{y} = y$

أتذكّر

إذا كان a عدداً حقيقياً،
حيث: $a \geq 0$ ، فإنّ:
 $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$
من خصائص الجذور
التربيعية.

الوحدة 6

3 $\sqrt[3]{\frac{2n}{9m}}$

$$\sqrt[3]{\frac{2n}{9m}} = \frac{\sqrt[3]{2n}}{\sqrt[3]{9m}}$$

خاصية قسمة الجذور

$$= \frac{\sqrt[3]{2n}}{\sqrt[3]{9m}} \times \frac{\sqrt[3]{3m^2}}{\sqrt[3]{3m^2}}$$

بإنطاق المقام

$$= \frac{\sqrt[3]{6nm^2}}{\sqrt[3]{27m^3}}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \frac{\sqrt[3]{6nm^2}}{3m}$$

$$\sqrt[3]{27m^3} = 3m$$

أتحقق من فهمي

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعداد حقيقة موجبة:

a) $\frac{\sqrt{5x^2}}{\sqrt{18}}$

b) $\sqrt{\frac{12x^4}{y^3}}$

c) $\sqrt[5]{\frac{7}{16x^3}}$

العمليات على المقادير الجذرية

يُطلق على الجذور التي لها الدليل نفسه والجذور نفسه اسم الجذور المتشابهة، ويُمكن جمع المقادير الجذرية وطرحها بطريقة متشابهة لطريقة جمع المقادير الجذرية وطرحها.

5 $\sqrt[3]{2c}$ ، $-4\sqrt[3]{2c}$

جذران متشابهان.

$\sqrt[3]{2c}$ ، $\sqrt{2c}$

جذران غير متشابهين.

أتذكّر

المجذور هو المقدار
العددي أو المقدار
الجيري الذي يوجد
أسفل رمز الجذر.

مثال 3

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعداد حقيقة موجبة:

1 $\sqrt[4]{162} + \sqrt[4]{2}$

$$\sqrt[4]{162} + \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{3^4 \times 2} + \sqrt[4]{2}$$

بتحليل ما يمكن تحليله إلى عوامل مرفوعة إلى الأُس 4

$$= \sqrt[4]{3^4} \times \sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{2}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 3\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{2}$$

بالتبسيط

$$= 4\sqrt[4]{2}$$

بجمع الجذور المتشابهة

2) $\sqrt[3]{24x} - \sqrt[3]{81x}$

$$\sqrt[3]{24x} - \sqrt[3]{81x} = \sqrt[3]{2^3 \times 3x} - \sqrt[3]{3^3 \times 3x}$$

بتحليل ما يمكن تحليله إلى عوامل مرفوعة إلى الأسس 3

$$= \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{3x} - \sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{3x}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 2\sqrt[3]{3x} - 3\sqrt[3]{3x}$$

بالتبسيط

$$= -\sqrt[3]{3x}$$

طرح الجذور المتشابهة

أتحقق من فهمي

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعداد حقيقية موجبة:

a) $\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{375}$

b) $\sqrt{160xy} - \sqrt{40xy}$

يمكن ضرب المقادير الجذرية وقسمتها بطريقة متشابهة لطريقة ضرب المقادير الجذرية وقسمتها.

مثال 4

أكتب كلاً من المقادير الجذرية الآتية في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعداد حقيقية موجبة:

1) $\sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{24}$

$$\sqrt[3]{9} \times \sqrt[3]{24} = \sqrt[3]{9 \times 24}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= \sqrt[3]{3^2 \times 2^3 \times 3}$$

بتحليل إلى العوامل الأولية

$$= \sqrt[3]{3^3 \times 2^3}$$

بتجميع العوامل في صورة أسسٍ تكعيبة

$$= \sqrt[3]{3^3} \times \sqrt[3]{2^3}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 3 \times 2 = 6$$

بالتبسيط

أفكّر

هل يمكن حل الفرع 1 من المثال بطريقة أخرى؟
أبرّ إجابتي.

الوحدة 6

2) $\sqrt{40} \div \sqrt{5}$

$$\sqrt{40} \div \sqrt{5} = \sqrt{\frac{40}{5}}$$

$$= \sqrt{8}$$

$$= \sqrt{2^2 \times 2}$$

$$= \sqrt{2^2} \times \sqrt{2}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

خاصية قسمة الجذور

بالتبسيط

بتحليل ما يمكن تحليله إلى عوامل مربعة

خاصية ضرب الجذور

بالتبسيط

أفڪُر

هل يمكن حل الفرع 2 من المثال بطريقة أخرى؟ أبُرُ إجابتي.

3) $(3\sqrt{5} - \sqrt{3})(2 + 4\sqrt{3})$

باستعمال خاصية التوزيع

$$(3\sqrt{5} - \sqrt{3})(2 + 4\sqrt{3}) = 3\sqrt{5} \times 2 + 3\sqrt{5} \times 4\sqrt{3} - \sqrt{3} \times 2 - \sqrt{3} \times 4\sqrt{3}$$

$$= 6\sqrt{5} + 12\sqrt{5 \times 3} - 2\sqrt{3} - 4\sqrt{3^2}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 6\sqrt{5} + 12\sqrt{15} - 2\sqrt{3} - 12$$

بالتبسيط

4) $2\sqrt[3]{2x^2y^2} \times 5\sqrt[3]{4x^5y}$

$$2\sqrt[3]{2x^2y^2} \times 5\sqrt[3]{4x^5y} = 2 \times 5 \times \sqrt[3]{2x^2y^2 \times 4x^5y}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 10 \times \sqrt[3]{2x^2y^2 \times 2^2 \times x^5y}$$

بتحليل الثوابت

$$= 10 \times \sqrt[3]{2^3 \times x^6 \times x \times y^3}$$

بتجميع العوامل في صورة
أسس تكعيبة

$$= 10 \times \sqrt[3]{2^3} \times \sqrt[3]{x^6} \times \sqrt[3]{x} \times \sqrt[3]{y^3}$$

خاصية ضرب الجذور

$$= 10 \times 2 \times x^2 \times \sqrt[3]{x} \times y$$

بالتبسيط

$$= 20x^2y\sqrt[3]{x}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

أكتب كلاً من المقادير الجذرية الآتية في أبسط صورة، علمًا بأن جميع المتغيرات أعداد حقيقة موجبة:

a) $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{80}$

b) $\sqrt{50} \div \sqrt{8}$

c) $(5\sqrt{3} - 6)(5\sqrt{3} + 6)$

d) $4\sqrt[3]{50x^2y^5} \times 2\sqrt[3]{15x^3y^2}$

يُسمى كل من $a\sqrt{b} - c\sqrt{d}$ و $a\sqrt{b} + c\sqrt{d}$ مُرافقاً (conjugate) لآخر؛ لأنَّ ناتج ضربِهما لا يحوي جذوراً. فمثلاً، كل من $\sqrt{2} + 3$ و $\sqrt{2} - 3$ هو مُرافق لآخر؛ لأنَّ:

$$(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2}) = (3)^2 - (\sqrt{2})^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$= 9 - 2$$

$$(3)^2 = 9, (\sqrt{2})^2 = 2$$

$$= 7$$

بالتبسيط

يُستعمل المُرافق لإنطاق بعض المقامات في المقادير الجذرية، وذلك بضرب البسط والمقام في مُرافق المقام، ثم تبسيط الناتج.

أتعلّم

يُسمى المقدار $a^2 - b^2$ فرقاً بين مُربعين.

مثال 5

أكتب كُلَّ ممَا يأتي في أبسط صورة، علمًا بأنَّ جميع المُتغيِّرات أعدادٌ حقيقيةٌ موجبة:

$$1 \quad \frac{2}{6 + \sqrt{3}}$$

$$\frac{2}{6 + \sqrt{3}} = \frac{2}{6 + \sqrt{3}} \times \frac{6 - \sqrt{3}}{6 - \sqrt{3}}$$

بضرب البسط والمقام في مُرافق المقام

$$= \frac{2(6 - \sqrt{3})}{6^2 - (\sqrt{3})^2}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$= \frac{2(6 - \sqrt{3})}{36 - 3}$$

$$6^2 = 36, (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$= \frac{12 - 2\sqrt{3}}{33}$$

باستعمال خاصية التوزيع، والتبسيط

أذكُر

إذا كان المقدار الجذرٌ في أبسط صورة، فإنه لا يتضمَّن مقاماً يحوي جذوراً.

$$2 \quad \frac{x}{1 - \sqrt{x}}$$

$$\frac{x}{1 - \sqrt{x}} = \frac{x}{1 - \sqrt{x}} \times \frac{1 + \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

بضرب البسط والمقام في مُرافق المقام

$$= \frac{x(1 + \sqrt{x})}{1^2 - (\sqrt{x})^2}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$= \frac{x(1 + \sqrt{x})}{1 - x}$$

$$1^2 = 1, (\sqrt{x})^2 = x$$

$$= \frac{x + x\sqrt{x}}{1 - x}$$

باستعمال خاصية التوزيع، والتبسيط

الوحدة 6

أتحقق من فهمي



أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعدادٌ حقيقةٌ موجبةٌ:

a) $\frac{7}{4 - \sqrt{5}}$

b) $\frac{8}{3 + \sqrt{x}}$

أتدرب وأحل المسائل



أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورةٍ:

1) $\sqrt{4x^6}$

2) $\sqrt[3]{a^3 b^6}$

3) $\sqrt{144x^3 y^4 z^5}, x > 0, z > 0$

4) $\sqrt[3]{-24x^{13} y^6}$

5) $\sqrt[4]{625u^5 v^8}, u > 0$

6) $\sqrt[6]{25r^6 q^8}$

7) $\sqrt[5]{160x^8 z^4}$

8) $\sqrt{121(z-2)^{14}}$

9) $\sqrt[3]{37(2x-5)^{15}}$

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعدادٌ حقيقةٌ موجبةٌ:

10) $\frac{\sqrt[3]{192x^8}}{\sqrt[3]{3x}}$

11) $\frac{5}{\sqrt[3]{9a^2}}$

12) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{9z}}$

13) $\sqrt{\frac{5x^4}{2x^2 y^3}}$

14) $\sqrt[4]{\frac{16t^4}{y^4}}$

15) $\sqrt[5]{\frac{3}{y}}$

أكتب كلاً من المقادير الجذرية الآتية في أبسط صورة، علمًا بأنّ جميع المتغيرات أعدادٌ حقيقةٌ موجبةٌ:

16) $\sqrt{8} + \sqrt{50} - \sqrt{2}$

17) $5\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54}$

18) $\sqrt[3]{54xy^3} - y\sqrt[3]{128x}$

19) $\sqrt[4]{5w^{10}} - 6\sqrt[4]{405w^6}$

20) $5\sqrt{2xy^6} \times 2\sqrt{2x^3 y}$

21) $(3 + \sqrt{7})(2 + \sqrt{6})$

22) $\sqrt[5]{8xy^7} \times \sqrt[5]{6x^6}$


23) $\frac{2\sqrt{x} \times \sqrt{x^3}}{\sqrt{9x^{10}}}$

24) $\frac{\sqrt[3]{y^6}}{\sqrt[3]{27y} \times \sqrt[3]{y^{11}}}$

25) $\frac{1}{1 + \sqrt{2}}$

26) $\frac{4}{3 - \sqrt{3}}$

27) $\frac{2\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} - 1}$



يظهر المستطيل $ABCD$ في الشكل المجاور. أستعمل المعلومات المعطاة في الشكل لإيجاد طول \overline{PQ} في أبسط صورة.

أحل المسألة الواردة بداية الدرس.



مهارات التفكير العليا



اكتشف المختلف: أي المقادير الجذرية الآتية مختلف، مبررا إجابتي؟

$$\frac{\sqrt{xy}}{y^3}$$

$$\sqrt[5]{7yx^8}$$

$$\sqrt[4]{xy^3}$$

$$\sqrt{5yx}$$

اكتشف الخطأ: اكتشف الخطأ في الحل الآتي، ثم أصححه.

$$\sqrt[6]{64h^{12}g^6} = \sqrt[6]{2^6 \times (h^2)^6 \times g^6}$$

$$= \sqrt[6]{2^6} \times \sqrt[6]{(h^2)^6} \times \sqrt[6]{g^6}$$

X

$$= 2h^2 g$$

مسألة مفتوحة: أكتب مقداراً جذرياً مكافئاً للمقدار $y^2|x|$.

32

تحدد: أجد قيمة: $\frac{\sqrt{7}}{3 + \sqrt{7}} - \frac{3}{2\sqrt{7} - 1}$ في أبسط صورة.

33

الدرس 3

حل المعادلات الجذرية Solving Radical Equations

فكرة الدرس



المصطلحات



مسألة اليوم



تعطى سرعة الصوت بالمتير كل ثانية قرب سطح الأرض بالمعادلة الآتية: $V = 20\sqrt{t + 273}$, حيث t درجة الحرارة بالسلسيوس. إذا كانت سرعة الصوت هي 340 m/s, فما درجة الحرارة عندئذ؟

المعادلات الجذرية

يُطلق على المعادلات التي تحوي مُتغيّراً تحت الجذر اسم **المعادلات الجذرية** (radical equations), ومن أمثلتها:

$$5\sqrt{x+1} = 3, \quad 2x + 3 = \sqrt{1-7x}, \quad \sqrt[3]{x+4} = -8$$

توجد أربع خطواتٍ يتبعها لحلّ المعادلات الجذرية.

خطوات حلّ المعادلات الجذرية

مفهوم أساسيٌّ

أتعلم

تتُسْجَعُ معادلة أخرى (خطيّة، أو تربيعية مثلاً) من رفع طرفي المعادلة إلى آسٌ مساوٍ للدليل الجذر، ويُمكّن حلّ هذه المعادلة باستعمال طرائق حلّ المعادلات التي تعلّمتُها سابقاً.

يمكن حلّ المعادلات الجذرية باتّباع الخطوات الآتية:

الخطوة 1: جعل الجذر وحده أحدَ طرفي المعادلة إنْ كانَ ذلكَ ضروريًّا.

الخطوة 2: رفع طرفي المعادلة إلى آسٌ مساوٍ للدليل الجذر؛ تخلصًا من الجذر.

الخطوة 3: حلّ المعادلة الناتجة.

الخطوة 4: التحققُ من صحةَ الحلّ.

مثال 1

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

1) $\sqrt{x} + 4 = 12$

المعادلة الأصلية

$$\sqrt{x} + 4 = 12$$

طرح 4 من طرف المعادلة

$$\sqrt{x} = 8$$

تربيع طرف المعادلة

$$x = 64$$

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجة في المعادلة الأصلية.

المعادلة الأصلية

$$\sqrt{x} + 4 = 12$$

بتعويض $x = 64$


$$\sqrt{64} + 4 = ?$$

بالتبسيط

$$12 = 12 \quad \checkmark$$

إذن، حل المعادلة هو: $x = 64$.

الدعم البياني:



استعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = \sqrt{x} + 4$ ، والمعادلة: $y = 12$ بيانياً، ولاحظة أن منحني المعادلتين يتقاطعان عندما $x = 64$.

2) $2\sqrt{3x + 4} = 8$

المعادلة الأصلية

$$2\sqrt{3x + 4} = 8$$

بقسمة طرف المعادلة على 2

$$\sqrt{3x + 4} = 4$$

تربيع طرف المعادلة

$$3x + 4 = 16$$

طرح 4 من طرف المعادلة

$$3x = 12$$

بقسمة طرف المعادلة على 3

$$x = 4$$

الوحدة 6

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجة في المعادلة الأصلية.

$$2\sqrt{3x+4} = 8$$

المعادلة الأصلية

$$2\sqrt{3(4)+4} = 8$$


بتعويض 4

$$8 = 8$$

بالتبسيط

إذن، حل المعادلة هو: $x = 4$.

الدعم البياني:



استعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = 2\sqrt{3x+4}$ ، والمعادلة: $y = 8$ بيانياً، ولاحظة أن منحني المعادلتين يتقاطعان عندما $x = 4$.

3) $\sqrt[3]{2x-9} - 6 = -3$

$$\sqrt[3]{2x-9} - 6 = -3$$

المعادلة الأصلية

$$\sqrt[3]{2x-9} = 3$$

بجمع 6 إلى طرفي المعادلة

$$2x - 9 = 27$$

بتكعيب طرفي المعادلة

$$2x = 36$$

بجمع 9 إلى طرفي المعادلة

$$x = 18$$

بقسمة طرفي المعادلة على 2

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجة في المعادلة الأصلية.

$$\sqrt[3]{2x-9} - 6 = -3$$

المعادلة الأصلية

$$\sqrt[3]{2(18)-9} - 6 = -3$$


بتعويض 18

$$-3 = -3$$

بالتبسيط

إذن، حل المعادلة هو: $x = 18$.

الدعم البياني:



أستعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = 3\sqrt[3]{2x-9} - 6$ ، والمعادلة: $y = -3$ بيانياً، وملحوظة أن منحنبي المعادلتين يتقاطعان عندما $x = 18$.

أتحقق من فهمي

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

a) $2 + \sqrt{x} = 8$ b) $4\sqrt{7x+1} - 2 = 14$ c) $2\sqrt[4]{x-3} = 4$

الحل الدخيل

يتوج أحياناً من رفع طرفي المعادلة إلى أس ما حل لا يتحقق المعادلة الأصلية، ويسمى **الحل الدخيل** (extraneous solution)؛ لذا يجب التتحقق دائمًا من تحقيق أي حل ناتج للالمعادلة الجذرية الأصلية.

يظهر الحل الدخيل غالباً عند حل معادلة تحوي متغيراً في كلا طرفيها.

مثال 2

أحل المعادلة: $x - 4 = \sqrt{3x - 2}$

المعادلة الأصلية

$$x - 4 = \sqrt{3x - 2}$$

بتربيع طرفي المعادلة

$$(x - 4)^2 = 3x - 2$$

مربع الفرق بين حددين

$$x^2 - 8x + 16 = 3x - 2$$

بطرح $3x$ من طرفي المعادلة، وجمع 2 إلى طرفيها

$$x^2 - 11x + 18 = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

$$(x - 9)(x - 2) = 0$$

اتذكر

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

الوحدة 6

$$x - 9 = 0 \quad \text{or} \quad x - 2 = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

$$x = 9$$

$$x = 2$$

بحل كل معادلة

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمتي x الناتجتين في المعادلة الأصلية.

عندما $x = 2$

$$x - 4 = \sqrt{3x - 2}$$

$$(2) - 4 = \sqrt{3(2) - 2}$$

$$-2 \neq 2 \quad \text{X}$$

عندما $x = 9$

$$x - 4 = \sqrt{3x - 2}$$


$$(9) - 4 = \sqrt{3(9) - 2}$$

$$5 = 5 \quad \checkmark$$

إذن، حل المعادلة هو $x = 9$.

أتعلم

من أسباب وجود حل دخيل في أثناء حل المعادلة الجذرية رفع الطرفين إلى أس زوجي؛ لأن القيم السالبة تلغى إشارتها عندئذ، ما يؤثر في الحل الأصلي.



استعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = x - 4$ ، والمعادلة: $y = \sqrt{3x - 2}$ بيانياً، ولاحظ أن منحنيي المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط عندما $x = 9$.

أتحقق من فهمي

$$\text{أحل المعادلة: } x = \sqrt{x + 6}$$

تعلمت في المثال السابق أن الحل الدخيل يظهر غالباً عند حل معادلات تحوي متغيراً في طرفي كل منها. والآن سأتعلم أن الحل الدخيل يمكن أن يظهر أيضاً عند حل معادلة تحوي جذراً في كلا طرفيها.

مثال 3

$$\text{أصل المعادلة: } \sqrt{3x+1} = \sqrt{5x} - 1$$

$$\sqrt{3x+1} = \sqrt{5x} - 1$$

المعادلة الأصلية

$$3x + 1 = 5x - 2\sqrt{5x} + 1$$

بتربيع طرف المعادلة

$$2\sqrt{5x} = 2x$$

بالتبسيط

$$\sqrt{5x} = x$$

بقسمة طرف المعادلة على 2

$$5x = x^2$$

بتربيع طرف المعادلة

$$x^2 - 5x = 0$$

بطرح $5x$ من طرف المعادلة

$$x(x - 5) = 0$$

بإخراج العامل المشترك

$$x = 0 \quad \text{or} \quad x - 5 = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

$$x = 5$$

بحل المعادلة

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمتي x الناتجتين في المعادلة الأصلية.

$$x = 0 \quad \text{عندما}$$

$$\sqrt{3x+1} = \sqrt{5x} - 1$$

$$x = 5 \quad \text{عندما}$$

$$\sqrt{3x+1} = \sqrt{5x} - 1$$

$$\sqrt{3(0)+1} \stackrel{?}{=} \sqrt{5(0)} - 1$$


$$\sqrt{3(5)+1} \stackrel{?}{=} \sqrt{5(5)} - 1$$

$$1 \neq -1 \quad \text{X}$$

$$4 = 4 \quad \checkmark$$

إذن، حل المعادلة هو: $x = 5$

الدعم البياني:




أستعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = \sqrt{3x+1}$ ، والمعادلة: $y = \sqrt{5x} - 1$ بيانياً، ولاحظة أن منحني المعادلتين يتقاطعان في نقطة واحدة فقط عندما $x = 5$.

أتحقق من فهمي

$$\text{أحل المعادلة: } \sqrt{3-x} = \sqrt{x+2} + 1$$

مثال 4: من الحياة



فيزياء: تمثل المعادلة $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$ الزمن (بالثواني) الذي يستغرقه بندول طوله L قدماً حتى يتحرك حركةً تذبذبيةً مرّةً واحدةً ذهاباً وإياباً. أجد طول البندول إذا تحرك حركةً تذبذبيةً مرّةً واحدةً ذهاباً وإياباً في 4 ثوانٍ، مقرّباً إجابتي إلى أقرب عدد صحيح.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$$

المعادلة الأصلية

$$4 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$$

بتعويض $T = 4$

$$\frac{4}{2\pi} = \sqrt{\frac{L}{32}}$$

بقسمة طرفي المعادلة على 2π

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{L}{32}}$$

بالتبسيط

$$\frac{4}{\pi^2} = \frac{L}{32}$$

بتربع طرفي المعادلة

$$\frac{128}{\pi^2} = L$$

بضرب طرفي المعادلة في 32

$$L \approx 13$$

باستعمال الآلة الحاسبة

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة L الناتجة في المعادلة الأصلية.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{32}}$$

المعادلة الأصلية

$$4 \stackrel{?}{=} 2\pi\sqrt{\frac{13}{32}}$$

بتعويض $T = 4, L \approx 13$

$$4 \approx 4 \quad \checkmark$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

معتبرًا المعادلة في المثال 4، أجد طول البندول إذا تحرّك حركةً تذبذبيةً مرتّةً واحدةً ذهابًا وإيابًا في 8 ثوانٍ، مقرّبًا إجابتي إلى أقرب منزلة عشرية واحدة.

أتدرب وأؤمّ المسائل

أحل كلاً من المعادلات الآتية:

1 $\sqrt{3x} - 5 = 7$

2 $\sqrt[3]{1 - 2x} = -3$

3 $\sqrt[4]{4x + 1} = 2$

4 $6 - \sqrt{y - 5} = 3$

5 $\sqrt{2 - x} + 3 = x + 7$

6 $\sqrt{5x + 4} = 3\sqrt{x}$

7 $\sqrt{2p + 3} = \sqrt{5p - 3}$

8 $\sqrt{4x - 1} - 4\sqrt{2 - 5x} = 0$

9 $\sqrt[3]{1 - 3x} + 5 = 3$

10 $12 - \sqrt{2v - 1} = 4$

11 $\sqrt{45 - 6n} = n - 3$

12 $\sqrt{4k - 4} = k - 1$

13 $\sqrt{x + 1} = 2 - \sqrt{x}$


14 $r + 6 = \sqrt{-4r - 19}$

15 $\sqrt[3]{7y - 2} = \sqrt[3]{y + 4}$

16 $\sqrt{5m - 16} = m - 2$

17 $\sqrt{9x^2 + 4x - 4} = 3x$


18 $\sqrt{x^2 + 5x} = \sqrt{6}$



يبين الشكل المجاور التمثيل البياني لمنحنى كل من المعادلة: $y = \sqrt{x + 3}$ ،
والمعادلة: $y = \sqrt{2x + 2}$.

أكتب معادلة حلها هو الإحداثي x لنقطة تقاطع منحنىي المعادلتين.

أحل المعادلة التي كتبتها في الفرع السابق جبرياً.



إذا كان محيط المستطيل المجاور هو 22 cm، فأجد قيمة x .

21

الوحدة 6



فيزياء: تعطى سرعة الجسم الساقط سقوطاً حراً من ارتفاع قدره d قدمًا عند وصوله سطح الأرض بالمعادلة الآتية: $v = \sqrt{64d}$, حيث v سرعة الجسم بالقدم لكل ثانية. أجد الارتفاع الذي سقط منه الجسم إذا كانت سرعته عند وصوله سطح الأرض هي 150 ft/s . 22



أصل المسألة الواردة بداية الدرس. 23



مهارات التفكير العليا



اكتشف المختلف: أي المعادلات الآتية مختلفة، مبرراً إجابتي؟ 24

$$\sqrt{x+1} + 5 = 2$$

$$\sqrt{x+1} + 7 = 10$$

$$\sqrt{x-1} + 3 = 5$$

$$\sqrt{x-1} + 8 = 10$$

اكتشف الخطأ: حلت بيان المعادلة $x = \sqrt{12 - 4x}$ على النحو الآتي، قائلة إن للمعادلة حلتين اثنتين، هما:

$x = -6$ و $x = 2$

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{12 - 4x} \\ x^2 &= 12 - 4x \\ x^2 + 4x - 12 &= 0 \\ (x - 2)(x + 6) &= 0 \\ x = 2 \quad \text{or} \quad x &= -6 \end{aligned}$$

X

اكتشف الخطأ في قول بيان، ثم أصححه.

مسألة مفتوحة: أكتب معادلة جذرية حلها هو $x = 6$. 26

اختبار نهاية الوحدة

أكتب كُلَّ ممَّا يأتي في أبْسِطِ صورَةٍ، علَمَا بِأَنَّ أَيَّاً مِّنَ
الْمُنْفَعِّلَاتِ لَا يُسَاوِي صُفْرَاً:

6) $\frac{p^{-3}}{P^{-2} q^{-9}}$

7) $(2x^{-2} y^3)^4$

8) $\left(\frac{4s^5 t^{-7}}{-2s^{-2} t^4} \right)^3$


9) $(-2r^3 s^2)^4 (3rs^5)^{-2}$

10) $\frac{x^4 y^{-8} z^{-2}}{x^{-1} y^6 z^{-10}}$

11) $\left(\frac{x^{-3} y}{xz^{-4}} \right)^{-2}$

12) $\left(\frac{m^4 n^{-1}}{n^{-2}} \right)^0$



13) $\left(\frac{2a^3 b^{-2}}{c^3} \right)^5$



أَجِدْ مَسَاحَةَ الْمُثَلَّثِ
الْمُجاوِرِ فِي أَبْسِطِ
صُورَةٍ.

أَجِدْ حَجْمَ كُلِّ شَكْلٍ مِّمَّا يأتي في أَبْسِطِ صُورَةٍ:

15)



أَخْتَارُ رِمْزَ الْإِجَابَةِ الصَّحِيحَةِ لِكُلِّ ممَّا يأتي:

1) أَبْسِطُ صُورَةٍ لِلْمَقْدَارِ $\frac{(2x^2)^3}{12x^4}$ هِيَ:

a) $\frac{2x^2}{3}$

b) $\frac{2x}{3}$

c) $\frac{1}{2x^2}$

d) $\frac{x}{2}$

2) أَبْسِطُ قِيمَةٍ لِلْمَقْدَارِ $\sqrt[3]{-24a^5}$ هِيَ:

a) $2a\sqrt[3]{3a^2}$

b) $2a^2\sqrt[3]{3a^2}$

c) $-2a\sqrt[3]{3a^2}$

d) $-2a^2\sqrt[3]{3a^2}$

3) أَبْسِطُ قِيمَةٍ لِلْمَقْدَارِ $\sqrt[4]{\frac{16t^4}{y^8}}$ هِيَ:

a) $\frac{2t}{y}$

b) $\frac{2|t|}{y}$

c) $\frac{2t}{y^2}$

d) $\frac{2|t|}{y^2}$

4) أَبْسِطُ قِيمَةٍ لِلْمَقْدَارِ $\sqrt{20x^3} + \sqrt{45x^3}$ هِيَ:

a) $5x\sqrt{5x^3}$

b) $5|x|\sqrt{5x}$

c) $5\sqrt{5x^3}$

d) $5\sqrt{5x}$

5) حَلُّ الْمَعَادِلَةِ: $\sqrt{3x - 11} + 2 = 9$ هُوَ:

a) 44

b) 6

c) 20

d) 22

اختبارٌ نهايةِ الوحدة

أحْلُّ كُلَّاً مِنَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ:

36) $\sqrt{b-5} = 2$

37) $17 = 7 + \sqrt{5x}$

38) $\sqrt{3n+25} = \sqrt{-7-n}$

39) $\sqrt{21} - \sqrt{5x-4} = 0$


40) $4\sqrt[3]{2x+11} - 2 = 10$

41) $\sqrt[4]{3-x} = 3$


42) $\sqrt{2x+5} - \sqrt{3x-2} = 1$

43) $\sqrt{2x-7} = \sqrt{3x-12}$

تدريبٌ على الاختباراتِ الدوليَّة



إذا كانت مساحة المثلث المجاور هي $(4 + \sqrt{2}) \text{ cm}^2$ ، فأجد ارتفاعَه في أبسط صورة.



إذا كانت المساحة الكلية لسطح المكعب المجاور هي $6a^2$ ، فأجد حجمه.



يُطلق على الزمنِ الذي يظل فيه الجسمُ في الهواءِ بعد القفزِ اسمُ زمانِ التحليقِ، وهوَ يعطى بالمعادلةِ الآتية:

القفزةُ بالأقدامِ. إذا قفزَ لاعبُ كرةِ يدٍ، وكانَ زمانُ تحليقهِ هوَ 0.72 منَ الثانيةِ تقريباً، فأجدُ ارتفاعَ قفزةِ اللاعبِ.

أكتب كُلَّاً مِمَّا يأتِي في أبسط صورةٍ، علمًا بِأَنَّ جميعَ المُتَغَيِّرَاتِ أَعْدَادٌ حَقِيقِيَّةٌ موجَّبةٌ:

17) $\sqrt[3]{64y^6}$

18) $\sqrt[5]{4a^8 b^{14} c^5}$

19) $\frac{x}{\sqrt[3]{y^8}}$

20) $\sqrt[3]{\frac{3a}{4b^4 c}}$

21) $\sqrt[4]{1024x^9 y^{12}}$

22) $\sqrt{45x^2 y^5 z^8}$

23) $\sqrt[4]{16(y+x)^4}$

24) $3\sqrt[4]{x^4 y^8}$

25) $\sqrt[3]{125r^4 s^9 t^7}$

26) $\sqrt[3]{\frac{250f^7 g^3}{2f^2 g}}$

27) $\frac{\sqrt[5]{64x^6}}{\sqrt[5]{2x}}$

28) $\sqrt[3]{12} \times \sqrt[3]{4}$

29) $\sqrt{x^5 y^5} \times 3\sqrt{2x^7 y^6}$

30) $4\sqrt[3]{81} - 2\sqrt[3]{72} - \sqrt[3]{24}$

31) $(3\sqrt{x} - \sqrt{5})(\sqrt{x} + 5\sqrt{5})$

32) $\sqrt[4]{3x^3 y^2} \times \sqrt[4]{27xy^2}$

33) $\frac{4 - \sqrt{8}}{\sqrt{8} + \sqrt{2}}$

34) $\frac{4 - \sqrt{x^3}}{2 + 2\sqrt{x}}$

أجدُ محيطَ المستطيلِ الآتي في أبسط صورةٍ.

(3 + 6\sqrt{2}) \text{ cm}



المقادير الجبرية النسبية

Rational Algebraic Expressions

ما أهمية هذه الوحدة؟

إنَّ تبسيطِ المقاديرِ الجبريةِ النسبيةِ، وتطبيقِ بعضِ العملياتِ الحسابيةِ عليها، يساعدُ على حلِّ معادلاتِ أكثرِ تعقيداً من تلكِ التي تعلَّمتُها سابقاً، علمًا بأنَّ لهذهِ المقاديرِ استعمالاتٍ حياتيةٍ وعلميةٍ في كثيرٍ من المناحيِ، لا سيَّما الحساباتِ التي تحوي نسباً وتناسباتٍ، مثلَ: مزج الألوانِ، والصناعاتِ الكيميائيةِ الدقيقةِ.

سأتعلَّمُ في هذهِ الوحدة:

- تبسيطِ المقاديرِ الجبريةِ النسبيةِ.
- ضربِ المقاديرِ الجبريةِ النسبيةِ وقسمتها.
- جمعِ المقاديرِ الجبريةِ النسبيةِ وطرحها.
- حلِّ المعادلاتِ النسبيةِ.

تعلَّمتُ سابقاً:

- ✓ تميَّزُ الحدودِ والمقاديرِ الجبريةِ.
- ✓ تحليلُ المقاديرِ الجبريةِ إلى العواملِ.
- ✓ تبسيطِ المقاديرِ الجبريةِ النسبيةِ.
- ✓ حلُّ التناسباتِ.

توظيف المقادير الجبرية النسبية في تصميم ملعب كرة قدم.

فكرة المشروع




قطعة كبيرة من الكرتون، أدوات هندسية، ألوان، مقص.

المواد والأدوات



خطوات تنفيذ المشروع:



1 أصمّ على قطعة الكرتون نموذجاً لملعب كرة قدم يحيط به مضمّأ كما في الشكل المجاور.

2 أعبر عن طول الملعب مع المضمّأ بمقدار جري نسي يحوي متغيّراً واحداً فقط، ثم أعبر عن عرض الملعب والمضمّأ بمقدار جري نسي آخر يحوي المتغيّر نفسه.

3 أجد مساحة الملعب مع المضمّأ بدلاً المتغيّرات التي تحويها المقادير الجبرية النسبية، ثم أكتب الناتج في أبسط صورة.

4 أجد مساحة الملعب بدلاً المتغيّرات، ثم أكتب الناتج في أبسط صورة.

5 أجد مساحة المضمّأ بدلاً المتغيّرات، ثم أكتب الناتج في أبسط صورة.

6 أجد محيط الملعب مع المضمّأ بدلاً المتغيّرات، ثم أكتب الناتج في أبسط صورة.

7 أجد محيط الملعب بدلاً المتغيّرات، ثم أكتب الناتج في أبسط صورة.

8 أجد الفرق بين محيط الملعب مع المضمّأ ومحيط الملعب.

9 أفترض مساحة الملعب الذي أنشأته، ثم أجد قيمة المتغيّر بحل المعادلة النسبية الناتجة.

10 أعد مطويةً أدرج فيها الأبعاد الأولمبية لملعب كرة القدم، وتاريخ اللعبة، وأهميتها في تقارب ثقافات الشعوب.

عرض النتائج:

- أعد عرضاً تقديمياً يتضمن صوراً توضح خطوات العمل في المشروع، وعلاقته بما تعلّمه في الوحدة.
- أعرض المطوية أمام طلبة الصف، موضحاً العمليات الحسابية التي اعتمدت في تصميم ملعب كرة القدم.

الدرس 1

ضرب المقادير الجبرية النسبية وقسمتها

Multiplying and Dividing Rational Algebraic Expressions

تبسيط المقادير الجبرية النسبية.

فكرة الدرس

ضرب المقادير الجبرية النسبية وقسمتها.


المصطلحات

المقدار الجبري النسبي، الكسر الجبري المركب.

مسألة اليوم

يُبيّن الشكل المُجاوِرُ شاشة حاسوب على شكل مستطيل، طولُها $\frac{x^2}{x^2 - 2x - 15}$ وعرضها $\frac{x-5}{x}$ وحدةً، وعرضها $\frac{x^2}{x^2 - 2x - 15}$ وحدةً.

أجد مساحة الشاشة بدلالة x في أبسط صورة.



تبسيط المقادير الجبرية النسبية

المقدار الجبري النسبي (rational algebraic expression) هو مقدار جبري يمكن كتابته

في صورة كسر بسطه ومقامه مقداران جبريان، ومن أمثلته:

$$\frac{6}{x}, \quad \frac{2y+1}{y^2 - 3y + 2}, \quad \frac{r^3 + 1}{r - 4}$$

يكون المقدار الجبري النسبي في أبسط صورة إذا كان العدد 1 هو العامل المشترك الأكبر لكلاً من بسطه ومقامه. بوجه عام، يبدأ تبسيط المقدار الجبري بتحليل كل من البسط والمقام، ثم قسمة كل منهما على العوامل المشتركة بينهما.

$$\frac{2x+6}{x^2-9} = \frac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x-3}$$

قسمة البسط والمقام على العامل المشترك الأكبر للبسط والمقام، وهو $(x+3)$.

رموز رياضية

يُرمز إلى العامل المشترك الأكبر بالرمز (ع. م. أ.)، أو الرمز (GCF)؛ وهو اختصار لجملة (greatest common factor).

أتعلم

بما أنَّ القسمة على صفي غير معرفة، فإنَّا سنفترض في هذه الوحدة أنَّ جميع القيم التي يجعل المقامات صفرًا مُستثنًا.

الوحدة 7

مثال 1

أكتب كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

1
$$\frac{2x-10}{2x^2-11x+5}$$

$$\frac{2x-10}{2x^2-11x+5} = \frac{2(x-5)}{(2x-1)(x-5)}$$

تحليل كل من البسط والمقام إلى العوامل

$$= \frac{2(x-5)}{(2x-1)(x-5)}$$

بقسمة كل من البسط والمقام على $(x-5)$

$$= \frac{2}{2x-1}$$

بالتبسيط

2
$$\frac{x^3-2x^2+9x-18}{6x^3-24x^2+24x}$$

$$\frac{x^3-2x^2+9x-18}{6x^3-24x^2+24x} = \frac{(x^3-2x^2)+(9x-18)}{6x(x^2-4x+4)}$$

بتجميع الحدود ذات العوامل المشتركة في البسط، وإخراج العامل المشترك في المقام

$$= \frac{x^2(x-2)+9(x-2)}{6x(x^2-4x+4)}$$

بإخراج العامل المشترك من كل تجميع في البسط

$$= \frac{(x^2+9)(x-2)}{6x(x-2)(x-2)}$$

بتحليل كل من البسط والمقام إلى العوامل

$$= \frac{(x^2+9)(x-2)}{6x(x-2)(x-2)}$$

بقسمة كل من البسط والمقام على $(x-2)$

$$= \frac{x^2+9}{6x(x-2)}$$

بالتبسيط

أذكّر

يمكن تحليل بعض المقادير الجبرية التي تحوي أربعة حدود أو أكثر باستخدام طريقة التجميع.

3
$$\frac{1-u^2}{u^2+4u-5}$$

$$\frac{1-u^2}{u^2+4u-5} = \frac{(1-u)(1+u)}{(u-1)(u+5)}$$

تحليل كل من البسط والمقام إلى العوامل

$$= \frac{-(u-1)(1+u)}{(u-1)(u+5)}$$

$$1-u = -(u-1)$$

$$= \frac{-(u-1)(1+u)}{(u-1)(u+5)}$$

بقسمة كل من البسط والمقام على $(u-1)$

$$= \frac{-(u+1)}{u+5}$$

بالتبسيط

أذكّر

يمكن إخراج (-1) عاملًا مشتركًا من البسط أو المقام لتسهيل اختصار المقادير الجبرية النسبية.

أتحققُ من فهمي

أكتب كُلَّ ممَّا يأتي في أبْسِطِ صُورَةٍ:

a) $\frac{6x - 18}{x^4 - 81}$

b) $\frac{x^3 + 8}{x^2 + 6x + 8}$

c) $\frac{3x - 3x^2}{x^2 + 4x - 5}$

ضرب المقادير الجبرية النسبية

يمكُن ضرب المقادير الجبرية النسبية بطريقة مشابهة لطريقة ضرب الكسور، وذلك بضرب البسط في البسط وضرب المقام في المقام، ثم كتابة المقدار الجبري النسبي الناتج في أبْسِطِ صُورَةٍ.

ضرب المقادير الجبرية النسبية

مفهوم أساسيٌّ

بالكلمات: لضرب مقدارين جبريين نسبيين، يضرب البسط في البسط، ثم يضرب المقام في المقام.

بالرموز: إذا كانت a, b, c, d مقادير جبرية، حيث $a \neq 0, d \neq 0$ ، فإنَّ:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{3x}{y} \times \frac{2x}{(y+2)} = \frac{6x^2}{y^2 + 2y}$$

مثال:

مثال 2

أكتب كُلَّ ممَّا يأتي في أبْسِطِ صُورَةٍ:

1) $\frac{12ac}{15b} \times \frac{5ab^2}{6c^2}$

$$\frac{12ac}{15b} \times \frac{5ab^2}{6c^2} = \frac{2 \times 6 \times a \times c}{3 \times 5 \times b} \times \frac{5 \times a \times b \times b}{6 \times c \times c}$$

تحليل كُلِّ من البسط والمقام إلى العوامل

$$= \frac{2 \times 6 \times a \times c}{3 \times 5 \times b} \times \frac{5 \times a \times b \times b}{6 \times c \times c}$$

بقسمة كُلِّ من البسط والمقام على العوامل المشتركة

$$= \frac{2a^2b}{3c}$$

بالتبسيط

أتعلم

أتحققُ من اختصار جميع العوامل المشتركة بين البسط والمقام قبل إجراء عملية الضرب؛ تسهيلًا للحسابات.

الوحدة 7

2)
$$\frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 6x + 9} \times \frac{x + 3}{x^2 - 6x + 8}$$

$$\frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 6x + 9} \times \frac{x + 3}{x^2 - 6x + 8} = \frac{(x+3)(x-2)}{(x+3)(x+3)} \times \frac{x + 3}{(x-2)(x-4)} \quad \begin{array}{l} \text{بتحليل كل من البسط} \\ \text{والمقام إلى العوامل} \end{array}$$

$$= \frac{(x+3)(x-2)}{(x+3)(x+3)} \times \frac{x + 3}{(x-2)(x-4)} \quad \begin{array}{l} \text{بقسمة كل من البسط والمقام على العوامل المشتركة} \end{array}$$


$$= \frac{1}{x-4} \quad \begin{array}{l} \text{بالتبسيط} \end{array}$$

أتحقق من فهمي

أكتب كلاماً يأتي في أبسط صورة:

a) $\frac{8x}{5y^2} \times \frac{20xy}{6b}$

b) $\frac{d^2 - 36}{d^2 + 5d - 6} \times \frac{d - 1}{d^2 - 7d + 6}$



مثال 3: من الحياة

هندسة معمارية: يُبيّن الشكل المجاور مخططًا لأحد المنازل على شكل مستطيل. أجد مساحة المنزل بدلالة x في أبسط صورة.

$$A = l \times w$$

صيغة مساحة المستطيل الذي طوله l وعرضه w

$$= \frac{2x^2 + 2x}{x^2 + 5x + 6} \times \frac{x^2 - x - 6}{4x^3} \quad \begin{array}{l} \text{بتعويض} \end{array}$$


$$= \frac{2x(x+1)}{(x+2)(x+3)} \times \frac{(x-3)(x+2)}{2x \times 2x^2} \quad \begin{array}{l} \text{بتحليل كل من البسط والمقام إلى العوامل} \end{array}$$

$$= \frac{2x(x+1)}{(x+2)(x+3)} \times \frac{(x-3)(x+2)}{2x \times 2x^2} \quad \begin{array}{l} \text{بقسمة كل من البسط والمقام على العوامل المشتركة} \end{array}$$

$$= \frac{(x+1)(x-3)}{2x^2(x+3)} \quad \begin{array}{l} \text{بالتبسيط} \end{array}$$

إذن، مساحة المنزل هي $\frac{(x+1)(x-3)}{2x^2(x+3)}$ وحدة مربعة.

أتحقق من فهمي



قهوة: تضع إحدى الشرفات مُنتَجَها من القهوة في علب، أبعادُها تعطى بدلالة x كما في الشكل المجاور.
أجد حجم علبة القهوة بدلالة x في أبسط صورة.

أذكّر

إذا كان ناتج ضرب عددين هو 1، فإن كلاً منهما يُسمى نظيرًا ضريبيًّا للآخر، أو مقلوبًا للآخر.

قسمة المقادير الجبرية النسبية

مفهوم أساسيٌّ

بالكلمات: لقسمة مقدار جبرى نسبي على آخر، يُضرب في النظير الضريبي للمقسوم عليه.

بالرموز: إذا كانت d مقادير جبرية، حيث: $a, b, c, d \neq 0$, فإن:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

$$\frac{4x}{y} \div \frac{5}{y+1} = \frac{4x}{y} \times \frac{y+1}{5} = \frac{4x(y+1)}{5y} \quad \text{مثال:}$$

أفّكّر

لماذا لا يُشترط أن يكون $a \neq 0$

$$a \neq 0$$

مثال 4

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة:

1) $\frac{24x^2y}{5c^2d} \div \frac{16xy^3}{10c^2d^2}$

$$\frac{24x^2y}{5c^2d} \div \frac{16xy^3}{10c^2d^2} = \frac{24x^2y}{5c^2d} \times \frac{10c^2d^2}{16xy^3}$$

$$= \frac{3 \times 8 \times x \times x \times y}{5 \times c^2 \times d} \times \frac{5 \times 2 \times c^2 \times d \times d}{2 \times 8 \times x \times y \times y^2}$$

بضرب المقسوم في النظير الضريبي للمقسوم عليه

تحليل كلٌ من البسط والمقام إلى العوامل

$$= \frac{3 \times 8 \times x \times x \times y}{5 \times e^2 \times d} \times \frac{5 \times 2 \times e^2 \times d \times d}{2 \times 8 \times x \times y \times y^2}$$

بقسمة كل من البسط والمقام على العوامل المشتركة

$$= \frac{3xd}{y^2}$$

بالتبسيط

2) $\frac{x^2 - 36}{y^2 + 3y - 4} \div \frac{x^2 - 9x + 18}{8y + 32}$

$$\frac{x^2 - 36}{y^2 + 3y - 4} \div \frac{x^2 - 9x + 18}{8y + 32} = \frac{x^2 - 36}{y^2 + 3y - 4} \times \frac{8y + 32}{x^2 - 9x + 18}$$

بضرب المقسم في النظير الفرعي للمقسم عليه

$$= \frac{(x-6)(x+6)}{(y+4)(y-1)} \times \frac{8(y+4)}{(x-3)(x-6)}$$

بتحليل كل من البسط والمقام إلى العوامل

$$= \frac{(x-6)(x+6)}{(y+4)(y-1)} \times \frac{8(y+4)}{(x-3)(x-6)}$$

بقسمة كل من البسط والمقام على العوامل المشتركة

$$= \frac{8(x+6)}{(y-1)(x-3)}$$

بالتبسيط

أتحقق من فهمي 

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة:

a) $\frac{24b^3}{14x^2y^2} \div \frac{16bc^2}{21x^4y^3}$

b) $\frac{x^2 - 9x + 20}{y^2 + 10y + 21} \div \frac{2x^2 - 9x + 4}{4y + 28}$

الكسـرـ الجـبـرـيـ المـرـكـبـ

الكسـرـ الجـبـرـيـ المـرـكـبـ (complex algebraic fraction) هو كـسـرـ يـحـتـويـ بـسـطـهـ أوـ مقـامـهـ

أوـ كـلاـهـمـاـ عـلـىـ مـقـدـارـ جـبـرـيـ نـسـبـيـ، وـمـنـ أـمـلـيـتـهـ:

$$\frac{\frac{x}{4}}{y}, \quad \frac{a-6}{\frac{4}{a}}, \quad \frac{\frac{y+1}{y-8}}{\frac{y-7}{5}}, \quad \frac{\frac{2}{d}+8}{\frac{10}{d}+8}$$

توجد أربع خطواتٍ تعيّنُ اتّباعُها لتبسيط الكسور الجبرية المركبة.

مفهوم أساسٍ

يمكن تبسيط الكسور الجبرية المركبة باتّباع الخطوات الآتية:

الخطوة 1: كتابةٌ كُلٌّ من البسطِ والمقام في صورة كسرٍ واحدٍ إنْ كانَ ذلكَ ضروريًّا.

الخطوة 2: كتابةُ الكسرِ الجبرِي المركبِ الناتجِ من الخطوة 1 في صورةٍ قسمةٍ مقدارين جبريين نسبيين.

الخطوة 3: ضربُ المقسم في النظير الضريبيِّ للمقسم عليه.

الخطوة 4: قسمةٌ كُلٌّ من البسطِ والمقام على العوامل المشتركة، والتبسيطُ.

مثال 5

أكتبُ
$$\frac{\frac{a^2 - b^2}{a^2 - 25}}{\frac{b - a}{a + 5}}$$
 في أبسطٍ صورةٍ.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{a^2 - b^2}{a^2 - 25}}{\frac{b - a}{a + 5}} &= \frac{a^2 - b^2}{a^2 - 25} \div \frac{b - a}{a + 5} && \text{بكتابية الكسرِ الجبرِي المركبِ في صورةٍ قسمةٍ مقدارين نسبيين} \\ &= \frac{a^2 - b^2}{a^2 - 25} \times \frac{a + 5}{b - a} && \text{بضربِ المقسم في النظير الضريبيِّ للمقسم عليه} \end{aligned}$$

$$= \frac{-(b - a)(a + b)}{(a - 5)(a + 5)} \times \frac{a + 5}{b - a} && \text{بقسمةٍ كُلٍّ من البسطِ والمقام على العوامل المشتركة}$$

$$= -\frac{(a + b)}{(a - 5)} && \text{بالتبسيط}$$

أتحققُ من فهمي

أكتبُ
$$\frac{\frac{x^2 - y^2}{y^2 - 36}}{\frac{x - y}{2y + 12}}$$
 في أبسطٍ صورةٍ.

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورةٍ:

1 $\frac{6x(x+3)}{9x^2}$

2 $\frac{b^2+5b+4}{b^2-2b-24}$

3 $\frac{2x^3-18x}{6x^3-12x^2-18x}$

4 $\frac{x^3-8}{x^2-4}$

5 $\frac{x^3-9x^2}{x^2-3x-54}$

6 $\frac{32x^4-50}{4x^3-12x^2-5x+15}$

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورةٍ:

7 $\frac{3x^2y}{14c^2d} \times \frac{28cd}{12x^3y^2}$

8 $\frac{2d+2}{d^2+8d+16} \times \frac{d^2+d-12}{d+1}$

9 $\frac{x^2-16}{3x^3} \times \frac{x^2}{x^2+x-12}$

10 $\frac{x^2-3x}{x-2} \times \frac{x^2+x-6}{x}$

11 $\frac{x^2-4x}{x-1} \times \frac{x^2+3x-4}{2x}$

12 $\frac{b^2+12b+11}{b^2-9} \times \frac{b^3+27}{b^2+20b+99}$

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورةٍ:

13 $\frac{21x^3y^2}{12ab^2} \div \frac{3x^2y^2}{24a^3}$

14 $\frac{x^2+x-2}{x^2+5x+6} \div \frac{x^2+2x-3}{x^2+7x+12}$

15 $\frac{p}{p-4} \div \frac{p^2}{p^2-5p+4}$

16 $\frac{g^2-4g-21}{4g^2+12g} \div (g-7)$

17 $\frac{x^2-25}{2x-2} \div \frac{x^2+10x+25}{x^2+4x-5}$

18 $\frac{x+2}{3x+12} \div \frac{x+2}{x^2-16}$



أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورةٍ:


19 $\frac{x^3y^3}{cd^4}$
 $\frac{x^2y}{c^2d}$

20 $\frac{\frac{4a-8}{a^2-9}}{\frac{a^2-a-2}{a^2+7a+12}}$


21 $\frac{\frac{8x^2-10x-3}{10x^2+35x-20}}{\frac{2x^2+x-6}{4x^2+18x+8}}$

أجُد مساحةَ كُلٌّ من الشكليْن الآتَيْن بدلالةِ x في أبسطِ صورةٍ:





أكتب النسبة بين محيط الشكل المجاور ومساحته في صورة مقدار جبريٌّ نسبيٌّ في أبسط صورةٍ. 24



شموغ: في الشكل المجاور شمعتان لهما الحجم نفسه، وإحداهما أسطوانية، والأخرى مخروطية. أكتب مقداراً نسبياً يمثل ارتفاع الشمعة المخروطية بدلالة x في أبسط صورةٍ. 25

أحُل المسألة الواردة بدايةً الدرس. 26



مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: أكتب مقداراً نسبياً أبسط صورة له هي: $\frac{1}{2x+1}$. 27

اكتشف المختلف: أي المقادير النسبية الآتية مختلف، مبرراً إجابتي؟ 28

$$\frac{x-2}{x^2}$$

$$\frac{x^2+6x+8}{x^2+4x}$$

$$\frac{x+8}{4x^2}$$

$$\frac{x^2-x+1}{x^2+4x}$$


اكتشف الخطأ: أكتشف الخطأ في الحل الآتي، ثم أصححه. 29

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x+2}{x-2} \times \frac{x^2-4}{x^2+x-2} \\
 &= \frac{x+2}{x-2} \times \frac{(x+2)(x-2)}{(x+2)(x-1)} \\
 &= \frac{2}{-1}
 \end{aligned}$$



تحدي: هل يُعد المقدار $\frac{1}{x^2-4y^2} - x - 2y$ مُكافئاً للمقدار $\frac{1}{x+2y} - 2x - y$ ؟ أبّرر إجابتي. 30

جمع المقادير الجبرية النسبية وطرحها Adding and Subtracting Rational Algebraic Expressions



إيجاد المضاعف المشتركة الأصغر للمقادير الجبرية.

جمع المقادير الجبرية النسبية وطرحها.

يُبيّن الشكل المجاور حوض أسماك مفتوحاً من الأعلى على شكل متوازي مستطيلات، أبعاده مُبيّنة كما في الشكل. أجد مساحة سطح زجاج الحوض بدلالة x في أبسط صورة.

فكرة الدرس

مسألة اليوم

المضاعف المشتركة الأصغر للمقادير الجبرية

تعلّمتُ سابقاً إيجاد المضاعف المشتركة الأصغر لعددين. والآن سأتعلّم بطريقة مشابهةً كيف أجد المضاعف المشتركة الأصغر لحدّين، وذلك بتحليل كلّ منهما تحليلًا كاملاً، ثمّ كتابة العوامل المُتكرّرة بالصورة الأسّية، عندئذ يكون المضاعف المشتركة الأصغر (LCM) هو ناتج ضرب جميع قوى العوامل التي لها الأُس الأكبير.

رموز رياضية

يُرمزُ إلى المضاعف المشتركة الأصغر بالرمز (م.م.)، أو بالرمز (LCM) وهو اختصار لـ (common multiple).

يمكّن أيضاً إيجاد المضاعف المشتركة الأصغر لمقدارين جبريين، وذلك بتحليل كلّ منهما إلى العوامل، عندئذ يكون المضاعف المشتركة الأصغر (LCM) هو ناتج ضرب جميع قوى العوامل التي لها الأُس الأكبير.

مثال 1

أجد المضاعف المشتركة الأصغر للمقادير أو الحدود الجبرية المعطاة في كلّ مما يأتي:

1 $6ab, 8a^3, 12ab^5$

الخطوة 1: تحليل الحدود الجبرية تحليلًا كاملاً، ثمّ كتابة العوامل المُتكرّرة بالصورة الأسّية.

$$6ab = 2 \times 3 \times a \times b$$

$$8a^3 = 2^3 \times a^3$$

$$12ab^5 = 2^2 \times 3 \times a \times b^5$$

تحليل الحدود الجبرية تحليلًا كاملاً، ثمّ كتابة العوامل المُتكرّرة بالصورة الأسّية.

أتذكّر

تحليل الحدّ الجبرّي تحليلًا كاملاً يعني أنه يُكتب في صورة حاصل ضرب أعداد أولية ومتغيّرات، كلّ منها مرفوع إلى الأُس 1.

الخطوة 2: إيجاد المضاعف المشتركة الأصغر.

$$\text{LCM} = 2^3 \times 3 \times a^3 \times b^5$$

بضرب قوى العوامل التي لها الأسس الأكبر

$$= 24a^3 b^5$$

بالتبسيط

2) $x^4 - 7x^3 + 12x^2, x^2 - 2x - 3$

الخطوة 1: تحليل المقادير الجبرية إلى عواملها.

$$x^4 - 7x^3 + 12x^2 = x^2(x-3)(x-4)$$

بتحليل المقادير الجبرية
إلى عواملها

$$x^2 - 2x - 3 = (x-3)(x+1)$$

الخطوة 2: إيجاد المضاعف المشتركة الأصغر.

$$\text{LCM} = x^2(x-3)(x-4)(x+1)$$

بضرب قوى العوامل التي لها الأسس الأكبر

أذكّر

تحليل المقادير الجبرية يعني أنه يكتب في صورة حاصل ضرب عوامله.

أتحقق من فهمي

أجد المضاعف المشتركة الأصغر للمقادير أو الحدود الجبرية المعطاة في كلٌّ مما يأتي:

a) $6b^2, 12ab, 18ab^4$

b) $3b^2 - 15b - 18, b^3 - 7b^2 + 6b$

جمع المقادير الجبرية النسبية وطرحها

يمكن جمع المقادير الجبرية النسبية وطرحها بطريقة مشابهة تماماً لطريقة جمع الكسور وطرحها. فعند الجمع أو الطرح لمقدارين جبريين نسبيين متساوين في المقام، يجمع البسطان أو يطّحان، ويبقى المقام المشترك، ثم يُسّطّ الناتج إن كان ذلك ضروريّاً.

جمع المقادير الجبرية النسبية وطرحها

مفهوم أساسيٌّ

بالكلمات: لجمع مقدارين جبريين نسبيين لهما المقام نفسه أو طرحهما، يجمع البسطان أو يطّحان، ويبقى المقام نفسه.

بالرموز: إذا كانت a, b, c مقادير جبرية، حيث $c \neq 0$, فإن:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}, \quad \frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$

$$\frac{3x}{y+2} + \frac{x}{y+2} = \frac{3x+x}{y+2} = \frac{4x}{y+2} \quad \text{مثال:}$$

الوحدة 7

يمكن أيضًا الجمع أو الطرح لمقدارين جبريين نسبيين غير متساوين في المقام، وذلك بتوحيد المقامين أوّلًا عن طريق إيجاد المضاعف المشتركة الأصغر للمقامين، ثم ضرب البسط والمقام لكل مقدار جبري نسبي في العوامل الالزامية لجعل المقام متساوياً للمضاعف المشتركة الأصغر، ثم تبسيط الناتج إن كان ذلك ضروريًا.

مثال 2

أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورة:

1
$$\frac{y}{x(y-1)} - \frac{1}{x(y-1)}$$

$$\frac{y}{x(y-1)} - \frac{1}{x(y-1)} = \frac{y-1}{x(y-1)}$$

بجمع البسطين

$$= \frac{y-1}{x(y-1)} = \frac{1}{x}$$

بالتبسيط

2
$$\frac{2x}{3y^3} + \frac{5b}{6x^2y}$$

$$\frac{2x}{3y^3} + \frac{5b}{6x^2y} = \frac{2x}{3y^3} \times \frac{2x^2}{2x^2} + \frac{5b}{6x^2y} \times \frac{y^2}{y^2}$$

بتوحيد المقامين باستعمال المضاعف المشتركة الأصغر لهما، وهو: $6x^2y^3$

$$= \frac{4x^3}{6x^2y^3} + \frac{5by^2}{6x^2y^3}$$

بالتضييف

$$= \frac{4x^3 + 5by^2}{6x^2y^3}$$

بجمع البسطين

3
$$\frac{3x-2}{x^2+4x-12} - \frac{5}{2x+12}$$

$$\frac{3x-2}{x^2+4x-12} - \frac{5}{2x+12} = \frac{3x-2}{(x+6)(x-2)} - \frac{5}{2(x+6)}$$

بتحليل المقامين إلى عواملهما
بتوحيد المقامات باستعمال
المضاعف المشتركة الأصغر لها،
وهو: $2(x+6)(x-2)$

$$= \frac{6x-4-5x+10}{2(x+6)(x-2)}$$

بطرح البسطين

$$= \frac{x+6}{2(x+6)(x-2)}$$

بالتبسيط

$$= \frac{x+6}{2(x+6)(x-2)}$$

$$= \frac{1}{2(x-2)}$$

بقسمة كلٌ من البسط والمقام على $(x+6)$

بالتبسيط

أذكّر

لكتابة مقدار جبريٌّ نسبيٌّ في أبسطٍ صورٍ، أقسمُ البسطَ والمقامَ على العواملِ المشتركةِ.


أتحققُ من فهمي

أكتب كُلَّ ممَّا يأتي في أبسطٍ صورٍ:

a) $\frac{2x}{x^2(2x+5)} + \frac{5}{x^2(5+2x)}$

b) $\frac{5y}{6b^2a} + \frac{3b^2}{8a^2}$

c) $\frac{5}{8x+8} - \frac{x-4}{12x^2+4x-8}$



مثال ٣ : من الحياة

بيئة: صممت مياءً ملصقاً على شكلٍ مستطيلٍ للتوعية بأهمية إعادة التدوير، وكانتُ أبعاده كما في الشكل المجاور. ترغبُ مياءً في إحاطة الملصقِ بإطارٍ. أجدُ طول الإطارِ اللازمَ لذلكَ بدلالةِ y في أبسطٍ صورةٍ.

لإيجادِ طولِ الإطارِ، أجدُ محيطَ الملصقِ:

صيغةُ محيطِ المستطيلِ

$$l = \frac{9}{y-4}, w = \frac{y}{y+5}$$

بالتبسيط

بتوحيد المقاماتِ باستعمالِ المضاعفِ المشتركةِ الأصغرِ لها، وهو: $(y+5)(y-4)$

$$P = 2l + 2w$$

$$= 2 \left(\frac{9}{y-4} \right) + 2 \left(\frac{y}{y+5} \right)$$

$$= \frac{18}{y-4} + \frac{2y}{y+5}$$

$$= \frac{18}{y-4} \times \frac{y+5}{y+5} + \frac{2y}{y+5} \times \frac{y-4}{y-4}$$

$$= \frac{2y^2 - 8y + 18y + 90}{(y+5)(y-4)}$$

$$= \frac{2y^2 + 10y + 90}{(y+5)(y-4)}$$

بجمع البسطينِ

بالتبسيط

إذن، طول الإطارِ اللازمُ لإحاطةِ الملصقِ به هو: $\frac{2y^2 + 10y + 90}{(y+5)(y-4)}$ cm


أفكّر

هل يُمكّنُ تحليلُ: $2y^2 + 10y + 90$

انحُقُّ من فهمي

معلومة

تحفلُّ مُنظَّمة الصحة العالمية في 31 أيار من كلّ عامٍ باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وتحرصُ في هذا اليوم على إبراز المخاطر الصحيَّة المُرتبطة بالتدخين.



صَحَّةُ: صَمَمَ خالدُ مُلصَّقاً على شَكَلِ مُسْتَطِيلٍ للْتَّوْعِيَّةِ بِأَسْرَارِ التَّدْخِينِ فِي الْيَوْمِ الْعَالَمِيِّ لِلِّامْتَنَاعِ عَنِ التَّدْخِينِ، وَكَانَتْ أَبْعَادُهُ كَمَا فِي الشَّكَلِ الْمُجَاوِرِ. يَرْغُبُ خالدُ فِي إِحْاطَةِ الْمُلْصَقِ بِإِطَارٍ. أَجْدُ طَوْلَ الْإِطَارِ الْلَّازِمَ لِذَلِكَ بِدَلَالَةِ x فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ.

تبسيط الكسر المركب

تعلَّمْتُ في الدرسِ السَّابِقِ تبسيطَ الكسرِ المُرَكَّبِ الَّذِي يَحْتَوِي بِسُطْهُ أَوْ مَقَامِهِ أَوْ كلاهُما عَلَى مَقَادِيرِ جَبَرِيِّ نَسْبِيِّ. وَالآنَ سَأَتَعَلَّمُ كِيفَ أَبْسِطُ الْكَسَرَ الْمُرَكَّبَ الَّذِي يَحْتَوِي بِسُطْهُ أَوْ مَقَامِهِ أَوْ كلاهُما عَلَى عَمَلِيَّةِ جَمِيعٍ أَوْ عَمَلِيَّةِ طَرِحٍ، وَذَلِكَ بِطَرِيقَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا: كِتَابَةُ كُلٍّ مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ أَوْ كُلِّيَّهُمَا فِي صُورَةِ كَسَرٍ وَاحِدٍ (إِنْ لَزِمَ). وَالْأُخْرَى: إِيجَادُ المَضَاعِفِ الْمُشَتَّرِكِ الْأَصْغَرِ لِلْمَقَامَاتِ الَّتِي فِي الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ جَمِيعَهَا، ثُمَّ ضَرْبُ كُلٍّ مِنْ بَسْطِ الْمَقَادِيرِ الْجَبَرِيِّ النَّسْبِيِّ وَمَقَامِهِ فِي الْمَضَاعِفِ الْمُشَتَّرِكِ الْأَصْغَرِ، وَالتبسيطُ.

مثال 4

$$\text{أَبْسِطُ الْمَقَدَارَ الْأَتَى: } \frac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{1}{x} + 2}.$$

الطريقة: أَبْسِطُ الْمَقَدَارَ بِكِتَابَةِ كُلٍّ مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ فِي صُورَةِ كَسَرٍ وَاحِدٍ.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{1}{x} + 2} &= \frac{\frac{x}{y} - \frac{y}{y}}{\frac{1}{x} + \frac{2x}{x}} \\ &= \frac{\frac{x-y}{y}}{\frac{1+2x}{x}} \\ &= \frac{x-y}{y} \div \frac{1+2x}{x} \end{aligned}$$

المضاعفُ الْمُشَتَّرُ الْأَصْغَرُ لِمَقَامِي الْبَسْطِ هُوَ y
المضاعفُ الْمُشَتَّرُ الْأَصْغَرُ لِمَقَامِي الْمَقَامِ هُوَ x

تبسيطُ كُلٍّ مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ

بِكِتَابَةِ الْكَسَرِ الْمُرَكَّبِ فِي صُورَةِ قَسْمَةِ مَقَادِيرِ نَسْبِيَّينِ

$$= \frac{x-y}{y} \times \frac{x}{1+2x}$$

$$= \frac{x^2 - xy}{y + 2xy}$$

بالضرب في النظير الضري لالمقسوم عليه

بالتبسيط

الطريقة 2: أبسط المقدار بإيجاد المضاعف المشتركة الأصغر لمقامات البسط والمقام.

$$\frac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{1}{x} + 2} = \frac{\frac{x}{y} - 1}{\frac{1}{x} + 2} \times \frac{xy}{xy}$$

$$= \frac{x^2 - xy}{y + 2xy}$$

بضرب البسط والمقام في المضاعف المشتركة الأصغر
لجميع المقامات التي في البسط والمقام، وهو: xy

بالتبسيط

أتحقق من فهمي

$$\cdot \frac{2 + \frac{1}{y}}{\frac{4}{x} - \frac{3}{y}}$$

أبسط المقدار الآتي:



أتدرب وأحل المسائل



أجد المضاعف المشتركة الأصغر للمقادير أو الحدود الجبرية المعطاة في كل مما يأتي:

1 $4mt^2, 8m^3 t, 12m^4 t$

2 $x^2 + 2x - 15, x^2 + 6x + 5$

3 $c^3 + 5c^2 + 4c, c(c + 1)^2$

4 $9x^2 - 16, 3x^2 + x - 4$

أكتب كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

5 $\frac{6y}{3x^3} + \frac{2}{7y^2 x}$

6 $\frac{b}{b+3} + \frac{5}{b-2}$

7 $\frac{m}{2m-14} + \frac{m^2}{m^2-49}$

8 $\frac{1}{4x^2-12x+9} - \frac{x}{2x^2-x-3}$

9 $\frac{x+3}{x^2-1} - \frac{x+2}{x-1}$

10 $3s^2 - \frac{s+1}{s^2-1}$

11 $\frac{2}{6z-9} - \frac{z+1}{2z^2-3z}$

12 $\frac{1}{x-y} + \frac{1}{y-x}$

13 $\frac{3w-1}{2w^2+w-3} - \frac{2-w}{w-1}$

14 $\frac{x+2}{x^2+3x-10} + \frac{3}{2-x}$

15 $\frac{2p+3}{p^2-7p+12} - \frac{2}{p-3}$

16 $\frac{3c+1}{c-1} + \frac{c+1}{c^2-4c+3} \div \frac{c-1}{c-3}$

الوحدة 7



أكتب كلاً ممّا يأتي في أبسط صورةٍ:

17) $\frac{6 + \frac{a}{b}}{2 - \frac{6}{b}}$

18) $\frac{\frac{6}{x-4} - \frac{x}{2x+3}}{\frac{2}{2x+3} + \frac{2x}{x-4}}$

19) $\frac{\frac{x}{x-2} + 1}{\frac{3}{x^2-4} - 1}$

أجُد محيطَ كُلٌّ منَ الشكليَنِ الآتَيَنِ:



22) **رحلة:** قرَرَ مهندُ الذهابَ في رحلَةٍ بحافلَةٍ تسيرُ بسرعةٍ km/h (x)، وقطعَ مسافَةً $60 km$ ، ثُمَّ إكمَالَ الرحلَةِ بسيَارَةٍ تسيرُ بسرعةٍ km/h ($x + 20$)، وقطعَ مسافَةً $140 km$. أكتبُ الزَّمْنَ الَّذِي سيسْتَغْرِقُهُ مهندُ في الْحَافلَةِ وَالسَّيَارَةِ في صورةٍ مقدارٍ جبَرِيٍّ نسبيٍّ في أبسطِ صورةٍ.

أجُلُّ المسأَلةَ الْوَارَدَةَ بِدَائِيَةَ الْدَرَسِ.



23) **أكشِفُ الخطأً:** أكشِفُ الخطأً في الْحَلِّ الْآتَيِ، ثُمَّ أصْحِحُهُ.

$$\frac{y}{y+1} + \frac{7}{y-3} = \frac{y+7}{(y+1)(y-3)}$$



25) **مسأَلةٌ مفتوحةٌ:** أجُدُّ مقدارِيْنِ جبَرِيِّيْنِ ناتِجُ طرِحِهِما هُوَ $\frac{x-1}{x+3}$.

26) **تَبَرِيرُ:** مُثَلَّثٌ مُنْطَابِقُ الأَضْلاعِ، طُولُ ضلعِهِ هُوَ $\frac{7}{6(x-3)} - \frac{1}{x-3}$. تمَدَّدَ المُثَلَّثُ مُحَافِظًا عَلَى شَكْلِهِ، فَاصْبَحَ طُولُ ضلعِهِ هُوَ $\frac{x^2}{x-3} - \frac{5}{6(x-3)}$. أجُدُّ معاَمِلَ التَّكْبِيرِ بِدَلَالَةِ x في أبسطِ صورةٍ، مُبِرِّرًا إجَابَتِي.

27) **تَحْدِيدُ:** أبْسِطُ المقدارَ الْآتَيَ: $\frac{x}{1 - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-1}}$

حل المعادلات النسبية Solving Rational Equations



حل معادلاتٍ نسبيةٍ.

فكرة الدرس



المعادلة النسبية.

المصطلحات



مسألة اليوم



يُتَجَّعُ مُصْنَعٌ سبائكَ مِنَ النحاسِ والفضَّةِ، نَسْبَةُ الْفِضَّةِ فِيهَا هِيَ 5 : 2.

كمْ غَرَاماً مِنَ الْفِضَّةِ يَجْبُ إِضَافَتُهَا إِلَى خَلِيلٍ مِنَ النحاسِ والفضَّةِ،

كَتْلَتُهُ 800 g، وَمَقْدَارُ الْفِضَّةِ فِيهِ 200 g؛ لَكِيْ تَكُونَ النَّسْبَةُ الْلَّازِمَةُ

لِمُصْنَعِ السَّبِيْكَةِ هِيَ 5 : 2؟

حل المعادلات النسبية بالضرب التبادلي

يُطلَقُ عَلَى الْمَعَادِلَةِ الَّتِي تَحْوِي مَقْدَارًا جَبَرِيًّا نَسْبِيًّا أَوْ أَكْثَرَ اسْمُ الْمَعَادِلَةِ النَّسْبِيَّةِ (rational equation)، وَمِنْ أَمْثَلَتُهَا:

$$\frac{x+3}{x-2} = 6, \quad \frac{1}{x+4} = \frac{5}{2x-3}, \quad \frac{x}{x+6} = \frac{72}{x^2-36} + 5$$

يُمْكِنُ استِعْمَالُ الضَّرِبِ التَّبَادِلِيِّ لِحَلِّ الْمَعَادِلَاتِ النَّسْبِيَّةِ إِذَا كَانَتْ كُلُّ مِنْهَا فِي صُورَةٍ تَنَاسِبٍ فَقَطُّ.

أَتَذَكَّرُ

فِي أَيِّ تَنَاسِبٍ : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ،
حِيْثُ $b \neq 0, d \neq 0$ ،

فَإِنَّ حَاصلَ ضَرِبِ طَرَفَيِّ
الْتَّنَاسِبِ يَكُونُ مُسَاوِيًّا
لِحَاصلِ ضَرِبِ وَسْطَيِّ
الْتَّنَاسِبِ : $a \times d = b \times c$ ،
وَسُمِّيَّ هَذِهِ الْخَاصِيَّةُ
الضَّرِبِ التَّبَادِلِيًّا.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$$

مثال 1

أَهْلِيْ كُلَّ مَعَادِلَةٍ مِمَّا يَأْتِي:

$$1 \quad \frac{4}{x+1} = \frac{6}{x-1}$$

المعادلة الأصلية

$$\frac{4}{x+1} = \frac{6}{x-1}$$

بالضرب التبادلي

$$6(x+1) = 4(x-1)$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$6x + 6 = 4x - 4$$

بالتبسيط

$$2x = -10$$

بِقِسْمَةٍ طَرَفِيِّ الْمَعَادِلَةِ عَلَى 2

$$x = -5$$

الوحدة 7

تحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجة في المعادلة الأصلية.

$$\frac{4}{x+1} = \frac{6}{x-1}$$

$$\frac{4}{-5+1} \stackrel{?}{=} \frac{6}{-5-1}$$

$$-1 = -1 \quad \checkmark$$

المعادلة الأصلية

$$x = -5$$

بالتبسيط

إذن، حل المعادلة هو: $x = -5$.

2) $\frac{7}{x} = \frac{x-2}{5}$

$$\frac{7}{x} = \frac{x-2}{5}$$

$$x(x-2) = 35$$

$$x^2 - 2x = 35$$

$$x^2 - 2x - 35 = 0$$

$$(x-7)(x+5) = 0$$

$$x-7=0 \quad \text{or} \quad x+5=0$$

$$x=7$$

$$x=-5$$

المعادلة الأصلية

بالضرب التبادلي

باستعمال خاصية التوزيع

بطرح 35 من طرفي المعادلة

بالتحليل إلى العوامل

خاصية الضرب الصفرية

بحل كل معادلة

تحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمتي x الناتجتين في المعادلة الأصلية.

عندما $x = -5$

$$\frac{7}{x} = \frac{x-2}{5}$$

$$\frac{7}{-5} \stackrel{?}{=} \frac{-5-2}{5}$$

$$-\frac{7}{5} = -\frac{7}{5} \quad \checkmark$$

عندما $x = 7$

$$\frac{7}{x} = \frac{x-2}{5}$$

$$\frac{7}{7} \stackrel{?}{=} \frac{7-2}{5}$$

$$1 = 1 \quad \checkmark$$

إذن، حل المعادلة هو: $x = -5$ ، $x = 7$.

تحقق من فهمي


أحل كل معادلة مما يأتي:

a) $\frac{4}{x} = \frac{3}{x-2}$

b) $\frac{4}{x+4} = \frac{x}{x+1}$


الدعم البياني:

أستعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = \frac{4}{x+1}$ ، والمعادلة: $y = \frac{6}{x-1}$ ، ببيانياً، ولاحظة أن منحنيي المعادلتين يتقاطعان عندما $x = -5$.



الدعم البياني:

أستعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = \frac{7}{x}$ ، والمعادلة: $y = \frac{x-2}{5}$ ، ببيانياً، ولاحظة أن منحنيي المعادلتين يتقاطعان عندما $x = -5$ ، $x = 7$.



إضافةً إلى حل المعادلات النسبية، يمكن استعمال مفهوم النسبة في كثير من التطبيقات الحياتية.

أذكر

النسبة هي طريقة لمقارنة عدد بآخر، أو مقارنة كمية بأخرى. تكتب النسبة بثلاث طرائق مختلفة، هي: $a:b$, $\frac{a}{b}$, a إلى b .

مثال 2: من الحياة



طلاة: تخلط الألوان بنسب محددة وصولاً إلى الدرجة المطلوبة من لون معين. أعد سعيد خليطاً من الألوان بمزج مكاييل من اللون الأزرق بمكاييل من اللون الأخضر. إذا كانت درجة اللون التي يرغب سعيد في الحصول عليها مشروطة بأن تكون نسبة اللون الأزرق إلى الخليط هي $3:4$, فأجد عدد مكاييل اللون الأزرق التي يتعين على سعيد إضافتها إلى الخليط لكي يحصل على الدرجة المطلوبة من اللون.

أفترض أن x هو عدد مكاييل اللون الأزرق التي يجب إضافتها إلى الخليط لإيجاد النسبة المطلوبة.

ومن ثم، فإن:

$$\frac{\text{عدد مكاييل اللون الأزرق}}{\text{عدد المكاييل الكلية}} = \frac{3}{4}$$

نسبة اللون الأزرق في الخليط

عدد مكاييل اللون الأزرق

عدد المكاييل الكلية

لإيجاد عدد مكاييل اللون الأزرق التي يجب إضافتها إلى الخليط، يجب حل المعادلة النسبية أعلاه:

$$\frac{x+2}{x+4} = \frac{3}{4}$$

المعادلة الأصلية

$$3(x+4) = 4(x+2)$$

بالضرب التبادلي

$$3x+12 = 4x+8$$

باستعمال خاصية التوزيع

$$x = 4$$

بالتبسيط

تحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجة في المعادلة الأصلية.

$$\frac{x+2}{x+4} = \frac{3}{4}$$

المعادلة الأصلية

$$\frac{4+2}{4+4} = \frac{3}{4}$$

$$x = 4$$

بتعويض

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

بالتبسيط

إذن، يتعين على سعيد إضافة 4 مكاييل من اللون الأزرق إلى الخليط لكي يحصل على الدرجة المطلوبة من اللون.

ملومة

يطلق على اللون الناتج من خلط اللون الأزرق واللون الأخضر اسم اللون الفيروزي، ويمكن خلط نسبة مختلفة من هذين اللونين للحصول على بعض درجات (ظلال) اللون الفيروزي.

أتحقق من فهمي

طلاء: وضع في خلاط متجر للطلاء مكيال من اللون الأحمر و 4 مكيال من اللون الأصفر لإنتاج لون معين. إذا كانت درجة هذا اللون مشروطة بأن تكون نسبة اللون الأحمر إلى الخليط هي 1 : 3، فاجد عدد مكيال اللون الأحمر التي يتطلب إضافتها إلى الخليط للحصول على الدرجة المطلوبة من اللون.



كل المعادلات النسبية باستعمال المضاعف المشتركة الأصغر

تعلمت في المثال السابق حل المعادلة النسبية التي تكون في صورة تنااسب باستعمال الضرب التبادلي. والآن سأتعلم كيف أحل المعادلة النسبية التي لا تكون في صورة تنااسب، وذلك بضرب طرفي هذه المعادلة في المضاعف المشتركة الأصغر للمقامات؛ تخلصاً من هذه المقامات.

في بعض الأحيان، تظهر حلول دخيلة عند ضرب طرفي المعادلة النسبية في المضاعف المشتركة الأصغر؛ لذا يجب التحقق دائمًا من تحقيق أي حل ناتج للمعادلة الأصلية.

أتذكّر

الحل الدخيل هو حل لا يتحقق المعادلة الأصلية. ومن الملاحظ في المعادلات النسبية أن الحل الدخيل يجعل أحد مقامات المعادلة صفرًا.

مثال 3

أحل كل معادلة مما يأتي:

$$1 \quad \frac{2}{x-1} + \frac{3}{4} = \frac{7}{20}$$

$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{4} = \frac{7}{20} \quad \text{المعادلة الأصلية}$$

$$20(x-1) \times \frac{2}{x-1} + 20(x-1) \times \frac{3}{4} = 20(x-1) \times \frac{7}{20} \quad \text{بضرب طرفي المعادلة في المضاعف المشتركة الأصغر للمقامات، وهو: } 20(x-1)$$

$$40 + 15x - 15 = 7x - 7 \quad \text{بالقسمة على العوامل المشتركة}$$

$$25 + 15x = 7x - 7 \quad \text{بالتبسيط}$$

$$8x = -32 \quad \text{بالتبسيط}$$


$$x = -4 \quad \text{بقسمة طرفي المعادلة على 8}$$

أفكّر

هل يمكن حل الفرع 1 من المثال 3 بطريقة أخرى؟ أبّر إجابتي.


الدعم البياني:

استعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = \frac{2}{x-1} + \frac{3}{4}$ ، والمعادلة: $y = \frac{7}{20}$ بيانياً، ولاحظة أن منحني المعادلتين يتقاطعان عندما $x = -4$.



الدعم البياني:

استعمل برمجية جيوجبرا للتحقق من صحة الحل، وذلك بتمثيل كل من المعادلة: $y = \frac{36}{x^2 - 9}$ ، والمعادلة: $y = \frac{2x}{x+3} - 1$ بيانياً، ولاحظة أن منحني المعادلتين يتقاطعان عندما $x = 9$.



أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجة في المعادلة الأصلية.

$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{4} = \frac{7}{20}$$

المعادلة الأصلية

$$\frac{2}{-4-1} + \frac{3}{4} \stackrel{?}{=} \frac{7}{20}$$

بتعويض $x = -4$

$$\frac{7}{20} = \frac{7}{20} \quad \checkmark$$

بالتبسيط

إذن، حل المعادلة هو: $x = -4$.

2) $\frac{36}{x^2 - 9} = \frac{2x}{x+3} - 1$

$$\frac{36}{x^2 - 9} = \frac{2x}{x+3} - 1$$

المعادلة الأصلية

$$(x-3)(x+3) \times \frac{36}{x^2 - 9} = (x-3)(x+3) \times \frac{2x}{x+3} - (x-3)(x+3) \times 1$$

بضرب طرف المعادلة في المضاعف المشتركة الأصغر للمقامات، وهو: $(x-3)(x+3)$

$$36 = 2x(x-3) - (x+3)(x-3)$$

$$36 = x^2 - 6x + 9$$

بالتبسيط

$$x^2 - 6x - 27 = 0$$

بالتبسيط

$$(x-9)(x+3) = 0$$

بالتحليل إلى العوامل

$$x-9 = 0 \quad \text{or} \quad x+3 = 0$$

خاصية الضرب الصفرية

$$x = 9$$

$$x = -3$$

بحل كل معادلة

أتحقق: للتحقق من صحة الحل، أعرض قيمة x الناتجتين في المعادلة الأصلية.

عندما $x = -3$

$$\frac{36}{x^2 - 9} = \frac{2x}{x+3} - 1$$

عندما $x = 9$

$$\frac{36}{x^2 - 9} = \frac{2x}{x+3} - 1$$

$$\frac{36}{(-3)^2 - 9} \stackrel{?}{=} \frac{2(-3)}{(-3) + 3} - 1$$

$$\frac{36}{(9)^2 - 9} \stackrel{?}{=} \frac{2(9)}{(9) + 3} - 1$$

$$\frac{36}{0} \neq \frac{-6}{0} - 1 \quad \times$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

إذن، حل المعادلة هو: $x = 9$.

أتحقق من فهمي

أذكّر

المُعَدَّلُ هو نَسْبَةٌ يُقارَنُ فيها بينَ كَمِيَّتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ في الْوَحْدَةِ. أَمَّا مُعَدَّلُ الْوَحْدَةِ فَهُوَ تَبْسيِطُ المُعَدَّلِ لِصِّيقِ مَقَامُهُ وَحْدَةً وَاحِدَةً.

a) $\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$

b) $\frac{x}{x-2} + \frac{1}{3x-1} = \frac{x}{3x^2 - 7x + 2}$

تَتَطَلَّبُ تَطَبِيقَاتُ حَيَاةِيَّةٌ عِدَّةً تَحْدِيدَ الزَّمِنِ الْلَّازِمِ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ؛ مَا يُحَتَّمُ تَحْدِيدَ مُعَدَّلِ إِنْجَازِ الْعَمَلِ، ثُمَّ اسْتِعْمَالُ مُعَدَّلِ الْوَحْدَةِ لِكِتَابَةِ مَعَادِلَةٍ نَسْبِيَّةٍ ثُمَّ حَلَّهَا.

مثال 4 : من الحياة



أعمال منزلية: يَسْتَغْرِقُ تَنْظِيفُ الْمَنْزِلِ مِنْ رَغْدَ وَزَوْجِهِ أَحْمَدَ 4 سَاعَاتٍ مِنَ الْعَمَلِ. إِذَا كَانَتْ سَرْعَةُ رَغْدَ هِيَ مِثْلُ سَرْعَةِ أَحْمَدَ فِي التَّنْظِيفِ، فَأَجِدُ الْوَقْتَ الَّذِي يَسْتَغْرِقُهُ رَغْدُ فِي تَنْظِيفِ الْمَنْزِلِ وَحْدَهُ.

الخطوة 1: أَحَدُ مُعَدَّلِ إِنْجَازِ الْعَمَلِ لِكُلِّ مِنْ رَغْدَ وَأَحْمَدَ.

- أَفْتَرُضُ أَنَّ x هُوَ عَدُدُ السَّاعَاتِ الَّتِي يَسْتَغْرِقُهَا أَحْمَدُ فِي تَنْظِيفِ الْمَنْزِلِ وَحْدَهُ. وَبِمَا أَنَّ
- أَحْمَدُ يُنْظِفُ الْمَنْزِلَ فِي x سَاعَةً، فَإِنَّهُ يُنْظِفُ $\frac{1}{x}$ مِنَ الْمَنْزِلِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ.
- بِمَا أَنَّ سَرْعَةَ رَغْدَ هِيَ مِثْلًا سَرْعَةِ أَحْمَدَ، فَإِنَّهَا تُنْظِفُ $\frac{2}{x}$ مِنَ الْمَنْزِلِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ.
- بِمَا أَنَّ رَغْدَ وَأَحْمَدَ يُنْظِفَانِ الْمَنْزِلَ فِي 4 سَاعَاتٍ إِذَا عَمَلَا مَعًا، فَإِنَّهُمَا يُنْظِفَانِ $\frac{1}{4}$ الْمَنْزِلِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ.

الخطوة 2: أَكْتُبُ مَعَادِلَةً تُمْثِلُ مُعَدَّلَ إِنْجَازِهِمَا الْعَمَلَ مَعًا، ثُمَّ أَحْلُلُهَا.

بِمَا أَنَّ رَغْدَ وَأَحْمَدَ يُنْظِفَانِ مَعًا $\frac{1}{4}$ الْمَنْزِلِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُنِي كِتَابَةُ مَعَادِلَةٍ الْآتِيَّةِ:

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \frac{1}{4}$$

بِحَلِّ الْمَعَادِلَةِ، يُمْكِنُ إِيجَادُ عَدُدِ السَّاعَاتِ الَّتِي يَسْتَغْرِقُهَا أَحْمَدُ فِي تَنْظِيفِ الْمَنْزِلِ وَحْدَهُ:

$$\frac{1}{x} + \frac{2}{x} = \frac{1}{4}$$

المُعَادِلَةُ الأَصْلِيَّةُ

$$4x \times \frac{3}{x} = 4x \times \frac{1}{4}$$

بِضَربِ طَرْفِيِّ الْمَعَادِلَةِ فِي الْمُضَاعِفِ الْمُشْتَرِكِ
الْأَصْغَرِ لِلْمَقَامَاتِ، وَهُوَ: $4x$

$$x = 12$$

بِالْقِسْمَةِ عَلَىِ الْعَوَامِلِ الْمُشْتَرِكَةِ

معلومة

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَثَلُ وَالْقَدوَةَ مَعَ أَهْلِهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَدْ سُسْلَيَّتِ السَّيْدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ فِي بَيْتِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ (تَعْنِي خَدْمَةَ أَهْلِهِ)، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَأْدُ الْبَخَارِيُّ.

وبذلك، فإنَّ أَحْمَدَ بحاجَةٍ إِلَى 12 ساعَةً مِنَ الْعَمَلِ لِتَنْظِيفِ الْمَنْزِلِ وحْدَهُ.
بِمَا أَنَّ سُرْعَةَ رَغْدَ فِي التَّنْظِيفِ هِيَ مِثْلًا سُرْعَةِ أَحْمَدَ، فَإِنَّهَا بحاجَةٍ إِلَى 6 ساعَاتٍ مِنَ الْعَمَلِ لِتَنْظِيفِ الْمَنْزِلِ وحْدَهَا.

أَتَحَقُّقُ مِنْ فَهْمِي

جَدَارٌ: يَعِينُ عَلَى يَوْسُفَ وَإِبْرَاهِيمَ الْعَمَلُ 6 ساعَاتٍ لِطَلَاءِ جَدَارٍ فِي حَدِيقَةِ مَنْزِلِهِ. إِذَا كَانَتْ سُرْعَةُ يَوْسُفَ هِيَ ثَلَاثَةُ أَمْثَالٍ لِسُرْعَةِ إِبْرَاهِيمِ فِي إِنْجَازِ الْعَمَلِ، فَأَجُدُّ الْوَقْتَ الَّذِي يَسْتَغْرِفُهُ يَوْسُفُ فِي طَلَاءِ الْجَدَارِ وحْدَهُ.

أَتَدْرَبُ وَأَحْلُّ الْمَسَائِلَ

أَحْلُّ كُلَّا مِنَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ:

$$1 \quad \frac{3y}{y+1} = \frac{y}{3-y}$$

$$2 \quad \frac{2}{x+5} = \frac{10}{3x+7}$$

$$3 \quad \frac{6}{y-1} = \frac{y}{7}$$

$$4 \quad \frac{9}{y-1} = \frac{3y}{2}$$

$$5 \quad \frac{w}{w+1} = \frac{2w}{w+6}$$

$$6 \quad \frac{x^2+4}{x-1} = \frac{5}{x-1}$$



أشجارٌ: تَحْتَوِي مَزْرَعَةُ الْحَمْضِيَّاتِ عَلَى 120 شَجَرَةً، مِنْهَا 30 شَجَرَةً لِيْمُونٍ.
أَجُدُّ عَدَدَ أَشْجَارِ الْيِلْمُونِ الَّتِي يَلْزُمُ زَرَاعُهَا لِتُصْبِحَ نَسْبَةُ أَشْجَارِ الْيِلْمُونِ فِي المَزْرَعَةِ 1 : 3.

أَحْلُّ كُلَّا مِنَ الْمَعَادِلَاتِ الْأَتِيَّةِ:

$$8 \quad \frac{4}{y} + \frac{3}{8} = \frac{6}{y}$$

$$9 \quad \frac{4}{y-2} - 1 = \frac{9}{y}$$

$$10 \quad \frac{1}{z} + \frac{1}{z-4} = \frac{z-3}{z-4}$$

$$11 \quad \frac{3}{x-2} + \frac{2x}{x+2} = \frac{3x^2}{x^2-4}$$

$$12 \quad \frac{x^2-3x-4}{x^3-x^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-2}{x^2}$$


$$13 \quad 10 + \frac{14}{1-x} = \frac{12}{1-x^2}$$

$$14 \quad \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x^2+5x} = \frac{4}{x^2+5x}$$

$$15 \quad 1 = \frac{n-2}{n-1} + \frac{3}{n^2+3n-4}$$

$$16 \quad \frac{16}{x-5} = 2 - \frac{6}{x}$$

الوحدة 7



يُبيّن الشكل المُجاوِر التمثيل البياني لمنحنى كُلّ من المعادلة: $y = \frac{1}{x}$ ،
والمعادلة: $y = \frac{1}{x-2} - 1$:

أكتب معادلة حلّها هو الإحداثي x لنقطة تقاطع منحنى المعادلين. 17

أحلّ المعادلة التي كتّبها في الفرع السابق جبرياً. 18



مسجّ: يستغرق ملء مسجّ بالماء 45 دقيقةً باستعمال خرطوم المياه الأزرق، في حين يستغرق ملئه بالماء 20 دقيقةً باستعمال هذا الخرطوم وخرطوم المياه ذي اللون الأسود معًا. أجدّ عدد الدقائق التي يستغرقها الخرطوم الأسود في ملء المسجّ بالماء.

أحلّ المسألة الواردة بدايةً الدرس. 20

مهارات التفكير العليا

مسألة مفتوحة: أكتب معادلة نسبيةٍ يمكن حلّها بضرب طرفي المعادلة في $(x-1) \cdot 3$. 21

اكتشف الخطأ: يُمثّل التالي الخطوة الأولى من حلّ ديمَةً لمعادلة نسبيةً. اكتشف الخطأ في هذه الخطوة، ثم أصلحه.

$$\frac{2x-1}{x} + 6 = \frac{3x+4}{5x-2}$$

$$x(5x-2) \times \frac{2x-1}{x} + 6 = x(5x-2) \times \frac{3x+4}{5x-2}$$



تبرير: هل يمكن حلّ المعادلة: $\frac{6x}{x+4} + 4 = \frac{2x+2}{x-1}$ باستعمال الضرب التبادلي؟ أبّرّ إجابتي. 23

تحدّ: أحلّ المعادلة الآتية: $0 = \frac{\frac{x+3}{x-2} \times \frac{x^2+x-2}{x+5}}{x-1} + 2$ 24

اختبار نهاية الوحدة

6 حل المعادلة: $\frac{x}{x+2} = \frac{4}{x+6}$ هو:

a) $x = -4, 2$

b) $x = -4, 0$

c) $x = 4, -2$

d) $x = -2, -6$

أكتب كلاً مما يأتي في أبسط صورة:

7 $\frac{2x^2 - 10x + 8}{3x^2 - 7x + 4}$

8 $\frac{7x^3 - 32x^2 + 16x}{4x - 16}$

9 $\frac{8y^3 + 1}{2y^2 + 21y + 10}$

10 $\frac{x^2 + 3x + 2}{4x - 12} \times \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$

11 $\frac{x^2 - 9}{x^2 + x - 20} \times \frac{x^2 - 8x + 16}{3x + 9}$

12 $\frac{3x^2 + 5x - 2}{x^2 + 3x + 2} \div \frac{6x^2 + x - 1}{x^2 - 3x - 4}$

13 $\frac{x^2 + 3x - 10}{x^2 + 6x + 5} \times \frac{2x^2 - x - 3}{2x^2 + x - 6} \div \frac{8x + 20}{6x + 15}$

14 $\frac{2x + 7}{x^2 - 2x - 3} + \frac{3x - 2}{x^2 + 6x + 5}$

15 $\frac{x + 1}{x - 4} - \frac{x + 1}{x^2 - 7x + 12}$

16 $\frac{2x}{x^2 - 1} - \frac{3}{x^2 + 5x + 4}$

17 $\frac{2r}{r^2 - s^2} + \frac{1}{r + s} - \frac{1}{r - s}$

18 $\frac{n - 7}{n^2 - 2n - 35} \div \frac{9n + 54}{10n + 50}$

19 $\frac{10x^2 - 20x}{40x^3 - 80x^2} \times \frac{16x^3 + 80x^2}{6x + 30}$

20 $\frac{\frac{1}{x} - \frac{2}{x+1}}{\frac{1}{x}}$

21 $\frac{\frac{1}{x-1}}{\frac{x+1}{3} + \frac{4}{x-1}}$

أختار رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 المقدار الجبرى النسبة الذى في أبسط صورة هو:

a) $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 + 3x + 2}$

b) $\frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 + 2x - 3}$

c) $\frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - x - 2}$

d) $\frac{x^2 + 3x - 4}{x^2 + x - 2}$

2 مكعب طول ضلعه $2x$ وحدة. النسبة بين مساحة

سطحه الكلية وحجمه في أبسط صورة هي:

a) $\frac{6}{x^2}$

b) $\frac{3}{2x}$

c) $\frac{2}{x}$

d) $\frac{3}{x}$

3 أبسط صورة للمقدار $\frac{2w + 8}{3} \times \frac{6}{w^2 + 6w + 8}$ هي:

a) $\frac{4}{w + 2}$

b) $\frac{2}{3(w + 2)}$

c) $\frac{4(w + 4)}{w + 2}$

d) $\frac{2}{w + 2}$

4 أبسط صورة للمقدار $\frac{x - 3}{6x^2} \div \frac{x - 3}{2x}$ هي:

a) $\frac{1}{6x}$

b) $3x$

c) $\frac{1}{3x}$

d) $\frac{1}{3x^2}$

5 أبسط صورة للمقدار $\frac{5}{6cd} + \frac{c}{8d^2}$ هي:

a) $\frac{5 + c}{6cd + 8d^2}$


b) $\frac{20d + c^2}{24cd^2}$

c) $\frac{5d + 3c^2}{24cd^2}$

d) $\frac{20d + 3c^2}{24cd^2}$

تدريب على الاختبارات الدولية

يُمثل الشكل التالي ملعباً لكرة القدم مساحته: $4 - x^2$.
المقدار الجبرى الذى يُمثل عرض الملعب هو:



- a) $x - 2$ b) $(x + 2)(x - 2)^2$

- c) $x + 2$ d) $(x + 2)(x - 2)$

أبسط صورة للمقدار $\frac{\frac{1}{a} + \frac{2}{b}}{1 + \frac{4}{b}}$ هي:

- a) $\frac{b + 2a}{ab + 4}$ b) $\frac{b + 2a}{a(b + 4)}$

- c) $\frac{ab + 2a}{a(b + 4)}$ d) $\frac{ab + 2}{a(b + 4)}$

عدد حلول المعادلة: $\frac{5}{x-2} = \frac{x}{3}$ هو:

(a) حلٌ واحدٌ. (b) حلانٌ.

(c) ثلاثة حلولٍ. (d) لا توجد حلولٍ لالمعادلة.

يستغرق العامل الماهر 26 ساعةً في بناء سقفٍ أحد المنازل، في حين يستغرق العامل المبتدئ 39 ساعةً في بناء السقف نفسه. إلى كم ساعةً يحتاج العاملان لبناء سقف المنزل معاً؟

أجد مساحة المستطيل الآتى بدلالة x في أبسط صورة.



أجد محيط المثلث المجاور بدلالة x في أبسط صورة.

إذا كان حجم الأسطوانة المجاورة هو $(x+4)(x^2+2x-8)\pi$ cm³، فأجد ارتفاع الأسطوانة بدلالة x في أبسط صورة.

صممت أحالم ملصقاً على شكلٍ مستطيلٍ للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، وكانت أبعاده كما في الشكل التالي. ترغب أحالم في إحاطة الملصق بإطارٍ. أجد طول الإطار اللازم لذلك بدلالة x في أبسط صورة.

$$\frac{5}{x^2 + x - 6}$$



ما أهمية هذه الوحدة؟

تُقدم هذه الوحدة مجموعةً من موضوعات الإحصاء والاحتمالات التي يُعدُّ اكتسابها ضروريًّا للكلِّ إنسانٍ في هذا العصرِ، مثل: تنظيم البيانات، وتحليلها، واستعمال قوانين الاحتمالات لوضعِ استنتاجاتٍ دقيقةٍ عنها؛ ما يساعدُ على اتخاذِ قراراتٍ صحيحةٍ في كثيرٍ من مجالاتِ الحياة اليومية.

سأتعلّم في هذه الوحدة:

- ◀ إيجاد مقاييس التشتت لبياناتٍ مفردةٍ، وأخرى منظمةٍ في جداولٍ تكراريةٍ.
- ◀ تنظيم البيانات في جداولٍ تكرارية ذاتٍ فئاتٍ.
- ◀ تقدير مقاييس التوزع المركزية للجداول التكرارية ذاتٍ الفئاتٍ.
- ◀ إيجاد الاحتمال باستعمال أشكالٍ قِنْ، وإيجاد احتمالاتٍ هندسيةٍ.

تعلّمتُ سابقاً:

- ✓ إيجاد مقاييس التوزع المركزية لبياناتٍ مفردةٍ.
- ✓ تنظيم البيانات في جداولٍ تكرارية ذاتٍ فئاتٍ معطاةٍ، ثم تمثيلها في مخططاتٍ تكراريةٍ.
- ✓ تمثيل البيانات بأسكالٍ قِنْ.
- ✓ إيجاد احتمالاتٍ وقوع الحوادث.

فكرة المشروع



جمع بياناتٍ عن عددٍ من الأشخاصِ، وتنظيمُها، وتحليلُها.

خطوات تنفيذ المشروع:



1 أطلبُ إلى 40 شخصاً (نصفُهم من الذكور، ونصفُهم الآخرُ من الإناث) قياسَ عددِ دقاتِ قلوبِهم في الدقيقةِ الواحدةِ، وتحديدَ اليدِ التي يكتبونَ بها، وبيانَ إذا كانوا يرتدونَ نظاراتٍ أم لا.

2 أجدُ الوسطَ الحسابيَّ والوسيطَ والمنوالَ لعددِ دقاتِ القلبِ لـكُلِّ من الذكورِ والإإناثِ.

3 أجدُ الانحرافَ المعياريَّ والتباينَ لعددِ دقاتِ القلبِ لـكُلِّ من الذكورِ والإإناثِ.

4 أنظمُ بياناتِ عددِ دقاتِ القلبِ لـكُلِّ من الذكورِ والإإناثِ في جدولٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ متساويةِ الطولِ.

5 أقدرُ الوسطَ الحسابيَّ والمنوالَ لعددِ دقاتِ القلبِ لـكُلِّ من الذكورِ والإإناثِ باستعمالِ الجدولينِ اللذينِ أنشأتهُما في الخطوةِ السابقةِ، ثمَّ أقارنُ ذلكَ بالإجابةِ الدقيقةِ لـكُلِّ منهمُ.

6 أمثلُ كلاً من الجدولينِ التكراريينِ اللذينِ أنشأتهُما في الخطوةِ السابقةِ بمُدرجٍ تكراريٍّ، ثمَّ أكتبُ وصفاً للبياناتِ.

7 أمثلُ بياناتِ اليدِ المستعملةِ للكتابةِ، وبياناتِ ارتداءِ النظارةِ في شكلٍ قُلْنِ.



8 أكتبُ مجموعةً من المسائلِ الاحتماليةِ عن حادثِ اختيارِ شخصٍ عشوائياً من بينِ مجموعةِ من الأشخاصِ، ثمَّ أطلبُ إلى بعضِ زملائيِّ / زميلاتيِّ إجابةَ هذهِ المسائلِ.

عرضُ النتائجِ:

- أصمِّمُ مطويةً أكتبُ فيها النتائجَ التي توصلْتُ إليها في هذا المشروعِ.
- أعرضُ المطويةَ أمامَ طلبةِ الصفِّ، ثمَّ أقارنُ نتائجيِّ بنتائجِهمِ.

مقاييس التشتت

Measures of Variation

إيجاد التباين والانحراف المعياري لبياناتٍ مفردةٍ، وأخرى منظمةٍ في جداولٍ تكراريةٍ.

تحديدُ أثرٍ تحويلٍ البياناتِ في كلِّ منَ الوسطِ الحسابيِّ، والانحرافِ المعياريِّ.

التباین، الانحرافُ المعياريُّ، تحويلُ البياناتِ.



في ما يأتي عددُ أكوابِ الماءِ التي شربَتها أميرةٌ كلَّ يومٍ مُدَّةً 10 أيامٍ:

3, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 6, 3, 6

(1) أجدُ تباينَ عددَ أكوابِ الماءِ التي شربَتها أميرةٌ في الأيامِ العشرةِ.

(2) أجدُ الانحرافَ المعياريَّ لعددِ أكوابِ الماءِ التي شربَتها أميرةٌ في الأيامِ العشرةِ.

فكرةُ الدرس



المصطلحات



مسألةُ اليوم



التباین، والانحرافُ المعياريُّ

تعلَّمتُ سابقاً أنَّ مقاييسَ التشتتِ تُستعملُ لوصفِ مقدارِ تشتتِ البياناتِ وتباعدها. ومنْ هذهِ المقاييسِ: المدى، والمدى الريبيعيُّ. ولكنْ، كُلُّ منْ هذينِ المقياسينِ يعتمدُ على قِيمٍ مُحدَّدةٍ منَ البياناتِ، لا على القييمِ جميعِها؛ لذا توجَّدُ مقاييسٌ أخرىٌ دقةً للتشتتِ تأخذُ جميعَ قِيمِ البياناتِ بالاعتبارِ.

أذكُر

المدى هو الفرقُ بينَ أكبرِ قِيمِ البياناتِ وأصغرِها. أما المدى الريبيعيُّ فهو الفرقُ بينَ الربعِ الأعلى والربعِ الأدنى.

في ما يأتي مجموعَةٌ منَ البياناتِ، وسطُها الحسابيُّ هو: $\bar{x} = 64$.


58, 88, 40, 60, 72, 66, 80, 48

تُستعملُ الصيغة $\bar{x} - x$ لإيجادِ انحرافٍ (بعدٍ) كُلِّ مشاهدةٍ منْ قِيمِ البياناتِ عنْ وسطِها الحسابيِّ. وبذلك، فإنَّ انحرافَ قِيمِ البياناتِ أعلىُ عنْ وسطِها الحسابيِّ باستعمالِ هذهِ الصيغة هو كما يأتي:

لغةُ الرياضيات

يُطلقُ على كلِّ قيمةٍ منَ القييمِ في مجموعةِ البياناتِ اسمُ المشاهدةِ.

الوحدة 8



عند جمع الانحرافات المبينة في الشكل أعلاه، فإنَّ الناتج يكون كما يأتي:

$$-24 + -16 + -6 + -4 + 2 + 8 + 16 + 24 = 0$$

الاحظ أنَّ مجموع الانحرافات عن وسطها الحسابي صفرًا، وهذا لا يقتصر على هذه البيانات فقط، وإنما يتحقق في أي مجموعة بياناتٍ عدديَّة؛ لذا، فإنَّ حساب مجموع الانحرافات عن وسطها الحسابي لا يُقدِّم شيئاً عن تشتت البيانات، ولا يُمِيز أيَّ مجموعة بياناتٍ عن أخرى. إلا أنَّ إيجاد مُربعات هذه الانحرافات يجعلها موجبةً. ولهذا، فإنَّ مجموع مُربعات الانحرافات عن وسطها الحسابي لا يساوي صفرًا.

عند حساب الوسط الحسابي لمُربعات الانحرافات، بقسمة مجموعها على عددها، يتوجُّ مقياسٌ مُهمٌّ من مقاييس التشتت يُسمى التباين (variance)، ويُرمَّز إليه بالرمز σ^2 . فمثلاً، يمكن حساب تباين مجموعة البيانات أعلاه على النحو الآتي:

$$\sigma^2 = \frac{(-24)^2 + (-16)^2 + (-6)^2 + (-4)^2 + 2^2 + 8^2 + 16^2 + 24^2}{8} = 223$$

وأخذ الجذر التربيعي للتباین، ينتُج مقياس آخر لتشتت البيانات يُسمى الانحراف المعياري (standard deviation).

في هذا الدرس، سُيُّطر إلى جميع البيانات بوصفها تمثِّل مجتمعاً إحصائياً، يُرمَّز إلى وسطه الحسابي بالرمز μ ، ويُقرَّأ: ميو.

التباین، والانحراف المعياري

مفهوم أساسٍ

يُعرَّف تباین مجموعة من البيانات، عددها n ، ووسطها الحسابي μ ، بالصيغة الآتية:

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x - \mu)^2}{n}$$

ويكون الانحراف المعياري لمجموعة البيانات هو الجذر التربيعي للتباین.

أتعلَّم

الاحظ أنَّ انحرافَ المشاهدة عن وسطها الحسابي يكونُ موجباً إذا كانت أكبرَ من الوسط الحسابي، ويكونُ سالباً إذا كانت أصغرَ من الوسط الحسابي.

رموز رياضية

الحرف اليوناني σ يُقرَّأ: سيجما، وهو يُستعمل للدلالة على الانحراف المعياري. أمّا الرمز σ^2 فيُقرَّأ: سيجما تربيع، وهو يُستعمل للدلالة على التباين.

رموز رياضية

يُستعمل الرمز \sum للدلالة على المجموع. وفي قانون التباين، فإنَّه يُستعمل للدلالة على مجموع مُربعات انحرافات البيانات عن وسطها الحسابي بصورة مختصرة، ويُقرَّأ: سيجما.

مثال 1 : من الحياة



تجارة: في ما يأتي عدد الأجهزة الكهربائية التي بيعت في متجر خلال خمسة أشهر

18, 22, 21, 25, 24

أجد التباین لعدد الأجهزة المبیعة في هذه الأشهر.

الخطوة 1: أجد الوسط الحسابي للأجهزة المبیعة.

$$\mu = \frac{\sum x}{n}$$

$$= \frac{18 + 22 + 21 + 25 + 24}{5} = 22$$

صيغة الوسط الحسابي

بالتعميّض، والتبسيط

x	$x - \mu$	$(x - \mu)^2$
18	-4	16
22	0	0
21	-1	1
25	3	9
24	2	4
المجموع		30

الخطوة 2: أنشئ جدولًا أحسب فيه انحراف كل قيمة عن الوسط الحسابي، إضافة إلى حساب مربعات الفروق.

الخطوة 3: أُعُرض القيم التي توصلت إليها بصيغة التباین.

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$$

$$= \frac{30}{5} = 6$$

صيغة التباین

بالتعميّض، والتبسيط

إذن، التباین لعدد الأجهزة المبیعة في هذه الأشهر هو 6.

أجد الانحراف المعياري لعدد الأجهزة المبیعة في هذه الأشهر.

بما أن الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباین، فإن:

$$\sigma = \sqrt{6} \approx 2.45$$

أتعلّم

إذا كانت البيانات: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ تمثل عينةً عشوائيةً من مجتمع إحصائيٍ ما، فإنَ التباین يُرمزُ إليه بالرمز s^2 ، ويُعرفُ بأنه:

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

في هذا الدرس، سُتعامل جميع البيانات على أساس أنها تمثل مجتمعاً إحصائياً. ومن ثم، فإنَ التباین سيُعرفُ بالصيغة الواردة في صندوق المفهوم الأساسي السابق.

أتذكر

مجموع $(\mu - x)$ يساوي صفرًا.

الوحدة 8

أتحقق من فهمي



إنترنت: في ما يأتي عدد زائر موقع إلكتروني تعليمي خلال أيام أحد الأسابيع:

103, 115, 124, 125, 171, 165, 170

(a) أجد التباين لعدد زائر الموقع في ذلك الأسبوع.

(b) أجد الانحراف المعياري لعدد زائر الموقع في ذلك الأسبوع.

توجد صيغة أخرى لإيجاد التباين من دون حاجة إلى حساب انحراف المشاهدات عن الوسط الحسابي، وهذه الصيغة هي:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \mu^2$$

مثال 2

أجد التباين والانحراف المعياري للبيانات الآتية: 15, 14, 18, 6, 12, 4, 7, 8, 8

لإيجاد التباين، أتبع الخطوات الآتية:

الخطوة 1: أجد الوسط الحسابي.

$$\mu = \frac{\sum x}{n}$$
$$= \frac{15 + 14 + 18 + 6 + 12 + 4 + 7 + 8 + 8}{9} = \frac{92}{9}$$

صيغة الوسط الحسابي

بالتعمير، والتبسيط

الخطوة 2: أنشئ جدولًا أحسب فيه مربع كل مشاهدة.

الخطوة 3: أعرض القيم التي توصلت إليها بصيغة التباين.

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \mu^2$$

صيغة الثانية للتباين

$$= \frac{1118}{9} - \left(\frac{92}{9}\right)^2 \quad \Sigma x^2 = 1118, \mu = \frac{92}{9}$$

$$\approx 19.73$$

باستعمال الآلة الحاسبة

أتعلم

تُستعمل هذه الصيغة لتبسييل الحسابات في حال كانت قيمة الوسط الحسابي عدداً غير صحيحاً.

أتعلم

الاحظ أنَّ الوسط الحسابي عدداً غير صحيحاً؛ لذا يفضل إيجاد التباين باستعمال الصيغة الآتية:

$$\sigma^2 = \frac{\sum x^2}{n} - \mu^2$$

x	x^2
15	225
14	196
18	324
6	36
12	144
4	16
7	49
8	64
8	64
المجموع	1118

بما أنَّ الانحرافَ المعياريَّ هوَ الجذرُ التربيعيُّ للبيانِ، فإنَّ

$$\sigma \approx 4.44$$

أتحققُ منْ فهمي

أجدُ التبَيَّنَ والانحرافَ المعياريَّ للبياناتِ الآتية: 1, 4, 5, 7, 6, 14, 11

التبَيَّنَ والانحرافَ المعياريَّ للبياناتِ مُنظَّمةٌ في جداولٍ تكرارِيَّةٍ

تعلَّمْتُ سابقاً تنظيمَ بياناتٍ عدديَّةٍ باستعمالِ جداولٍ تكرارِيَّةٍ. والآنَ سأتعلَّمُ كيفَ أجدُ التبَيَّنَ والانحرافَ المعياريَّ للبياناتِ مُنظَّمةٌ في جداولٍ تكرارِيَّةٍ.

التبَيَّنَ والانحرافَ المعياريَّ للبياناتِ مُنظَّمةٌ في جداولٍ تكرارِيَّةٍ

مفهومٌ أساسيٌّ

يمكِّنُ إيجادُ تبَيَّنٍ مجموعَةٍ منَ البياناتِ، عدُّها n ، ووَسْطُها الحسابيُّ μ ، إذاً كَانَتْ مُنظَّمةٌ في جداولٍ تكرارِيَّةٍ، حيثُ f عدُّ مَرَّاتِ تكرارِ المشاهدةِ، باستعمالِ إحدى الصيغتينِ الآتَيَنِ:

$$\sigma^2 = \frac{\sum((x-\mu)^2 \times f)}{\sum f} \quad \text{or} \quad \sigma^2 = \frac{\sum(x^2 \times f)}{\sum f} - \mu^2$$

ويكونُ الانحرافُ المعياريُّ لمجموعَةِ البياناتِ هوَ الجذرُ التربيعيُّ للبيانِ.

أتذَكَّرُ

يمكِّنُ إيجادُ الوسْطِ الحسابيِّ للبياناتِ المُنظَّمةٌ في جداولٍ تكرارِيَّةٍ باستعمالِ الصيغةِ الآتَيَةِ:

$$\mu = \frac{\sum(x \times f)}{\sum f} \quad \text{حيثُ } f \text{ عدُّ مَرَّاتِ تكرارِ المشاهدةِ.}$$

مثالٌ ٣ : منَ الحياةِ



قمصانٌ: يُبيَّنُ الجدولُ التالي عدَّ القمصانِ الرياضيةِ لمجموعَةِ طلبةِ الصفِ التاسعِ في إحدى المدارسِ. أجدُ التبَيَّنَ والانحرافَ المعياريَّ لهذهِ البياناتِ.

عدُّ القمصانِ (x)	1	2	3	4	5	6
التكرارُ (f)	2	12	45	114	41	16

الوحدة 8

لإيجاد التباين، أنشئ جدولًا جديداً يحوي الأعمدة المظللة عناوينها على النحو الآتي:

x	f	$x \times f$	x^2	$x^2 \times f$
1	2	2	1	2
2	12	24	4	48
3	45	135	9	405
4	114	456	16	1824
5	41	205	25	1025
6	16	96	36	576
المجموع	230	918	91	3880

$$\mu = \frac{\sum(x \times f)}{\sum f} = \frac{918}{230}$$

بالتعریض في صيغة الوسط الحسابي

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x^2 \times f)}{\sum f} - \mu^2$$

الصيغة الثانية للتباين

$$= \frac{3880}{230} - \left(\frac{918}{230} \right)^2$$

بالتعریض

$$= 0.93905$$

باستعمال الآلة الحاسبة

أتعلّم

الاحظ أنَّ الوسط الحسابي عدُّ غير صحيح؛ لذا يفضل إيجاد التباين باستعمال الصيغة الآتية:

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x^2 \times f)}{\sum f} - \mu^2$$

بما أنَّ الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، فإنَّ

$$\sigma \approx 0.969$$

أتحقق من فهمي

عائلة: يبيّن الجدول التالي عدد الأخوة والأخوات لمجموعة من طالبات الصف التاسع في مدرسة عائشة. أجد التباين والانحراف المعياري لهذه البيانات.

عدد الأخوة والأخوات	1	2	3	4	5
التكرار (f)	2	4	8	5	1

تحويل البيانات

تحويل البيانات (data transformation) هو تطبيق عملية حسابية (أو أكثر) على جميع القيم في مجموعة بيانات للحصول على مجموعة أخرى مختلفة. سأستكشف في النشاط المفاهيمي الآتي أثر تحويل البيانات في كل من الوسط الحسابي، والانحراف المعياري للبيانات.

تحويل البيانات

نشاط مفاهيمي

الإجراءات:

في ما يأتي علامات 5 طلبة في اختبار رياضيات، نهاية العظمى هي 20:

12, 17, 11, 9, 16

(1) أجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعلامات الطلبة.

(2) إذا أراد المعلم إضافة 3 علامات إلى علامات كل طالب، فأجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعلامات الطلبة بعد التحويل.

(3) إذا أراد المعلم تحويل نهاية الاختبار العظمى إلى 40، بضرب كل علامة في العدد 2، فأجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لعلامات الطلبة بعد التحويل.

أحلى النتائج:


(1) أقارن بين الوسط الحسابي والانحراف المعياري قبل تحويل العلامات وبعد تحويلها بإضافة 3 علامات. ماذا أستنتج؟

(2) أقارن بين الوسط الحسابي والانحراف المعياري قبل تحويل العلامات وبعد تحويلها بضربها في العدد 2. ماذا أستنتج؟


أستنتج من هذا النشاط أن إضافة العدد 3 إلى علامات كل طالب أثرت في الوسط الحسابي، ولم تؤثر في الانحراف المعياري؛ لأن هذه الإضافة أدت إلى انسحاب البيانات جميعها بالمقدار نفسه (3 وحدات إلى اليمين) كما يظهر في التمثيل النقطي التالي، لكن ذلك لم يؤثر في تشتت البيانات.

الوحدة 8

أستنتج أيضًا أنَّ الوسط الحسابي الجديد ناتجٌ من إضافةِ العدد 3 إلى الوسط الحسابي القديم.




علاماتُ الطلبةِ قبل التحويلِ.




علاماتُ الطلبةِ بعد إضافةِ العدد 3 إليها.

أمّا تحويلُ البياناتِ بضربِها في العدد 2 فقد أثَّرَ في كُلِّ منَ الوسطِ الحسابيِّ، والانحرافِ المعياريِّ؛ لأنَّ عمليةَ الضربِ تُؤثِّرُ في تشتُّتِ البياناتِ كما يُظَهِّرُ في التمثيلِ النقطيِّ التالي.

كذلكَ أستنتجُ أنَّ الوسطِ الحسابيِّ الجديد ناتجٌ منْ ضربِ الوسطِ الحسابيِّ القديمِ في العدد 2، وكذا الحالُ بالنسبةِ إلى الانحرافِ المعياريِّ.



علاماتُ الطلبةِ قبل التحويلِ.



علاماتُ الطلبةِ بعد ضربِها
في العدد 2.

تحويلُ البياناتِ

مفهومُ أساسيٍّ

عندَ تحويلِ مجموعَةٍ منَ البياناتِ باستعمالِ العلاقةِ: $y = ax + b$ ، حيثُ a و b عدَدانِ حقيقيانِ، و x المشاهدةُ قبل التحويلِ، و y المشاهدةُ بعدَ التحويلِ، فإنَّ:

- يُمكِّنُ إيجادُ الوسطِ الحسابيِّ للبياناتِ بعدَ التحويلِ μ_y باستعمالِ العلاقةِ: $\mu_y = a\mu_x + b$ ، حيثُ μ_x الوسطُ الحسابيُّ للبياناتِ قبلَ التحويلِ.
- يُمكِّنُ إيجادُ الانحرافِ المعياريِّ للبياناتِ بعدَ التحويلِ σ_y باستعمالِ العلاقةِ: $\sigma_y = |a|\sigma_x$ ، حيثُ σ_x الانحرافُ المعياريُّ للبياناتِ قبلَ التحويلِ.

يُستعمل تحويل البيانات أحياناً لإيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري للبيانات المعقّدة (ذات القيمة غير الصحيحة)؛ تسهيلًا لإجراء الحسابات.

مثال 4 : من الحياة



علوم: قاس عالم درجة حرارة مفاعل نووي (بالسلسيوس) في 5 مواقع مختلفة، وكانت الناتج التي توصل إليها كما يأتي:

332.5, 335.3, 336.2, 337.5, 340.3

استعمل هذا العالم العلاقة: $y = 10x - 3300$ لتحويل درجات الحرارة، حيث x درجة الحرارة قبل التحويل، و y درجة الحرارة بعد التحويل.

الخطوة 1: أجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الحرارة بعد التحويل.

استعمل العلاقة: $y = 10x - 3300$ لتحويل درجات الحرارة، بحيث تصبح كالتالي:

25, 53, 62, 75, 103

الخطوة 2: أجد الوسط الحسابي لدرجات الحرارة بعد التحويل.

$$\begin{aligned}\mu_y &= \frac{\sum y}{n} && \text{صيغة الوسط الحسابي} \\ &= \frac{25 + 53 + 62 + 75 + 103}{5} = 63.6 && \text{بالتعميّض، والتبسيط}\end{aligned}$$

إذن، الوسط الحسابي لدرجات الحرارة بعد التحويل هو: 63.6

y	y^2
25	625
53	2809
62	3844
75	5625
103	10609
المجموع	23512

معلومات

تنتج من التفاعلات النووية طاقة حرارية كبيرة تستعمل لتوليد الطاقة الكهربائية.

أفكّر

كيف توصل العالم إلى المعادلة:

$$?y = 10x - 3300$$

هل هذا التحويل هو الوحيد الممكّن؟ أبّرّ إجابتي.

الخطوة 3: أجد الانحراف المعياري لدرجات الحرارة بعد التحويل.

أُنشئ جدولًا أحسب فيه مربع كل مشاهدة، ثم أُعوّض في صيغة الانحراف المعياري:

الوحدة 8

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum y^2}{n} - \mu_y^2}$$

صيغة الثانية للانحراف المعياري

$$= \sqrt{\frac{23512}{5} - (63.6)^2}$$

$$\Sigma y^2 = 23512, \mu_y = 63.6, n = 5$$

$$\approx 25.64$$

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، الانحراف المعياري لدرجات الحرارة بعد التحويل هو 25.64

أجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الحرارة قبل التحويل بناءً على النتائج 2

في الفرع السابق.

• الوسط الحسابي قبل التحويل:

$$\mu_y = a\mu_x + b$$

صيغة تحويل الوسط الحسابي

$$63.6 = 10\mu_x - 3300$$

$$\mu_y = 63.6, a = 10, b = -3300$$

$$3363.6 = 10\mu_x$$

بجمع 3300 إلى طرف المعادلة

$$336.36 = \mu_x$$

بقسمة طرف المعادلة على 10

إذن، الوسط الحسابي لدرجات الحرارة قبل التحويل هو 336.36

• الانحراف المعياري قبل التحويل:

$$\sigma_y = |a|\sigma_x$$

صيغة تحويل الانحراف المعياري

$$25.64 \approx |10|\sigma_x$$

$$\sigma_y = 25.64, a = 10$$

$$2.564 \approx \sigma_x$$

بقسمة طرف المعادلة على 10

إذن، الانحراف المعياري لدرجات الحرارة قبل التحويل هو 2.564 تقريرًا.

أتذكّر

الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين.

أتحقق من فهمي

درجات حرارة: رُصدَت درجات الحرارة (بالسلسليوس) في 7 مناطق مختلفةٍ من العاصمة عُمان في أحد الأيام، وكانت على النحو الآتي:

32.1, 31.7, 31.2, 31.5, 31.9, 32.2, 32.7

استعملت العلاقة: $y = 10x - 300$ لتحويل درجات الحرارة، حيث x درجة الحرارة قبل التحويل، ولا درجة الحرارة بعد التحويل:

(a) أجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الحرارة بعد التحويل.

(b) أجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات الحرارة قبل التحويل بناءً على النتائج في الفرع السابق.

يمكن أحياناً إيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجموعةٍ من البيانات بعد تحويلها من دون معرفة البيانات الأصلية، أو البيانات بعد التحويل؛ إذ يكتفى بمعرفة العلاقة التي استعملت لإجراء التحويل، وبعض المعلومات عن البيانات بعد التحويل.

مثال 5 : من الحياة



سرعة: رُصدَت سرعة 25 درجةً هوائيةً مشاركةً في سباق للدراجات عند مرورها من أحد الشوارع بوحدة km/h ، ثم حولت سرعة هذه الدراجات باستعمال

العلاقة: $y = x - 10$ ، حيث y السرعة بعد التحويل، و x السرعة قبل التحويل. إذا كان: $\sum y = -5$, $\sum y^2 = 2803$

الوسط الحسابي لسرعة الدراجات قبل التحويل.

1

الخطوة 1: أجد الوسط الحسابي لسرعة الدراجات بعد التحويل.

$$\begin{aligned}\mu_y &= \frac{\sum y}{n} \\ &= \frac{-5}{25} = -0.2\end{aligned}$$

صيغة الوسط الحسابي

$\sum y = -5$, $n = 25$

الخطوة 2: أجد الوسط الحسابي لسرعة الدّرّاجات قبل التحويل.

$$\mu_y = a\mu_x + b$$

صيغة تحويل الوسط الحسابي

$$-0.2 = \mu_x - 10$$

$$\mu_y = -0.2, a = 1, b = -10$$

$$\mu_x = 9.8$$

بجمع 10 إلى طرف المعادلة

إذن، الوسط الحسابي لسرعة الدّرّاجات قبل التحويل هو 9.8.

الخطوة 2: أجد الانحراف المعياري لسرعة الدّرّاجات قبل التحويل.

الخطوة 1: أجد الانحراف المعياري لسرعة الدّرّاجات بعد التحويل.

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum y^2}{n} - \mu_y^2}$$

الصيغة الثانية للانحراف المعياري

$$= \sqrt{\frac{2803}{25} - (-0.2)^2}$$

$$\sum y^2 = 2803, \mu_y = -0.2$$

$$\approx 10.6$$

باستعمال الآلة الحاسبة

الخطوة 2: أجد الانحراف المعياري لسرعة الدّرّاجات قبل التحويل.

الانحراف المعياري للبيانات قبل التحويل هو 10.6 تقريباً؛ لأنَّ التحويل تمثّل في إضافة (-10)، وهذا لا يؤثّر في الانحراف المعياري.

أتذكّر

إضافة قيمة إلى البيانات لا يؤثّر في تشتّتها.

اتحقّق من فهمي

زراعة: قيَسْت كتل 40 كيساً من السماد بوحدة kg، ثم حولت هذه الكتل باستعمال

العلاقة $60 - x = y$ ، حيث y الكتلة بعد التحويل، و x الكتلة قبل التحويل. إذا كان:

$$\sum y = -814, \sum y^2 = 22125$$

(a) الوسط الحسابي لكتل أكياس السماد قبل التحويل.

(b) الانحراف المعياري لكتل أكياس السماد قبل التحويل.

معلومة

يَعْدُ الأردن إحدى الدول الرائدة في إنتاج الأسمدة عالية الجودة على مستوى العالم، نظراً إلى وفرة خامات الفوسفات التي تُستعمل في صناعة الأسمدة.

أمطار: في ما يأتي عدد الأيام الماطرة من شهر شباط في إحدى المدن على مدار سبعة أعوام

متالية:



18, 20, 11, 13, 5, 12, 14

1 أجد تباين عدد الأيام الماطرة في الأعوام السبعة.

2 أجد الانحراف المعياري لعدد الأيام الماطرة في الأعوام السبعة.



كرة قدم: شارك فريق كرة قدم في دوري للمحترفين 5 مواسم متالية، وكان عدد الأهداف التي سجلها الفريق في هذه المواسم كما يأتي:

61, 54, 44, 57, 38

3 أجد تباين عدد الأهداف في المواسم الخمسة.

4 أجد الانحراف المعياري لعدد الأهداف في المواسم الخمسة.

أجد التباين والانحراف المعياري لكل مجموعة بيانات مما يأتي:

5 **27, 43, 29, 34, 53, 37, 19, 58**

6 **12, 15, 18, 16, 7, 9, 14**

أطفال: يُبيّن الجدول الآتي عدد الأطفال في 35 عائلة:

عدد الأطفال	0	1	2	3	4	5
عدد العائلات	6	12	9	4	3	1

7 أجد تباين عدد الأطفال في هذه العائلات.

8 أجد الانحراف المعياري لعدد الأطفال في هذه العائلات.

الوحدة 8

كتلٌ: يُبيّن الجدول الآتي كتلَ عددٍ من الصناديق في شاحنةٍ:

الكتلة (kg)	50	55	60	65	70	75
عدد الصناديق	3	10	18	22	17	10

أجدُ تبَابِنَ كتلِ هذهِ الصناديق. 9

أجدُ الانحرافَ المعياريَّ لكتلِ هذهِ الصناديق. 10



نباتاتٌ: قاسَتْ مُهندِسَةٌ زراعِيَّةٌ أطوالَ 7 نباتاتٍ منَ النوعِ نفسهِ (بالسنتيمتر)، وَكَانَتِ النتائجُ التي توصلَتْ إِلَيْها كَمَا يَأْتِي:

53.6, 52.7, 55.4, 55.4, 57.2, 59.9, 62.6

ثُمَّ اسْتَعْمَلَتِ العَلَاقَةُ: $y = 500 - 50x$ لِتَحْوِيلِ أطوالِ النباتاتِ، حِيثُ x طُولُ النَّبْتَةِ قَبْلَ التَّحْوِيلِ، وَ y طُولُها بَعْدَ التَّحْوِيلِ:

أجدُ الوَسْطَ الحَسَابِيَّ والانحرافَ المعياريَّ لأطوالِ النباتاتِ بَعْدَ التَّحْوِيلِ. 11


أجدُ الوَسْطَ الحَسَابِيَّ والانحرافَ المعياريَّ لأطوالِ النباتاتِ قَبْلَ التَّحْوِيلِ بِنَاءً عَلَى النتائجِ فِي الفَرْعِ السَّابِقِ. 12

حقائِبُ: قَيَسَتْ كتلٌ 97 حَقَائِبَ يَدِ (kg) عَلَى مَنِ إِحْدَى الرَّحَلَاتِ الجَوِيَّةِ، ثُمَّ حُوَلَتْ كتلُ هَذِهِ الحَقَائِبِ بِاسْتِعْمَالِ العَلَاقَةِ: $y = x - 5$ ، حِيثُ y الكَتْلَةُ بَعْدَ التَّحْوِيلِ، وَ x الكَتْلَةُ قَبْلَ التَّحْوِيلِ. إِذَا كَانَ: $\sum y = 314$, $\sum y^2 = 1623$, فأجدُ كُلَّا مِمَّا يَأْتِي:

الوَسْطُ الحَسَابِيُّ لكتلِ الحَقَائِبِ قَبْلَ التَّحْوِيلِ. 13

التبَابِنُ والانحرافُ المعياريُّ لكتلِ الحَقَائِبِ قَبْلَ التَّحْوِيلِ. 14

فِي مَجْمُوعَةِ بِيَانَاتٍ إِحْصَائِيَّةٍ، إِذَا كَانَ: $n = 40$, $\sum x = 6400$, وَكَانَ: $\sum x^2 = 1400000$ ، فأجدُ الانحرافَ المعياريَّ لَهَذِهِ الْبِيَانَاتِ. 15



قيسْت أطوال أقطار 8 حبات برتقال بوحدة cm، وكانت انحرافات أطوال الأقطار عن وسطها الحسابي كما يأتي: $4, -2, 3, 3, -1, k, -5, 2$.



أجد قيمة الثابت k . 16

أجد التباين والانحراف المعياري لأطوال أقطار حبات البرتقال. 17

أحل المسألة الواردة بداية الدرس. 18

مهارات التفكير العليا

تبرير: أي التمثيلين النقطيين قيمة انحراف المعياري أصغر: a أم b ? أبُرُّ إجابتي من دون إيجاد الانحراف المعياري لكل تمثيل. 19



تحدد: في مجموعة بيانات إحصائية، إذا كان: $\sum x = 10$, $n = 53$, $3x - 1 = 53$, فأجد x . 20

تبرير: هل يمكن أن يكون الانحراف المعياري لمجموعة من البيانات صفرًا؟ أبُرُّ إجابتي. 21

تحدد: تمكّن يوسف في لعبة إلكترونية من إحراز النقاط الآتية في المراحل الست الأولى من اللعبة: 34, 54, 24, 37, 39, 42. أجد عدد النقاط التي يتبعها يوسف إحرازها في المرحلة السابعة من اللعبة ليكون الانحراف المعياري لنتائجها في المراحل السبع هو $10\sqrt{2}$.

الجداؤل التكرارية ذات الفئات Frequency Tables with Class Intervals



- تنظيم البيانات في جداول تكرارية ذات فئات متساوية الطول.
- تقدير مقاييس النزعة المركزية للجداؤل التكرارية ذات الفئات.

فكرة الدرس



مسألة اليوم



في ما يأتي الزمن (مقرّباً إلى أقرب دقة) الذي استغرقته مجموعة من الأطفال لإنهاء لعبة قطع الترکيب:

83	114	84	90	103
77	92	108	124	185
89	74	176	61	162
49	63	79	91	65

- أُنظِّمُ البيانات في جدول تكراري ذي فئات متساوية الطول.
- أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات.

إنشاء جدول تكراري ذي فئات متساوية الطول لتمثيل بيانات متصلة

تعلّمْتُ سابقاً أنَّ الفئات تُستعمل لتجمِيع البيانات العددية المتصلة وعرضها عرضاً مُبسطاً، وأنَّ الجداول التكرارية ذات الفئات تُستعمل لعرض البيانات العددية المتصلة والمجمعة في فئات، بحيث تُقابل كل فئة عدد البيانات التي تحويها (التكرار). والآن سأتعلّمُ كيف أُنشئ جدوًلا تكرارياً ذات فئات متساوية الطول لتمثيل بيانات متصلة.



مثال 1: من الحياة

أذكّر

البيانات المتصلة هي بيانات قيمها الممكّنة غير قابلة للعد، لكنّها قابلة للقياس، ويمكن تقييّها لتعطى درجةً من الدقة. ومن أمثلتها: الطول، والكتلة، ودرجة الحرارة.

رياضة: في ما يأتي الزمن (مقرّباً إلى أقرب دقة) المستغرق في لعب 24 مباراة كرة تنس:

102	126	216	104	66	93	129	186
54	73	194	138	98	77	145	90
238	55	87	165	181	94	110	176

أُنظِّمُ البيانات في جدول تكراري ذي فئات متساوية الطول.

1

الخطوة 1: أحدّد أصغر قيمة في البيانات، وأكبر قيمة فيها.

أصغر قيمة في البيانات هي 54، وأكبر قيمة فيها هي 238.

الخطوة 2: اختار فئات مناسبة تشمل جميع البيانات المستهدفة.

اختار فئات تساوى في الطول، وتشمل جميع البيانات، مثل اختيار 5 فئات متساوية في الطول. وبما أن البيانات متصلة، فإنني أستعمل المتباينات للتعبير عن الفئات كما في الجدول الآتي:

الزمن المستغرق لمباريات التنس (t)		
الزمن (min)	الإشارات	التكرار
$40 \leq t < 80$		
$80 \leq t < 120$		
$120 \leq t < 160$		
$160 \leq t < 200$		
$200 \leq t < 240$		

الخطوة 3: أضع إشارات عد مُقابل كل فئة بحيث تمثل عدد البيانات التي تحويها، ثم أكتب عدد الإشارات في عمود التكرار.

الزمن المستغرق لمباريات التنس (t)		
الزمن (min)	الإشارات	التكرار
$40 \leq t < 80$		5
$80 \leq t < 120$		8
$120 \leq t < 160$		4
$160 \leq t < 200$		5
$200 \leq t < 240$		2

أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات.

الاحظ من الجدول التكراري أن معظم المباريات تستغرق زمناً يتراوح بين 80 دقيقة و 200 دقيقة، وأن عدداً قليلاً منها يستمر أقل من ذلك أو أكثر.

اتحقق من فهمي

صحة: في ما يأتي كتل 27 مشتركاً في نادٍ رياضيًّا، مُقرَّبة إلى أقرب كيلوغرام:

53	67	72	55	40	86	75	50	57
64	68	73	82	79	48	53	60	65
67	61	56	45	63	70	69	75	70

(a) أُنظم البيانات في جدول تكراري ذي فئات متساوية الطول.

(b) أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات.

أتعلم

يُفضَّل ألا يقل عدد الفئات المختارة عن 4 فئات، وألا يزيد عددها على 8 فئات، ولا يُشتَّرط أن يكون الحد الأدنى للفئة الأولى هو أصغر قيمة في البيانات، وإنما يجب أن تحتوي الفئة الأولى على أصغر قيمة في البيانات، وكذا الحال بالنسبة إلى الفئة الأخيرة والقيمة الكبرى في البيانات.

أذكر

يقع العدد 40 ضمن الفئة: $40 \leq t < 80$ ، في حين لا يقع العدد 80 ضمن هذه الفئة.

الوحدة 8

إنشاء جدولٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ متساويةٍ الطولِ لتمثيلٍ بياناتٍ منفصلةٍ

تعلّمتُ سابقاً أنَّ الفئاتِ تُسْتَعْمَلُ أَيْضًا لِتَجْمِيعِ الْبَيَانَاتِ الْعَدْدِيَّةِ الْمُنْفَصَلَةِ وَعَرْضِهَا عَرْضًا مُبِسَّطًا، وَأَنَّ الْجَدَوَلَ الْتَّكْرَارِيَّةَ ذَاتَ الْفَئَاتِ تُسْتَعْمَلُ لِعَرْضِ الْبَيَانَاتِ الْعَدْدِيَّةِ الْمُنْفَصَلَةِ وَالْمُجْمَعَةِ فِي فَئَاتٍ، بِحِيثُ تُقَابِلُ كُلُّ فَئَةٍ عَدَّ الْبَيَانَاتِ الَّتِي تَحْوِيهَا (الْتَّكْرَارُ). وَالآنَ سَأَتَعَلَّمُ كَيْفَ أُنْشِئُ جَدَوْلًا تَكْرَارِيًّا ذِي فَئَاتٍ متساويةٍ الطولِ لِتَمثيلٍ بَيَانَاتٍ مُنْفَصَلَةٍ.

أتذَكَّرُ

البياناتُ المُنْفَصَلَةُ هِيَ بَيَاناتٌ تَأْخُذُ قِيمَةً مُحَدَّدةً قَابِلَةً لِلْعَدَدِ، مُثَلَّ: عَدَدِ الْأَخْوَةِ، عَدَدِ الْكِتَبِ، وَعَدَدِ الْأَشْجَارِ.

مثال 2: من الحياة

مُكَتَّبَاتُ: فِي مَا يَأْتِي عَدُدُ الْكِتَبِ الْمُعَارَةِ مِنْ إِحْدَى الْمُكَتَّبَاتِ الْعَامَّةِ فِي 18 يَوْمًا:

23	45	31	37	63	54	36	60	49
50	32	45	40	38	37	41	53	57

أُنْظِمُ الْبَيَانَاتِ فِي جَدَوْلٍ تَكْرَارِيٍّ ذِي فَئَاتٍ متساويةٍ الطولِ.

1

الخطوة 1: أَحْدِدُ أَقْلَى قِيمَةً فِي الْبَيَانَاتِ، وَأَكْبَرَ قِيمَةً فِيهَا.

أَقْلَى قِيمَةً فِي الْبَيَانَاتِ هِيَ: 23، وَأَكْبَرُ قِيمَةً فِيهَا هِيَ: 63.

الخطوة 2: أَخْتَارُ فَئَاتٍ مُنْاسِبَةً تَشْمَلُ جَمِيعَ الْبَيَانَاتِ الْمُسْتَهْدَفَةِ.

أَخْتَارُ فَئَاتٍ تَسْتَوِي فِي الطُّولِ، وَتَشْمَلُ جَمِيعَ الْبَيَانَاتِ، مُثَلَّ اخْتِيَارِ 5 فَئَاتٍ متساويةٍ فِي الطُّولِ.

وَبِمَا أَنَّ الْبَيَانَاتِ مُنْفَصَلَةٌ، فَإِنَّنِي أَعْبُرُ عَنْهَا كَمَا فِي الْجَدَوْلِ الْأَتَى:

عَدُدُ الْكِتَبِ الْمُعَارَةِ فِي إِحْدَى الْمُكَتَّبَاتِ		
عَدُدُ الْكِتَبِ الْمُعَارَةِ	الإِشَارَاتُ	الْتَّكْرَارُ
20 – 29		
30 – 39		
40 – 49		
50 – 59		
60 – 69		

أتذَكَّرُ

عَنْدَ تَنْظِيمِ الْبَيَانَاتِ الْمُنْفَصَلَةِ بِالْفَئَاتِ، أَجْعَلُ فَجْرَوَاتٍ بَيْنَ الْفَئَاتِ. فَمُثَلَّاً: تَنْهِيَ الْفَئَةُ الْأُولَى عَنْدَ الْعَدَدِ 29، وَتَبْدِيَ الْفَئَةُ الثَّانِيَةُ عَنْدَ الْعَدَدِ 30.

الخطوة 3: أضع إشارات عدّ مقابل كلّ فئة بحيث تمثّل عدد البيانات التي تحويها، ثمّ أكتب عدد الإشارات في عمود التكرار.

عدد الكتب المعاشرة في إحدى المكتبات		
العمر (بالعام)	الإشارات	التكرار
20 – 29		1
30 – 39		6
40 – 49		5
50 – 59		4
60 – 69		2

أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات.

2

الاحظ من الجدول التكراري أنّ نسبة الأيام التي أعارت المكتبة فيها ما يتراوح بين 30 إلى 59 كتاباً في اليوم الواحد تزيد على 80% من أيام الإعارة.

أتحقق من فهمي

بنك الطعام الأردني: في ما يأتي عدد الأسر المحتاجة التي حصلت على وجبات من بنك الطعام الأردني في 22 يوماً:

41	24	13	14	15	16	30	17	56	18	19
24	22	12	20	27	17	34	10	18	72	16

(a) أنظم البيانات في جدول تكراري ذي فئات متساوية الطول

(b) أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات

معلومات



يهدف بنك الطعام الأردني إلى القضاء على الجوع في الأردن عن طريق توفير الطعام للأسر المحتاجة، ويهدّف أيضًا إلى نشر الوعي حول كيفية استغلال الفائض من الغذاء في المؤتمرات والأفراح والمناسبات وإيصاله إلى الفقراء والمحرومين.

تقدير مقاييس النزعة المركزية لبيانات منظمة في جداول تكرارية ذات فئات

تعلّمت سابقاً إيجاد مقاييس النزعة المركزية، وهي: الوسط الحسابي، والوسط، والمنوال للبيانات المفردة. وبالرغم من أن الجداول التكرارية ذات الفئات لا تظهر فيها القيم الحقيقة للبيانات، فإنه يمكن استعمالها لتقدير كلّ من الوسط الحسابي، والوسط، والمنوال؛ إذ يمكن النظر إلى جميع القيم في فئة معينة (سواء كانت البيانات متصلة أو منفصلة) على أساس أن كلاً منها تساوي متتصف الفئة (مركز الفئة).

الوحدة 8

تقدير مقاييس النزعة المركزية لبيانات منتظمة في
جداول تكرارية ذات فئات

مفهوم أساسيٌّ

- لتقدير الوسط الحسابي لبيانات منتظمة في جداول تكرارية ذات فئات، أستعمل الصيغة الآتية:
$$\mu = \frac{\sum(x \times f)}{\sum f}$$
 حيث:
 x : مركز الفئة.
 f : التكرار المقابل لكل فئة.
- لتقدير المنوال لبيانات منتظمة في جداول تكرارية ذات فئات، أجد مركز الفئة الأكثر تكراراً.
- لتقدير وسيط بيانات منتظمة في جداول تكرارية ذات فئات، أجد مركز الفئة التي تكرارها التراكمي هو أول تكرار تراكمي أكبر من أو يساوي: $\frac{n+1}{2}$ ، حيث n مجموع التكرارات.


أتعلّم

في هذا الدرس، أنظر إلى جميع البيانات بوصفها تمثل مجتمعاً إحصائياً، يرمز إلى وسطه الحسابي بالرمز μ .

مثال 3 : من الحياة



1



طقس: يبيّن الجدول المجاور توزيعاً لأيام شهر آذار بحسب درجات الحرارة (إلى أقرب درجة سلسلية) في محافظة عجلون:
أقدر الوسط الحسابي لدرجات الحرارة.

درجات الحرارة (T)	التكرار
$10 \leq T < 12$	3
$12 \leq T < 14$	7
$14 \leq T < 16$	12
$16 \leq T < 18$	5
$18 \leq T < 20$	3

أنشئ جدولًا بإضافة عمودين إلى الجدول المعطى، أنظم فيما مراكز الفئات ونواتج ضرب التكرارات في مراكز الفئات على النحو الآتي:

درجات الحرارة (T)	f	x	$f \times x$
$10 \leq T < 12$	3	11	33
$12 \leq T < 14$	7	13	91
$14 \leq T < 16$	12	15	180
$16 \leq T < 18$	5	17	85
$18 \leq T < 20$	3	19	57
المجموع	30		446

$$\mu = \frac{\sum(x \times f)}{\sum f}$$

$$= \frac{446}{30}$$

$$\approx 14.9$$

صيغة الوسط الحسابي

بالتعميض

باستعمال الآلة الحاسبة

إذن، الوسط الحسابي لدرجات الحرارة هو 14.9°C تقريباً.

أقدر منوال درجات الحرارة.

لتقدير المنوال، أبحث عن مركز الفئة الأكثر تكراراً. وبالرجوع إلى البيانات في الجدول أعلاه،لاحظ أن الفئة $t < 16$ تقابل أعلى تكرار، وهو 12. وبذلك، فإن المنوال هو مركز هذه الفئة تقريباً.

إذن، منوال درجات الحرارة هو 15 تقريباً.

أقدر وسيط درجات الحرارة.

درجات الحرارة $(^{\circ}\text{C})$	التكرار التراكمي
$10 \leq T < 12$	3
$12 \leq T < 14$	$3 + 7 = 10$
$14 \leq T < 16$	$3 + 7 + 12 = 22$
$16 \leq T < 18$	$3 + 7 + 12 + 5 = 27$
$18 \leq T < 20$	$3 + 7 + 12 + 5 + 3 = 30$

الخطوة 1: أنشئ جدول التكرار التراكمي بإضافة عمود التكرار التراكمي كما في الجدول المجاور.

الخطوة 2: أحدد رتبة وسيط.

$$\text{رتبة وسيط هي: } \frac{n+1}{2} = \frac{30+1}{2} = 15.5$$

الخطوة 3: أحدد الفئة التي يقع فيها وسيط البيانات.

بما أن رتبة وسيط هي 15.5، فإن وسيط درجات الحرارة يقع في الفئة $t < 16$ لأن

التكرار التراكمي لهذه الفئة هو أول تكرار تراكمي أكبر من أو يساوي 15.5.

وبذلك، فإن وسيط هو مركز هذه الفئة تقريباً.

إذن، وسيط درجات الحرارة هو 15 تقريباً.

أتعلم

عند ترتيب المشاهدات تصاعدياً بحسب قيمها، فإن رتبة المشاهدة هي ترتيب موقعها في مجموعة البيانات. وبما أن القيم الدقيقة للبيانات في هذا المثال غير معلومة، فإنه يمكن تحديد الفئة التي تقع فيها المشاهدة عن طريق رتبتها، وإنشاء جدول تكرار تراكمي.

الوحدة 8

أتحقق من فهمي

كتل الكعكات (m)	
الكتل (g)	التكرار
$300 \leq m < 400$	4
$400 \leq m < 500$	7
$500 \leq m < 600$	6
$600 \leq m < 700$	3

حلوياتٌ: يُبيّن الجدول المجاور توزيعاً لكتل كعكٍاتٍ في أحد المخابز، مُقرّبةً إلى أقرب غرام:

(a) أقدر الوسط الحسابي للكتل.

(b) أقدر منوال الكتل.

(c) أقدر وسيط الكتل.

أدرب وأحل المسائل



أوراق: في ما يأتي أطوال مجموعٍة من أوراق الشجر بالستيمتر:

11.4	6.3	9.8	13.2	8.5	16.3	5.4	7.9	10.2	11.5	8.6	7.0
8.7	12.1	9.9	8.7	10.7	8.5	11.2	14.8	17.2	12.6	10.4	8.7

1 أنظم البيانات في جدولٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ متساوية الطول.

2 أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات.



مقالات: في ما يأتي عدد الكلمات في مقالاتٍ كتبها الطلبة المُتقدّمون لمسابقة المقالة القصيرة:

495	511	483	502	500	496	532	498	496
499	503	521	487	518	526	508	514	503

3 أنظم البيانات في جدولٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ متساوية الطول.

4 أستعمل الجدول التكراري لوصف توزيع البيانات.

عياداتٌ طبية: في ما يأنـي أعمار المـراجـعـين لـعيـادـة في أحد المستـشـفيـات خـلـالـ أحدـ الأـيـامـ:

44	64	41	53	58	45	55	54	62	51
50	47	58	37	49	52	43	47	52	49
52	58	53	50	47	44	56	62	51	58

5 أـنـظـمـ الـبـيـانـاتـ فيـ جـدـولـ تـكـرـارـيـ ذـيـ فـئـاتـ مـتـسـاوـيـةـ الطـولـ.

6 أـسـتـعـمـلـ جـدـولـ تـكـرـارـيـ لـوـصـفـ تـوزـيـعـ الـبـيـانـاتـ.

7 أـعـيـدـ تـنـظـيمـ الـبـيـانـاتـ فيـ جـدـولـ تـكـرـارـيـ ذـيـ فـئـاتـ مـتـسـاوـيـةـ الطـولـ، بـحـيـثـ أـخـتـارـ فـئـاتـ ذـاتـ أـطـوـالـ تـخـلـفـ عـنـ أـطـوـالـ فـئـاتـ فيـ الفـرـعـ 5ـ، ثـمـ أـحـدـدـ جـدـولـ ذـيـ تـعـرـضـ فـيـهـ الـبـيـانـاتـ بـصـورـةـ أـفـضـلـ.

أطـوـالـ أـزـهـارـ التـرـجـسـ (t)	
الـطـوـلـ (cm)	الـتـكـرـارـ
10 ≤ t < 14	21
14 ≤ t < 18	57
18 ≤ t < 22	65
22 ≤ t < 26	52
26 ≤ t < 30	12



أـزـهـارـ: يـبـيـنـ جـدـولـ الـمـجاـوـرـ تـوزـيـعـاـ لـأـطـوـالـ مـجـمـوعـةـ مـنـ أـزـهـارـ التـرـجـسـ، مـقـرـبـةـ إـلـىـ أـقـرـبـ سـتـيـمـترـ:

8 أـقـدـرـ الـوـسـطـ الـحـسـابـيـ لـأـطـوـالـ الأـزـهـارـ.

9 أـقـدـرـ مـنـوـالـ أـطـوـالـ الأـزـهـارـ.

10 أـقـدـرـ وـسـيـطـ أـطـوـالـ الأـزـهـارـ.

عـدـدـ الـكـتـبـ الـمـبـيـعـةـ	
عـدـدـ الـكـتـبـ	الـتـكـرـارـ
1 – 3	10
4 – 6	8
7 – 9	4
10 – 12	1
13 – 15	2

كتـبـ: يـبـيـنـ جـدـولـ الـمـجاـوـرـ تـوزـيـعـاـ لـأـعـدـادـ الـكـتـبـ الـتـيـ اـشـتـرـاـهاـ 25ـ شـخـصـاـ مـنـ مـكـتـبـةـ زـيـادـ فيـ أحدـ الأـيـامـ:

11 أـقـدـرـ الـوـسـطـ الـحـسـابـيـ لـلـبـيـانـاتـ.

12 أـقـدـرـ مـنـوـالـ الـبـيـانـاتـ.

13 أـقـدـرـ وـسـيـطـ الـبـيـانـاتـ.

14 أـخـلـ الـمـسـأـلـةـ الـوـارـدـةـ بـدـاـيـةـ الـدـرـسـ.

الوحدة 8

العمر الافتراضي للمصابيح (h)	
العمر (h)	التكرار
$150 \leq h < 175$	24
$175 \leq h < 200$	45
$200 \leq h < 225$	18
$225 \leq h < 250$	10
$250 \leq h < 275$	3



تبرير: أخبر قسم الجودة في مصنع لإنتاج المصايبِ الكهربائية

100 مصباحٍ لتعرفِ إذا كان متوسطُ العمرِ الافتراضيِّ للمصابيحِ أكثر

من 200 ساعةٍ، ثم نظمَ النتائجَ التي توصلَ إليها في الجدولِ المجاورِ:

أقدرُ متوالَ أعمارِ المصايبِ. 15

أجدُ الوسطَ الحسابيَّ لأعمارِ المصايبِ. 16

أجدُ النسبةَ المئويةَ للمصايبِ التي عمرُها الافتراضيُّ أكثرُ من أو يساوي 200 ساعةٍ، مبرراً إجابتي. 17

هل يمكنُ استنتاجُ أنَّ متوسطَ العمرِ الافتراضيِّ للمصابيحِ هو أكثرُ من 200 ساعةٍ؟ أبُرُّ إجابتي. 18

اكتشفُ الخطأ: في ما يأتي عددُ الدقائقِ (مُقرَّبةٌ إلى أقربِ دقيقةٍ) التي استغرَّتها بعضُ المُتسابقينَ لإنها سباقٌ للجريِّ: 19

54	57	55	59	52	53	58	59	61	60	55
57	59	60	57	58	54	58	57	58	61	54

نظمَ كُلُّ من رامي وفيصلِ البياناتِ كما هو مُبيَّنُ تالِيًّا. أيُّهما نظمَ البياناتِ بصورةٍ صحيحةٍ؟ أبُرُّ إجابتي.

فيصلُ

- $52 \leq t < 54$
- $54 \leq t < 56$
- $56 \leq t < 58$
- $58 \leq t < 60$
- $60 \leq t < 62$

رامي

- 52 – 54
- 55 – 57
- 58 – 60
- 61 – 63

المسافةُ (km)	التكرار
$0 \leq d < 5$	3
$5 \leq d < 10$	8
$10 \leq d < 15$	13
$15 \leq d < 20$	5
$20 \leq d < 25$	2

تبرير: يتدرَّبُ لاعبٌ يومياً على سباقٍ طويِّلِ المسافةِ (الماراثونُ طولُهُ 21 km). يُبيَّنُ الجدولُ المجاورُ توزيعاً للمسافةِ (إلى أقربِ كيلومترٍ) 20

التي يقطعُها اللاعبُ كُلَّ يومٍ خلالَ شهرٍ كاملٍ. إذا وجدَ اللاعبُ أنهُ منَ

الأفضلِ أنْ يقطعَ مسافةً كُلَّ يومٍ تُعادِلُ في متوسِّطِها ثلَثَ مسافةِ السباقِ،

فهُلْ يعني ذلكَ أنهُ تدرَّبَ بصورةٍ كافيةٍ في هذا الشهِرِ؟ أبُرُّ إجابتي.

الدرس 3

المُدَرَّجاتُ التكراريةُ Histograms

تمثيل البيانات المتصلة المنظمة في جداول تكرارية بدرجات تكرارية.

فكرة الدرس



المُدَرَّجاتُ التكراريةُ، الكثافة التكرارية.

المصطلحات



مسألة اليوم




المساحة (m^2)	التكرار
$70 \leq t < 100$	15
$100 \leq t < 150$	18
$150 \leq t < 250$	12
$250 \leq t < 300$	6


يُبيّن الجدول المجاور توزيعاً لمجموعة من الشقق السكنية في إحدى المناطق بحسب المساحة كل منها. أمثل بيانات الجدول باستعمال مخطط تكراري.

المُدَرَّجاتُ التكراريةُ

تعلمت سابقاً أن المخططات التكرارية هي أكثر الطائق شيوعاً لتمثيل البيانات المتصلة والمنفصلة والممثّلة في جداول تكرارية ذات فئات.



استعمل تدريجياً منفصلاً للبيانات المنفصلة.



استعمل تدريجياً متصلًا للبيانات المتصلة.

يُطلق على المخططات التكرارية المستعملة لعرض البيانات العددية المتصلة والمنظمة في جداول تكرارية اسم **المُدَرَّجاتُ التكرارية** (histograms). سأتعلم في هذا الدرس تمثيل نوعين منها، هما: المُدَرَّجاتُ التكرارية ذات الفئات متساوية الطول، والمُدَرَّجاتُ التكرارية ذات الفئات غير متساوية الطول.

أتعلم

تُستعمل المُدَرَّجاتُ التكرارية لتمثيل البيانات المتصلة أصلًا، حتى لو كانت قيمها مقربة إلى أعداد صحيحة.

المُدْرَجَاتِ التَّكَرَارِيَّةِ ذَاتِ الْفَئَاتِ مُتَسَاوِيَّةِ الطَّولِ

عند تمثيل البيانات العددية المتصلة والمجمعة في فئات بمدرجات تكرارية عن طريق استعمال مدرج تكراري ذي فئات متساوية الطول، يجب استعمال تدريج متصل على المحور الأفقي، وهذا يعني عدم وجود فراغات بين أعمدة المدرج.

مثال 1: من الحياة


أطوال: في ما يأتي أطوال 50 طالباً، مقرّبة إلى أقرب سنتيمتر:

145	157	160	148	160	177	156	155	166	166
170	162	160	142	152	155	159	172	152	162
180	152	175	155	170	163	144	173	150	154
136	162	154	164	155	182	147	168	155	170
160	175	163	175	144	160	160	142	158	180

أمثل البيانات باستعمال مدرج تكراري ذي فئات متساوية الطول.

1

أطوال الطلبة (h)	
الطول (cm)	التكرار
$130 \leq h < 140$	1
$140 \leq h < 150$	7
$150 \leq h < 160$	15
$160 \leq h < 170$	15
$170 \leq h < 180$	9
$180 \leq h < 190$	3



الخطوة 1: أنظم البيانات في جدول تكراري ذي فئات متساوية الطول.

أحدد أصغر قيمة في البيانات، وأكبر قيمة فيها. بعد ذلك أختار فئات مناسبة تشمل جميع البيانات المستهدفة.

الخطوة 2: أرسم محوراً أفقياً وآخر عمودياً، ثم أكتب الفئات أسفل المحور الأفقي، ثم أضع تدريجاً مناسباً للمحور الرأسي.

الخطوة 3: أسمى كلاً من المحورين، ثم أكتب عنواناً مناسباً للمدرج التكراري.

الخطوة 4: أرسم عموداً يمثل ارتفاعه تكرار كل فئة.

أتذكّر

إذا بدأت البيانات بعدد أكبر من الصفر، فإنني أبدأ التدريج على المحور بعدد أكبر من الصفر، مشيراً إلى ذلك بخط متعرج.

أكتب وصفاً للبياناتِ.

2

تقعُ أطوالُ أكثرَ منْ نصفِ الطلبةِ بينَ 150 و 170 cm، في حينَ أنَّ طولَ عددٍ قليلٍ منْهمْ يكونُ أكثرَ منْ 180 cm، أو أقْلَ منْ 140 cm.

اتحققُ منْ فهمي

وقتُ: في ما يأتي الزمنُ (مُقرَّباً إلى أقربِ دقيقَةٍ) الذي تستغرقُه 30 طالبةً للوصولِ إلى المدرسةِ:

6	18	29	55	7	34	28	56	33	4
2	41	33	23	7	43	26	53	4	41
32	46	16	17	3	26	17	47	22	17

(a) أُمِّلِ البياناتِ باستعمالِ مُدَرَّجٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ متساويةِ الطولِ.

(b) أكتب وصفاً للبياناتِ.

أتعلَّم

الاحظُ أنَّ النسبةَ بينَ مساحاتِ الأعمدةِ في المثالِ 1 هيَ: 10:70:150:90:30، وأنَّ النسبةَ بينَ التكراراتِ هيَ: 1: 7 : 15 : 9 : 3، وهذا يعني أنَّ النسبةَ بينَ مساحاتِ الأعمدةِ متناسبَةٌ معَ النسبةَ بينَ التكراراتِ، وسألاحظُ أهميَّةَ ذلكَ في المثالِ التالي.

المدَرَّجُ التكراريُّ ذاتُ الفئاتِ غيرِ متساويةِ الطولِ

في بعضِ الأحيانِ، تُجَمِّعُ البياناتُ المتصلةُ في جداولِ تكراريَّةٍ ذاتِ فئاتٍ غيرِ متساويةٍ في الطولِ. وفي هذهِ الحالةِ، يتعيَّنُ تمثيلُ هذهِ البياناتِ بمُدَرَّجٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ غيرِ متساويةِ الطولِ. ولكنْ، إذا مثَّلَتِ البياناتُ باستعمالِ تكراراتِها، فإنَّ التمثيلَ الناتجَ يكونُ مضللاً؛ لأنَّ النسبةَ بينَ مساحاتِ الأعمدةِ لا تكونُ متناسبَةٌ معَ النسبةَ بينَ التكراراتِ. وهنا تظهرُ الحاجةُ إلى إيجادِ الكثافةِ التكراريَّةِ (frequency density) لكلِّ فئةٍ، وذلكَ بقسمةِ تكرارِ الفئةِ على طولِها كما يأتي:

$$\frac{(\text{تكرار الفئة})}{(\text{طول الفئة})} = (\text{الكثافة التكراريَّة})$$

عندَ تمثيلِ الجداولِ التكراريَّةِ ذاتِ الفئاتِ غيرِ المتساويةِ في الطولِ بمُدَرَّجاتِ تكراريَّةٍ، فإنَّ المحورَ لا يُسمَّى الكثافةِ التكراريَّة، وإنَّ ارتفاعَ كُلِّ عمودٍ يُمثِّلُ الكثافةَ التكراريَّةَ لفتيته.

مثال 2: من الحياة

الطول (cm)	التكرار
$15 \leq t < 20$	6
$20 \leq t < 30$	14
$30 \leq t < 40$	26
$40 \leq t < 60$	2

أحياء: قاسَتْ عالِمَةُ أَحْيَاءٍ أَطْوَالَ 48 دُودَةً أَرْضِيَّةً، ثُمَّ نَظَّمَتِ الْبَيَانَاتِ الَّتِي تَوَصَّلَتِ إِلَيْهَا فِي الجُدُولِ التَّكَرَارِيِّ الْمُجَاوِرِ. أَمْثَلَ بَيَانَاتِ الْجُدُولِ بِاستِعْمَالِ الْمُدْرَجِ التَّكَرَارِيِّ.


الخطوة 1: أُنْشِئُ جُدُولًا بِإِضَافَةِ عَمُودَيْنِ إِلَى الْجُدُولِ الْمُعَطَّى، أَنْظِمُ فِيهِمَا أَطْوَالَ الْفَئَاتِ وَالكَثَافَةِ التَّكَرَارِيَّةِ عَلَى النُّحوِ الآتِيِّ:

الطول (cm)	النَّكَرَارُ	طُولُ الْفَئَةِ	الكَثَافَةُ التَّكَرَارِيَّةُ
$15 \leq t < 20$	6	5	1.2
$20 \leq t < 30$	14	10	1.4
$30 \leq t < 40$	26	10	2.6
$40 \leq t < 60$	2	20	0.1

أتعلّم

طُولُ الْفَئَةِ الْأُولَى هُوَ: $20 - 15 = 5$ نَفِسَهَا يُمْكِنُ إِيْجَادُ أَطْوَالِ بَقِيَّةِ الْفَئَاتِ.

أَطْوَالُ دُودَ الْأَرْضِ



الخطوة 2: أَرْسِمُ محَورًا أَفْقِيًّا وَآخِرَ عَمُودِيًّا، ثُمَّ أَكْتُبُ الْفَئَاتِ أَسْفَلَ الْمُحَورِ الْأَفْقِيِّ، ثُمَّ أَضْعُ تدريجيًّا مَنْاسِبًا لِلْمُحَورِ الرَّأْسِيِّ.

الخطوة 3: أَسْمِي كُلًا مِنَ الْمُحَورَيْنِ، ثُمَّ أَكْتُبُ عَنْوَانًا مَنْاسِبًا لِلْمُدْرَجِ التَّكَرَارِيِّ.

الخطوة 4: أَرْسِمُ عَمُودًا يُمْثِلُ ارْتِفَاعَهُ الْكَثَافَةُ التَّكَرَارِيَّةِ لِكُلِّ فَتَةٍ.

أتحققُ مِنْ فَهْمِي


الزمنُ (h)	النَّكَرَارُ
$0 \leq h < 0.5$	5
$0.5 \leq h < 1$	35
$1 \leq h < 2$	56
$2 \leq h < 3$	4

تلفاز: يُبَيِّنُ الْجُدُولُ التَّكَرَارِيُّ الْمُجَاوِرُ الزَّمْنَ (بِالسَّاعَاتِ) الَّذِي يَسْتَغْرِقُهُ 100 شَخْصٍ يَوْمِيًّا فِي مَشَاهِدَةِ التَّلْفَازِ. أَمْثَلَ بَيَانَاتِ الْجُدُولِ بِاستِعْمَالِ الْمُدْرَجِ التَّكَرَارِيِّ.

يمكن استعمال المدرج ذات التكرارية ذات الفئات غير متساوية الطول لتفسير البيانات التي يمثلها المدرج التكراري.

مثال 3 : من الحياة

مكالمات: أجري مسح على مجموعة من الأشخاص لتحديد مدد مكالماتهم الهاتفية الأخيرة، ثم مثّلت البيانات التي خلص إليها المسح بالمدرج التكراري الآتي :



1 كم شخصا شارك في عملية المسح؟

بما أن ارتفاعات الأعمدة لا تمثل التكرارات، وإنما تمثل الكثافة التكرارية للفئة، فإنه يتعين إيجاد تكرار كل فئة، وذلك بإيجاد مساحة كل عمود، علمًا بأن مجموع هذه المساحات يمثل عدد الأشخاص الذين شاركوا في عملية المسح :


$$\begin{aligned}
 A &= (25 \times 5) + (30 \times 5) + (20 \times 10) + \\
 &\quad (10 \times 10) + (5 \times 20) + (10 \times 10) \\
 &= 775
 \end{aligned}$$

مجموع مساحات الأعمدة

بالتبسيط

إذن، شارك في عملية المسح 775 شخصا.

أجد عدد الأشخاص الذين تزيد مدد مكالماتهم الهاتفية على 40 دقيقة.



لإيجاد عدد الأشخاص الذين تزيد مدد مكالماتهم الهاتفية على 40 دقيقة، أجد مساحة العمودين المظللين باللون الأزرق الغامق في الشكل المجاور:

أتعلم

بما أن الكثافة التكرارية تمثل ناتج قسمة تكرار الفئة على طولها، فإنه يمكن إيجاد تكرار الفئة بضرب الكثافة التكرارية للفئة في طول الفئة، وهذا يمثل مساحة العمود الممثل للفئة.

الوحدة 8

$$A = (10 \times 5) + (10 \times 10)$$


$$= 150$$

مجموع مساحتى العمودين

بالتبسيط

إذن، عدد الأشخاص الذين تزيد مدة مكالماتهم الهاتفية على 40 دقيقة هو 150 شخصاً.

أتحقق من فهمي



علامات: يبين المدرج التكراري المجاور

علامات مجموعه من الطلبة في اختبار نهاية

العظمى هي 150

(a) كم طالبا تقدما للاختبار؟

(b) أجد عدد الطلبة الذين تزيد علاماتهم

على 124.

(c) أجد عدد الطلبة الذين تقع علاماتهم بين 100 و130.

أتدرب وأحل المسائل

سباقات: في ما يأتي الزمن (بالثواني) الذي تستغرقه مجموعة من الطلبة لإنها سباق للجري :

52 63 81 66 75 59 77 66 80 64 72 78 58 61 68 72 76 66

74 79 65 82 87 91 68 77 75 86 81 70 93 68 74 80 68 84

أمثل البيانات باستعمال مدرج تكراري ذي فئات متساوية الطول . 1

أكتب وصفاً للبيانات . 2

أطوال: يبين الجدول التكراري المجاور أطوال مجموعة من الطالبات 3

بالستيمتر. أمثل بيانات الجدول باستعمال المدرج التكراري.

الطول (h)	ال التكرار
$120 \leq h < 130$	8
$130 \leq h < 140$	12
$140 \leq h < 150$	10
$150 \leq h < 160$	7


درجة الحرارة (t)	التكرار
$8 \leq t < 10$	6
$10 \leq t < 12$	13
$12 \leq t < 15$	18
$15 \leq t < 17$	4
$17 \leq t < 20$	3
$20 \leq t < 24$	6

درجات حرارة: يُبيّن الجدول التكراري المجاور توزيع درجات الحرارة (بالسلسيوس) خلال 50 يوماً في إحدى المناطق. أمثل بيانات الجدول باستعمال المدرج التكراري.

أمثل البيانات في كل من الجدولين التكراريين الآتيين باستعمال المدرج التكراري.

5	الزمن	$0 \leq t < 8$	$8 \leq t < 12$	$12 \leq t < 16$	$16 \leq t < 20$
5	الزمن	72	84	54	36

6	العمر (بالعام)	$11 \leq a < 14$	$14 \leq a < 16$	$16 \leq a < 17$	$17 \leq a < 20$
6	العمر (بالعام)	51	36	12	20



شركات: يُبيّن المدرج التكراري المجاور للزمن (بالدقائق) الذي يستغرقه موظفو إحدى الشركات للوصول إلى مكان العمل:

أجد عدد موظفي الشركة.

أجد عدد الموظفين الذين يصلون إلى مكان العمل بأقل من 15 دقيقة.


أجد عدد الموظفين الذين يستغرقون وصولهم إلى مكان العمل زماناً يتراوح بين 20 دقيقة و 30 دقيقة.

أجد عدد الموظفين الذين يصلون إلى مكان العمل بزمن أكثر من 30 دقيقة.


الوحدة 8

أُنشئ جدولًا تكراريًّا لكُلٌّ من المُدَرَّجات التكراريَّة الآتية:

11



12



13

سرعة: أُجِرِيَ مسحٌ لِتعرُّف سرعةَ السَّيَّاراتِ التي تمرُّ من نقطةٍ مُعيَّنةٍ على إحدى الطرق السريعة، ثُمَّ مُثُلِّتَ البياناتُ التي خَلُصَ إِلَيْها المسحُ بالمُدَرَّج التكراريِّ المجاورِ.

أَمَلأُ الفراغَ في الجدولِ الآتِي بِبناءً عَلَى التمثيلِ بالمُدَرَّج التكراريِّ أَعلاهُ.

السرعة	$0 \leq y < 40$	$40 \leq y < 50$	$50 \leq y < 60$	$60 \leq y < 70$	$70 \leq y < 80$	$80 \leq y < 100$
النكرار		10	40	110		


أَجِدُّ عَدَدَ السَّيَّاراتِ التي أُجِرِيَ عَلَيْها المسحُ.

14



أصل المسألة الواردة بدايةً الدرس. 15

مهارات التفكير العليا

تبرير: يبيّن المُدْرَج التكراري الآتي علامات مجموعٍ من الطلبة في أحد الاختبارات. إذا كانت علامات النجاح في الاختبار هي 90، فأجد نسبة الطلبة الذين أخفقوا في الاختبار، مبرّراً إجابتي. 16



تحدٍ: يسجّل برنامج حاسوبٍ في إحدى المؤسساتِ الزمنَ (بالدقائق) الذي يتطلّبُ المتصلونَ قبلَ الردِّ على مكالماتهم في الفترة الصباحيةِ والفترة المسائيةِ. وقد مثّلت البياناتُ التي سجّلَها البرنامجُ في أحد الأيامِ بالمُدَرَّجينِ التكراريينِ الآتيينِ:



أجد عدد المكالمات التي انتظرَ فيها المتصلونَ أكثرَ منْ 4 دقائقَ قبلَ الردِّ عليهم في الفترة الصباحيةِ منْ ذلك اليوم. 17

أجد نسبة المكالماتِ التي رُدَّ فيها على المتصلينَ خلالَ ما لا يزيدُ على دقيقتينِ في ذلك اليوم. 18

الاحتمالات وأشكالٌ فِنْ

Probabilities and Venn Diagrams

إيجاد الاحتمال باستعمال أشكالٍ فِنْ.

فكرة الدرس



الحدث المتمم، الحوادث المتنافية، الحوادث الشاملة.

المصطلحات



مسألة اليوم





يدرس 120 طالباً في معهد لغاتٍ، منهم 75 طالباً يدرسون اللغة الكورية، و35 طالباً يدرسون اللغة الإسبانية، و10 طلبة يدرسون اللغتين معاً. إذا اختير طالبٌ من المعهد عشوائياً، فما احتمال أن يكون ممن يدرسون اللغة الكورية فقط؟



التعبير بالرموز عن حوادث مُمثّلة بأشكالٍ فِنْ


تعلّمت سابقاً أشكالٍ فِنْ، واستعملتها لتمثيل البيانات؛ وذلك بتقطيعها في مجموعتين أو أكثر باستعمال منحنيات مغلقةٍ مُتداخلةٍ (متقاطعةٌ)؛ إذ يُشكّل كُل منحنٍ مجموعةً مستقلةً من البيانات، ويعتبر الجزء المُتداخل بين المنحنيين المشتركَة بين المجموعتين.



يمكن استعمال أشكالٍ فِنْ للتعبير عن حوادث تجربةٍ عشوائيةٍ بيانياً، وذلك لتسهيل إيجاد احتمالاتٍ هذه الحوادث. فمثلاً، إذا كان A و B حادثين في تجربةٍ عشوائيةٍ، فإنه يمكن تمثيلهما باستعمال أشكالٍ فِنْ، وذلك برسم مستطيل يمثل الفضاء العيني للتجربة، ثم رسم منحنٍ مغلقٍ يمثل الحادث A ، ورسم منحنٍ آخر مغلقٍ يمثل الحادث B .

رموز رياضية


يُستعملُ الحرف اليوناني Ω للدلالة على الفضاء العيني لتجربة عشوائية، وهو مجموعه النواتج التي يُتوقع حدوثها عند إجراء تجربة عشوائية ما، ويقرأ: أو ميجا.


 Ω

تُمثل المنطقة المظللة في شكل المجاور تقاطع الحادث A والحادث B ، ويمكن التعبير عنها بالرمز $A \cap B$.

أتعلم


تقاطع الحادث A والحادث B يعني وقوعهما معاً.


 Ω

أما المنطقة المظللة في شكل المجاور فتمثل اتحاد الحادث A والحادث B ، ويمكن التعبير عنها بالرمز $A \cup B$.

أتعلم


اتحاد الحادث A والحادث B يعني وقوع الحادث A ، أو وقوع الحادث B ، أو وقوع الحادثين معاً.


 Ω

في حين تتمثل المنطقة المظللة في الشكل المجاور **الحادث المتمم** (complement event) للحادث A ، ويمكن التعبير عنه بالرمز \bar{A} .

أتعلم

لأي تجربة عشوائية، فإن \bar{A} يعني عدم وقوع الحادث A .


 Ω


وأما الحادث الذي تمثله المنطقة المظللة في الشكل المجاور فهو وقوع الحادث A فقط، وعدم وقوع الحادث B ، ويمكن التعبير عن هذا الحادث بالرمز $A - B$.

أتعلم

يمكن أيضاً التعبير عن الحادث $A - B$ بالرمز $A \cap \bar{B}$.

مثال 1


أُعبر بالرموز عن الحادث الذي تمثله المنطقة المظللة في كل من أشكال في الآتية:


 Ω

الاحظ أن المنطقة المظللة تُعبر عن متممة الحادث B ؛ لذا يمكن التعبير عن هذا الحادث بالرمز \bar{B} .

الوحدة 8

2




الاحظ أنَّ المنطقة المظللة تُعبِّرُ عن عدم وقوع اتحادِ الحادِث A والحادِث B ؛ لذا يمكنُ التعبيرُ عنْ هذا الحادِث بالرمز $\bar{A} \cup \bar{B}$.

أفكُر

هل يمكنُ التعبيرُ عنِ الحادِث الذي تمثِّلُه المنطقة المظللة بالرموز بطريقةٍ أخرى؟ أبْرُرْ إجابتي.

3




الاحظ أنَّ المنطقة المظللة تُعبِّرُ عن اتحادِ الحادِث المُتممِ للحادِث A والحادِث B ؛ لذا يمكنُ التعبيرُ عنْ هذا الحادِث بالرمز $\bar{A} \cup \bar{B}$.


أتحققُ من فهمي

أعُبرُ بالرموز عنِ الحادِث الذي تمثِّلُه المنطقة المظللة في كلٍّ منْ شكليْ قِنْ الآتَيْنِ:

a)



b)



إيجاد احتمالاتِ حوادث لتجارب عشوائية ممثَّلةً بأشكالِ قِنْ

تعلَّمْتُ سابقاً أنَّه إذا كانتِ التجربة العشوائية متساوية الاحتمال، فإنَّ احتمال وقوع أيِّ حادِث فيها يساوي نسبة عددِ عناصرِ الحادِث إلى عددِ عناصرِ الفضاءِ العينيِّ.

$$P(A) = \frac{\text{(عدد عناصر الحادِث } A)}{\text{(عدد عناصر الفضاء العيني)}}$$

بما أنَّ الفضاء العينيَّ Ω هو مجموعَةٌ تحوي جميعَ النواتج التي يتوقَّع حدوثُها عندَ إجراء تجربةٍ عشوائيةٍ ما، فإنَّ احتمالَ الفضاء العينيِّ هو 1؛ أيُّ إنَّ $P(\Omega) = 1$. ولهذا، فإنَّ احتمالَ الحادِث المُتممِ لأيِّ حادِثٍ في الفضاء العينيِّ، مثلَ A ، هو 1 ناقصُ احتمالِ وقوعِ الحادِث A .

رموز رياضية

يشيرُ الرمزُ $P(A)$ إلى احتمالِ وقوعِ الحادِث A ، علمًا بأنَّ الحرفَ P هو اختصارُ لكلمة (Probability) التي تعني الاحتمالَ.

احتمال الحادث المُتَمَمٍ

مفهوم أساسٍ


بالكلمات: احتمال وقوع الحادث المُتَمَمٍ للحادث A هو 1 ناقص احتمال وقوع الحادث A .

بالرموز: لأي حادث (A) في تجربة عشوائية، فإن:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$


يمكن استعمال المفاهيم السابقة لإيجاد احتمالات حوادث مُمثلة بأشكالٍ قُنْ.

مثال 2



كُتِبَتِ الأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ مِنْ 4 إِلَى 12 عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَطَاقَاتِ الْمُطَابِقَةِ، ثُمَّ اخْتَيَرْتُ بَطَاقَةً عَشَوَائِيًّا، وَمُثَلَّ الفَضَاءِ الْعَيْنِيُّ لِهَذِهِ التَّجْرِبَةِ الْعَشَوَائِيَّةِ الَّتِي تَحْوِيَ الْحَادِثَيْنَ A وَ B فِي شَكْلٍ قُنْ الْمَجَاوِرِ. أَجْدُ كُلَّا مِنَ الْحَامِلَاتِ الْأَتِيَّةِ:


1 $P(A)$



بِمَا أَنَّ عَدَدَ عَنَاصِرِ الْفَضَاءِ الْعَيْنِيِّ هُوَ 9، وَعَدَدَ عَنَاصِرِ الْحَادِثِ A هُوَ 5 كَمَا يَظْهُرُ فِي الْمَنْطَقَةِ الْمُظَلَّةِ مِنَ الْشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ، فَإِنَّ:

$$P(A) = \frac{5}{9}$$

2 $P(\bar{A})$



$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= 1 - P(A) && \text{صيغة احتمال المُتَمَمِ} \\ &= 1 - \frac{5}{9} && \text{بالتعمير} \\ &= \frac{4}{9} && \text{بالتبسيط} \end{aligned}$$

أُفَكِّرُ


أَصْفُ الْحَادِثَ A بِالكلماتِ.

أَتَعْلَمُ

يَظْهُرُ فِي الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ أَنَّ مُتَمَمَّةَ A تَحْوِي 4 عَنَاصِرًا، هِيَ: $\{9, 10, 11, 12\}$ فَإِنَّ احْتِمَالَهَا هُوَ $\frac{4}{9}$

الوحدة 8

3) $P(A \cap B)$



بما أن $A \cap B$ يعني وقوع الحادث A والحادث B معًا، فإن عدد عناصر هذا الحادث هو 2 كما يظهر في المنطقة المظللة من الشكل المجاور.


إذن:

$$P(A \cap B) = \frac{2}{9}$$

أفكّر

أصفُ الحادث B بالكلمات.

4) $P(A \cup B)$




بما أن $A \cup B$ يعني وقوع الحادث A ، أو وقوع الحادث B ، أو وقوع الحادثين معًا، فإن عدد عناصر هذا الحادث هو 8 كما يظهر في المنطقة المظللة من الشكل المجاور.

إذن:

$$P(A \cup B) = \frac{8}{9}$$


5) $P(\bar{A} \cup B)$



بما أن عدد عناصر هذا الحادث هو 6 كما يظهر في المنطقة المظللة من الشكل المجاور، فإن:

$$P(\bar{A} \cup B) = \frac{6}{9}$$

اتحقّق من فهمي



كُبِّيَت الأعداد الصحيحة من 1 إلى 8 على مجموعة من البطاقات المُتطابقة، ثم اختيرت بطاقة عشوائياً، وتمثّل الفضاء العيني لهذه التجربة العشوائية التي تحوي الحادثين A و B في شكل فين المجاور. أجد كلاً من الاحتمالات الآتية:

- a) $P(B)$ b) $P(\bar{B})$ c) $P(A \cap B)$ d) $P(A - B)$

استعمال أشكالٍ فِنِّ لِإيجادِ احتمالاتِ حوادثِ تجاربِ عشوائيةٍ

يمكنُ استعمالُ أشكالٍ فِنِّ لتسهيلِ إيجادِ احتمالاتِ حوادثِ تجاربِ عشوائيةٍ تمثلُ مواقفَ حياتيةً.

مثال 3 : من الحياة



اختبارات: تقدَّم 200 طالبٍ من طلبة الصفِ التاسعِ في إحدى المدارسِ لامتحانِ وطنيٍ يقيِّسُ قدراتِهم في مادتي اللغةِ العربيةِ والرياضياتِ. نجحَ منْ هؤلاءِ الطلبةِ 162 طالبًا في مادةِ اللغةِ العربيةِ، و137 طالبًا في مادةِ الرياضياتِ. أمّا عددُ الطلبةِ الناجحينِ في المادتينِ معاً فبلغَ 121 طالبًا:

أُمِّلِّ البياناتِ بشكلٍ فِنِّ.

1

الخطوة 1: أُحدِّدُ الحوادثِ المذكورةَ في التجربةِ العشوائيةِ.

أفترضُ أنَّ A هوَ حادثُ اختيارِ طالبٍ ناجحٍ في مادةِ اللغةِ العربيةِ، وأنَّ M هوَ حادثُ اختيارِ طالبٍ ناجحٍ في مادةِ الرياضياتِ.

الخطوة 2: أُمِّلِّ الفضاءِ العينيَّ والحوادثِ بشكلٍ فِنِّ.

• أُحدِّدُ عددَ الطلبةِ الناجحينِ في مادةِ اللغةِ العربيةِ فقطُ، وذلكَ بطرحِ عددِ الطلبةِ الناجحينِ في المادتينِ معاً منْ عددِ الطلبةِ الناجحينِ في مادةِ اللغةِ العربيةِ (A):

$$162 - 121 = 41$$

• أُحدِّدُ عددَ الطلبةِ الناجحينِ في مادةِ الرياضياتِ فقطُ، وذلكَ بطرحِ عددِ الطلبةِ الناجحينِ في المادتينِ معاً منْ عددِ الطلبةِ الناجحينِ في مادةِ الرياضياتِ (M):


$$137 - 121 = 16$$

• أُحدِّدُ عددَ الطلبةِ الذينَ لمْ ينجحوا في أيٍّ منَ المادتينِ، وذلكَ بطرحِ عددِ الطلبةِ الناجحينِ في مادةِ اللغةِ العربيةِ فقطُ، وعددِ الطلبةِ الناجحينِ في مادةِ الرياضياتِ فقطُ، وعددِ الطلبةِ الناجحينِ في المادتينِ معاً، منَ العددِ الكليِّ للطلبةِ:

$$200 - (41 + 16 + 121) = 200 - 178 = 22$$

الوحدة 8


أمثل هذه البيانات بشكل قن كالآتي:



أتعلّم

الاحظ أن عناصر الفضاء العيني التي لا يتمي أي منها إلى الحادثين تقع خارج الدائريتين.


- 2 إذا اختير أحد الطلبة المتقدمين عشوائياً، فأجد احتمال أن يكون هذا الطالب ناجحاً في إحدى المادتين على الأقل.



إن كلامي (على الأقل) في السؤال تشيران إلى أن المطلوب هو اتحاد الحادث A والحادث M كما في الشكل المجاور. إذن:

$$P(A \cup M) = \frac{178}{200}$$

- 3 إذا اختير أحد الطلبة المتقدمين عشوائياً، فأجد احتمال أن يكون هذا الطالب ناجحاً في مادة اللغة العربية فقط.



إن احتمال أن يكون الطالب ناجحاً في مادة اللغة العربية فقط يعني إيجاد احتمال الم منطقة المظللة في شكل قن المجاور. إذن:

$$P(A - M) = \frac{41}{200}$$

أتذكّر


إن حادث نجاح الطالب في مادة اللغة العربية فقط يعني عدم نجاحه في مادة الرياضيات، وهو ما يعبر عنه بالرمزي $A - M$ أو $A \cap \bar{M}$.

- صفات وراثية:** يوجد في أحد الصفوف 30 طالبة، منها 16 طالبة من ذوات الشعر الأسود، و 11 طالبة لون عينيهن بني، و 7 طالبات لون عينيهن بني وشعرهن أسود: (a) أمثل البيانات بشكل قن.

- (b) إذا اختيرت طالبة عشوائياً، فأجد احتمال أن يكون شعرها أسود، أو لون عينيها بنيا. (c) إذا اختيرت طالبة عشوائياً، فأجد احتمال أن يكون لون عينيها بنيا، وشعرها ليس أسود. (d) إذا اختيرت طالبة عشوائياً، فأجد احتمالاً لا يكون لون عينيها بنيا، وشعرها ليس أسود.

أتحقق من فهمي

الحوادث المتنافية




الحوادث A و B متنافيان

الحوادث المتنافية (mutually exclusive events)

هي الحوادث التي لا يمكن وقوعها معاً؛ ما يعني عدم وجود عناصر مشتركة بينها. فمثلاً، عند رمي حجر نرد مرتة واحدة، فإن حادث ظهور العدد 5 لا يمكن أن يقع مع حادث ظهور العدد 6 في الوقت نفسه، وهذا يعني أن تقاطعهما هو \emptyset ، وأن احتمال تقاطعهما هو صفر.

مثال 4



كُيِّنَتِ الأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ مِنْ 1 إِلَى 9 عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَطَاقَاتِ الْمُتَطَابِقَةِ، ثُمَّ اخْتَيَرْتِ بَطَاقَةً عَشْوَائِيًّا، وَمُثِلَّ الْفَضَاءِ الْعَيْنِيُّ لِهَذِهِ التَّجْربَةِ الْعَشْوَائِيَّةِ الَّتِي تَحْوِيِ الْحَادِثَيْنِ S و Q فِي شَكْلِهِمَا الْمُجَاوِرِ.


أَجْدُ كُلَّا مِنَ الْاحْتِمَالَيْنِ الْآتَيَيْنِ:

1 $P(S \cap Q)$

أَلْاحِظُ مِنْ شَكْلِهِنَّ أَنَّ الْحَادِثَيْنِ S و Q مُتَنَافِيَيْنِ؛ لَأَنَّهُمَا لَا تَوَجِّدُ عَنَاصِرٍ مُشَارِكَةٍ بَيْنَهُمَا. إِذْنَ:

$$P(S \cap Q) = \frac{0}{9} = 0$$

2 $P(S \cup Q)$




بِمَا أَنَّ الْحَادِثَيْنِ S و Q مُتَنَافِيَيْنِ، فَإِنَّ $S \cup Q$ يُعْنِي وَقْوَى الْحَادِثِ S فَقْطُ، أَوْ وَقْوَى الْحَادِثِ Q فَقْطُ؛ لَأَنَّهُمَا لَا يَقْعَدُانِ مَعًا. وَمِنْ ثَمَّ، فَإِنَّ عَدَدَ عَنَاصِرِ هَذَا الْحَادِثِ هُوَ 7 كَمَا يَظْهُرُ فِي الْمَنْطَقَةِ الْمُظَلَّةِ مِنَ الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ.

إِذْنَ، احْتِمَالُ الْحَادِثِ $S \cup Q$ هُوَ:

$$P(S \cup Q) = \frac{7}{9}$$

الوحدة 8


3) $P(Q - S)$



بما أنَّ الحادث S والحادث Q متنافيان، فإنَّ $Q - S$ يعني وقوع الحادث Q فقط؛ لأنَّهما لا يقعان معاً كما يظهرُ في المنطقة المظللة من الشكل المجاور. إذن:

$$P(Q - S) = \frac{4}{9}$$

أتحققُ من فهمي



كُبِّيتِ الأعداد الصحيحة من 1 إلى 10 على مجموعةٍ من البطاقات المُتطابقة، ثم اخترِتْ بطاقة عشوائياً، ومُثُلَّ الفضاء العيني لهذه التجربة العشوائية التي تحوي الحادثين M و N في شكلِ قُنْ المجاور. أجد كُلَّا من الاحتمالات الآتية:

a) $P(M \cap N)$


b) $P(M \cup N)$

c) $P(M - N)$

الحوادث المتنافية الشاملة

الحوادث الشاملة (exhaustive events) هيَ الحوادث التي يُشكِّلُ اتحادُ نواتِجِها المُحتملةُ الفضاء العينيَّ كاملاً. فمثلاً، عند إلقاء حجر نرد، فإنَّ حادث ظهور عددٍ أكبرٍ من 3 وحداتٍ ظهور عددٍ أقلٍ من 5 يُمثِّلان حادثين شاملينِ. قد تكون بعضُ الحوادث متنافيةٍ وشاملةً. فمثلاً، عند رمي حجر نرد، فإنَّ حادث ظهور عددٍ فرديٍّ وحادث ظهور عددٍ زوجيٍّ يُمثِّلان حادثين متنافيين؛ لأنَّه لا يمكنُ أن يقعان معاً. وهما أيضاً حادثان شاملان؛ لأنَّ نواتِجَهما المُحتملةُ تُشكِّلُ الفضاء العينيَّ كاملاً. يُظهرُ شكلاً قُنْ الآتيان كُلَّا من الحوادث الشاملة، والحوادث المتنافية والشاملة:


الحادث A والحادث شاملان، لكنَّهما ليسا متنافيين.



الحادث A والحادث B متنافيان وشاملان.

إذا كانتِ الحوادث متنافيةٍ وشاملةً، فإنَّ مجموعَ احتمالاتِها هو 1.

مثال 5



قرص دائري مُقسّم إلى 4 قطاعاتٍ غير مُتطابقةٍ، وملوّنةٍ بالأخضر والزهري والأزرق والأصفر كما في الشكل المجاور. إذا كان الجدول الآتي يبيّن احتمال توقف المؤشر عند كل لونٍ من هذه الألوان، فأجد قيمة x .

اللون	الأخضر	الزهري	الأصفر	الأزرق
الاحتمال	0.3	0.4	x	$2x$

بما أنَّ حوادث توقف مؤشر القرص على الألوان الأربع هي حوادث متنافيةٍ شاملةٍ، فإنَّ مجموع احتمالاتها هو 1:

$$0.3 + 0.4 + x + 2x = 1$$

مجموع الحوادث الشاملة

$$0.7 + 3x = 1$$

بجمع الثوابت، وجمع المتغيرات

$$3x = 0.3$$

طرح 0.7 من الطرفين

$$x = 0.1$$

بقسمة طرف في المعادلة على 3

أتحققُ من فهمي

قرص دائري مُقسّم إلى 3 قطاعاتٍ غير مُتطابقةٍ، وملوّنةٍ بالأحمر والأصفر والأزرق. إذا كان الجدول المجاور يبيّن احتمال توقف المؤشر عند كل لونٍ من هذه الألوان، فأجد قيمة x .


اللون	الأزرق	الأحمر	الأصفر
الاحتمال	0.3	0.4	x




أتدربُ وأؤلّل المسائل

أعبر بالرموز عن الحادث الذي تمثله المنطقة المظللة في كلٍّ من أشكالٍ في الآتية:

1




2





الوحدة 8

3



4



Ω

كُتِبَتِ الأَعْدَادُ الصَّحِيحةُ مِنْ 0 إِلَى 9 عَلَى مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْبَطَاقَاتِ الْمُتَطَابِقَةِ، ثُمَّ اخْتِيَرْتُ بطاقةً عَشْوَائِيًّا، وَمُثَلَّ الْفَضَاءُ الْعَيْنِيُّ لِهَذِهِ التَّجْرِيَةِ الْعَشْوَائِيَّةِ الَّتِي تَحْوِيِ الْحَادِثَيْنِ A وَ B فِي شَكْلٍ قَبْلِ الْمَجَاوِرِ. أَجِدُ كُلَّا مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ الْأَتَيَةِ:

5 $P(A)$

6 $P(B)$

7 $P(A \cap B)$

8 $P(A \cup B)$

9 $P(\bar{A})$

10 $P(\bar{B})$

11 $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

12 $P(\bar{A} \cup \bar{B})$

13 $P(B - A)$

يَحْتَوِي صِندُوقٌ عَلَى بَطَاقَاتٍ مُتَطَابِقَةٍ، وَمُرَقَّمَةٍ مِنْ 1 إِلَى 100. إِذَا سُحِبَتْ بطاقةً عَشْوَائِيًّا، فَأَجِدُ احْتِمَالَ كُلَّ حَادِثٍ مَمَّا يَأْتِي بِاستِعْمَالِ أَشْكَالٍ قَبْلِ:

14 أَنْ يَكُونَ الْعَدْدُ الْمُدُوَّنُ عَلَى الْبَطَاقَةِ مِنْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 15، وَمَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 10.

15 أَنْ يَكُونَ الْعَدْدُ الْمُدُوَّنُ عَلَى الْبَطَاقَةِ مِنْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 15 أَوْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 10.

16 أَنْ يَكُونَ الْعَدْدُ الْمُدُوَّنُ عَلَى الْبَطَاقَةِ مِنْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 10، وَلَيْسَ مِنْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 15.

17 أَلَّا يَكُونَ الْعَدْدُ الْمُدُوَّنُ عَلَى الْبَطَاقَةِ مِنْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 10، وَلَا مِنْ مَضَاعِفَاتِ الْعَدْدِ 15.



تَغْذِيَةٌ: فِي دراسَةٍ شَمَلَتْ 320 شَخْصًا يَعْانُونَ السُّمْنَةَ، تَبَيَّنَ أَنَّ 130 شَخْصًا مِنْهُمْ يَرَاجِعُونَ اخْتِصَاصِيَّةِ التَّغْذِيَةِ، وَأَنَّ 147 شَخْصًا يَمْارِسُونَ الرِّيَاضَةَ، وَأَنَّ 64 شَخْصًا يَرَاجِعُونَ اخْتِصَاصِيَّةِ التَّغْذِيَةِ وَيَمْارِسُونَ الرِّيَاضَةَ مَعًا. إِذَا اخْتِيَرَ أَحَدُ هُؤُلَاءِ الأَشْخَاصِ عَشْوَائِيًّا، فَأَجِدُ احْتِمَالَ كُلَّ حَادِثٍ مَمَّا يَأْتِي بِاستِعْمَالِ أَشْكَالٍ قَبْلِ:

18 أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مِمَّنْ يَمْارِسُونَ الرِّيَاضَةَ، وَيَرَاجِعُونَ اخْتِصَاصِيَّةِ التَّغْذِيَةِ.

19 أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مِمَّنْ يَمْارِسُونَ الرِّيَاضَةَ، وَلَا يَرَاجِعُونَ اخْتِصَاصِيَّةِ التَّغْذِيَةِ.

20 أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مِمَّنْ لَا يَمْارِسُونَ الرِّيَاضَةَ، وَلَا يَرَاجِعُونَ اخْتِصَاصِيَّةِ التَّغْذِيَةِ.



صفات وراثية: سألت المعلمةُ الطالباتِ في أحدِ الصفوفِ عَمَّ ترتدي مُنْهَنَ نظارَةً، أَوْ تكتبُ بِيَدِهَا اليسرى، ثُمَّ لَخَصَتِ البِيَاناتِ في شَكْلٍ فِي الْمَجَاوِرِ. إِذَا اخْتَيَرْتَ طَالِبَةً مُنْهَنَ عَشْوَائِيَّاً، فَأَجِدُ كُلَّاً مِنَ الْأَحْتِمَالَاتِ الْأَتِيَّةِ:

21) أَنْ تَكُونَ الطَّالِبَةُ تَرْتَدِي نظارَةً، وَتَكْتُبُ بِيَدِهَا اليسرى.

22) أَنْ تَكُونَ الطَّالِبَةُ تَرْتَدِي نظارَةً، أَوْ تَكْتُبُ بِيَدِهَا اليسرى.

23) أَنْ تَكُونَ الطَّالِبَةُ لَا تَرْتَدِي نظارَةً.


الرَّمْمُ	1	2	3	4	5	6
الْأَحْتِمَالُ	0.2	0.25	0.15	x	0.15	0.1

24) قرصٌ دَائِرِيٌّ مُقَسَّمٌ إِلَى 6 قَطَاعَاتٍ غَيْرِ مُتَطَابِقَةٍ، وَهِيَ مُرَقَّمَةٌ بِالْأَرْقَامِ: 1, 2, 3, 4, 5, 6. إِذَا كَانَ الجُدُولُ الْمَجَاوِرُ يُبَيِّنُ احْتِمَالَ تَوْقِفِ الْمُؤْشِرِ عَنْ كُلِّ رَقْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْقَامِ، فَأَجِدُ قِيمَةَ x .

25) أَحْلُّ الْمَسَأَلَةِ الْوَارِدَةَ بِدَأِيَّةِ الْدَّرْسِ.




مهارات التفكير العليا



تَبَرِيرُ: يُبَيِّنُ مُخَطَّطُ الْأَحْتِمَالِ الْمَجَاوِرِ لِلْفَضَاءِ الْعَيْنِيِّ لِتَجْرِيَّةِ عَشْوَائِيَّةٍ. إِذَا كَانَ الحادِثُ A يُمَثِّلُ النَّقَاطَ الْوَاقِعَةَ عَلَى الْمَسْتَقِيمِ $y = x$ ، وَكَانَ الْحادِثُ B يُمَثِّلُ النَّقَاطَ الْوَاقِعَةَ عَلَى الْمَسْتَقِيمِ $x - 4 = y$ ، فَأَجِبُّ عَنِ السُّؤَالَيْنِ الْأَتَيْيَنِ تَبَاعَّاً:

26) أَمِثِّلُ التَّجْرِيَّةَ بِأَشْكَالٍ فِيْنَ.

27) إِذَا اخْتَيَرْتَ نَقْطَةً عَشْوَائِيَّاً، فَأَجِدُ احْتِمَالَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْمَسْتَقِيمِ $x = y$ ، وَالْمَسْتَقِيمِ $x - 4 = y$ ، مُبِرّراً إِجَابِيَّاً.



تَبَرِيرُ: أَسْتَعْمِلُ شَكْلَ فِيْنَ الْمَجَاوِرِ لِكِتَابَةِ كُلِّ مِنَ الْحَوَادِثِ الْأَتِيَّةِ فِي أَبْسِطِ صُورَةٍ، مُبِرّراً إِجَابِيَّيِّاً:

28) $A \cap B$

29) $A \cup B$

30) $B - A$

31) **مَسَأَلَةٌ مُفْتَوِّحةٌ:** أَصِفُّ 3 حَوَادِثَ مُتَنَافِيَّةٍ وَشَامِلَةٍ فِي تَجْرِيَّةِ عَشْوَائِيَّةٍ.

الدرس 5

الاحتمال الهندسي Geometric Probability


فكرة الدرس



المصطلحات




مسألة اليوم



يُبيّن الشكل المجاور لوحَة إعلاناتٍ مضيئَة على شكل مُربَع أخضر، طولُ ضلعه 3 m، وفي داخلِه مستطيلٌ أزرق، طولُه 2.83 m وعرضُه 1.41 m. إذا كانت اللوحة تضاءُ بآلافٍ من وحداتِ البكسل الصغيرة، ورصَدَتْ وحدةٌ محروقةٌ من هذه الوحدات، فاجد احتمالَ أن تكونَ من وحداتِ اللوح الأزرق.

الاحتمال الهندسي

تعلّمتُ سابقاً أنه إذا كانت التجربة العشوائية متساوية الاحتمال، فإنَّ احتمالَ وقوع أي حدث فيها يساوي نسبة عدد عناصرِ الحادث إلى عدد عناصرِ الفضاء العيني. والآن سأتعلّمُ كيف أجد احتمالَ تجارب عشوائيةٍ ترتبطُ بهذا المفهوم، لكنَّها تتضمَّن مقاييسَ هندسيةً، مثلَ الأطوالِ، والمساحاتِ، والزوايا، وُتُسمَّى الاحتمالات الهندسية (geometric probabilities).



يُبيّن الشكل المجاور القطعة المستقيمة \overline{AB} التي تحوي القطعة المستقيمة \overline{CD} . إذا اختيارت عشوائياً نقطةً من النقاط الواقعَة على \overline{AB} ، ولتكن K ، فإنَّ احتمالَ وقوع على \overline{CD} يساوي نسبة طول \overline{CD} إلى طول \overline{AB} ؛ لأنَّ


جميعَ النقاط الواقعَة على \overline{AB} تمثِّل عناصرَ الفضاء العيني للتجربة العشوائية، وجميعَ النقاط الواقعَة على \overline{CD} تمثِّل عناصرَ الحادث.

$$P(\overline{CD}) = \frac{CD}{AB} \quad (\text{وقوع } K \text{ على } \overline{CD})$$

أتعلّم

يساوي الاحتمال في تجربة اختيارِ النقطة K ؛ لأنَّ فرصةَ الوقوع هي نفسها لأيَّ نقطةٍ تقعُ على \overline{AB} .

مثال 1



معنيداً الشكل المجاور، إذا اختيارت عشوائياً نقطة تقع على \overline{WZ} ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

1. احتمال وقوع النقطة على \overline{YZ} .

أفترض أنّ حادث وقوع النقطة على \overline{YZ} هو A . إذن:

$$P(A) = \frac{YZ}{WZ}$$

صيغة الاحتمال باستعمال الطول

$$= \frac{3}{14}$$

بتعويض $YZ = 3, WZ = 14$

2. احتمال وقوع النقطة على \overline{XY} .

أفترض أنّ حادث وقوع النقطة على \overline{XY} هو B . إذن:

$$P(B) = \frac{XY}{WZ}$$

صيغة الاحتمال باستعمال الطول

$$= \frac{5}{14}$$

بتعويض $XY = 5, WZ = 14$

3. احتمال عدم وقوع النقطة على \overline{XY} .

إنّ حادث عدم وقوع النقطة على \overline{XY} هو الحادث المتمم للحادث B . إذن:

$$P(\overline{B}) = 1 - P(B)$$

صيغة احتمال المتممة

$$= 1 - \frac{XY}{WZ}$$

صيغة الاحتمال باستعمال الطول

$$= 1 - \frac{5}{14}$$


بالتعبير

$$= \frac{9}{14}$$

بالتبسيط

أفكّر

هل يمكن إيجاد احتمال عدم وقوع النقطة على \overline{XY} بطريقة أخرى؟




معنيداً الشكل المجاور، إذا اختيارت عشوائياً نقطة تقع على \overline{RS} ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

(b) احتمال وقوع النقطة على \overline{US} . (a) احتمال وقوع النقطة على \overline{TU} .

(c) احتمال عدم وقوع النقطة على \overline{US} .

الاحتمال الهندسي: المساحات




يُبيّن الشكل المجاورُ المنطقة J التي تحوي المنطقة M . إذا اختيرت عشوائياً نقطةً من النقاط الواقعية في المنطقة J ، ولتكن K ، فإنَّ احتمالَ وقوع K في المنطقة M يساوي نسبةَ مساحةِ المنطقة M إلى مساحةِ المنطقة J ؛ لأنَّ جميعَ النقاطِ في المنطقة J تمثّلُ عناصرَ الفضاءِ العينيِّ للتجربة، وجميعَ النقاطِ في المنطقة M تمثّلُ عناصرَ الحادثِ.

$$P(M) = \frac{\text{مساحة المنطقة } M}{\text{مساحة المنطقة } J}$$

أتعلّم

يتساوى الاحتمالُ في تجربة اختيارِ النقطة K ؛ لأنَّ فرصةَ الوقوع هي نفسُها لأيِّ نقطةٍ تقعُ في المنطقة J .

مثال 2 : من الحياة



لوحةُ أسهمٍ: أطلقَ وليدُ سهماً على لوحةُ الأَسْهَمِ المجاورة. إذا وقعَ السهمُ عشوائياً داخلَ اللوحةِ، فأجِدْ احتمالَ وقوعِ السهمِ في المنطقةِ الحمراءِ.

أفترضُ أنَّ حادثَ وقوعِ السهمِ على المنطقةِ الحمراءِ هو A . إذنْ:

$$P(A) = \frac{\text{مساحة المنطقة الحمراء}}{\text{مساحة لوحة السهام}}$$

صيغةُ الاحتمالِ باستعمالِ المساحةِ

$$= \frac{\pi r^2}{s^2}$$

صيغةُ مساحةِ الدائرةِ، وصيغةُ مساحةِ المُربعِ

$$= \frac{\pi(5)^2}{(40)^2}$$

$$r = 5, s = 40$$


$$\approx 0.05$$

باستعمالِ الآلةِ الحاسبةِ

أتحققُ من فهمي

مُعتمِداً المعلوماتِ المعطاةَ في المثالِ 2، أجِدْ احتمالَ وقوعِ السهمِ في المنطقةِ الصفراءِ.

الاحتمال الهندسي: الزوايا




إذا دُورَ المؤشرُ في القرص المجاورِ عشوائياً، فإنَّ احتمالَ توقفِ المؤشرِ عندَ القطاعِ الأخضرِ يساوي نسبةَ قياسِ زاويةِ القطاعِ الأخضرِ إلى مجموعِ الزوايا حولَ مركزِ الدائرة؛ لأنَّ جميعَ النقاطِ في الدائرةِ تمثلُ عناصرَ الفضاءِ العينيِّ للتجربةِ، وجميعَ النقاطِ في القطاعِ الأخضرِ تمثلُ عناصرَ الحادثِ.

$$P(\text{زاوية القطاع الأخضر}) = \frac{\text{زاوية القطاع الأخضر}}{\text{مجموع الزوايا حول مركز الدائرة}}$$

أتعلَّم

يتساوى الاحتمالُ في تجربةِ توقفِ المؤشرِ عندَ أيِّ نقطةٍ في الدائرة؛ لأنَّ فرصةَ الوجودِ هي نفسُها لأيِّ نقطةٍ يتوقفُ عندَ المؤشرِ.

مثال 3



معنيداً زوايا القطاعاتِ الظاهرةَ على القرصِ المجاورِ، أجدُ كُلَّا ممَّا يأتي بعدَ تدويرِ مؤشرِ القرصِ:

1 احتمالُ توقفِ مؤشرِ القرصِ عندَ القطاعِ الأصفرِ.

افتراضُ أنَّ حادثَ توقفِ المؤشرِ عندَ القطاعِ الأصفرِ هو A . إذنُ:

$$P(A) = \frac{\text{زاوية القطاع الأصفر}}{\text{مجموع الزوايا حول مركز الدائرة}}$$

$$= \frac{140^\circ}{360^\circ}$$

$$= \frac{7}{18}$$

صيغةُ الاحتمالِ باستعمالِ الزوايا
بالتعويض
بالتبسيط

2 احتمالُ توقفِ مؤشرِ القرصِ عندَ القطاعِ الأزرقِ أوِ القطاعِ الأحمرِ.

افتراضُ أنَّ حادثَ توقفِ المؤشرِ عندَ القطاعِ الأزرقِ أوِ القطاعِ الأحمرِ هو B . إذنُ:

$$P(B) = \frac{\text{مجموع زاويتي القطاعين الأزرقِ والأحمرِ}}{\text{مجموع الزوايا حول مركز الدائرة}}$$


$$= \frac{60^\circ + 52^\circ}{360^\circ}$$

$$= \frac{112^\circ}{360^\circ} = \frac{14}{45}$$

صيغةُ الاحتمالِ باستعمالِ الزوايا
بالتعويض
بالتبسيط

الوحدة 8

أتحقق من فهمي



معتمدًا زوايا القطاعات الظاهرة على القرص المجاور، أجد كلاً مما يأتي بعد تدوير مؤشر القرص:

- (a) احتمال توقف مؤشر القرص عند القطاع الأزرق.
 (b) احتمال توقف مؤشر القرص عند القطاع الأصفر أو القطاع الأحمر.

أذكّر

في الاحتمال، يدل حرف العطف (أو) على الاتحاد.

أدرّب وأحل المسائل



معتمدًا الشكل المجاور، إذا اختيارت عشوائياً نقطة تقع على \overline{WZ} ، فأجد كلاً مما يأتي:

2 احتمال وقوع النقطة على \overline{XY} .


1 احتمال وقوع النقطة على \overline{XZ} .

4 احتمال وقوع النقطة على \overline{WY} .

3 احتمال وقوع النقطة على \overline{WX} أو \overline{YZ} .

5 احتمال عدم وقوع النقطة على \overline{XY} .

معتمدًا الشكل الآتي، إذا اختيارت عشوائياً نقطة تقع على \overline{RS} ، فأجد كلاً مما يأتي:




7 احتمال وقوع النقطة على \overline{TS} .

6 احتمال وقوع النقطة على \overline{RT} .

9 احتمال وقوع النقطة على \overline{UR} .

8 احتمال وقوع النقطة على \overline{RT} أو \overline{US} .

10 احتمال عدم وقوع النقطة على UR .









لوحة أسمٍ: أطلقت دلٌّل سهٰماً على لوحة الأسمٍ المجاورة. إذا وقٰع السهٰم عشوائياً


داخل اللوحة، فأجٰد كُلًّا من الاحتمالات الآتية:

- 11. وقٰع السهٰم على المنطقٍ الحمراء.
- 12. وقٰع السهٰم على المنطقٍ الصفراء.
- 13. عدم وقٰع السهٰم على المنطقٍ الزرقاء.
- 14. وقٰع السهٰم على المنطقٍ الخضراء أو المنطقٍ الصفراء.

إذا اختيرت نقطة عشوائياً من كل شكلٍ من الأشكال الآتية، فأجٰد احتمال وقٰعها في المنطقٍ المظللة باللون الأزرق:



الوحدة 8



معتمداً زوايا القطاعات الظاهرة على القرص المجاور، أجد كلاً ممّا يأتي بعد تدوير مؤشر القرص:

احتمال توقف مؤشر القرص عند القطاع البنفسجي. 21

احتمال توقف مؤشر القرص عند القطاع الأصفر أو القطاع الأخضر. 22


احتمال عدم توقف مؤشر القرص عند القطاع الأحمر. 23

أحل المسألة الواردة بداية الدرس. 24

مهارات التفكير العليا


تبرير: إذا كانت \overline{BZ} تحوي \overline{MN} ، وكان $20 = BZ$ ، واختيرت نقطة عشوائياً على \overline{BZ} ، وكان احتمال وقوعها على \overline{MN} هو 0.3، فأجد طول \overline{MN} ، مبرراً إجابتي. 25

تبرير: في المستوى الإحداثي الآتي، إذا اختير الزوج المرتب (x, y) عشوائياً، حيث $-5 \leq x \leq 5$ ، $-5 \leq y \leq 5$ ، فأجد احتمالاً يقع الزوج المرتب في أيٍ من المثلث، والدائرة، ومتوازي الأضلاع، مبرراً إجابتي. 26



مسألة مفتوحة: معتمداً \overline{AE} ، أصف حادثاً احتماله أكبر من $\frac{1}{2}$ (أكتب ثلاثة حلول ممكنة). 27

اختبار نهاية الوحدة



أطلق سهم على لوحة الأسماء المجاورة. إذا وقع السهم عشوائياً داخل اللوحة، فإن احتمال وقوعه على المنطقة الصفراء هو:

a) $\frac{\pi}{36}$

b) $\frac{\pi}{12}$

c) $\frac{\pi}{9}$

d) $\frac{\pi}{4}$

يُبيّن الجدول الآتي قياسات أحذية لمجموعة من الطلبة:

المقاس	33	34	35	36	37	38	39
التكرار	1	3	8	14	6	2	1

أجدُ تباينَ قياساتِ الأحذية.

أجدُ الانحرافَ المعياريَّ لقياساتِ الأحذية.

حولَتْ مجموعةً منَ البياناتِ، عدُّها 50، باستعمالِ العلاقة: $y = x - 70$ ، حيثُ y المشاهدةُ بعدَ التحويل، و x المشاهدةُ قبلَ التحويل. إذا كانَ:

$\sum y = -135$, $\sum y^2 = 2567$

الوسطُ الحسابيُّ للمشاهداتِ قبلَ التحويل.

الانحرافُ المعياريُّ للمشاهداتِ قبلَ التحويل.

أختارُ رمزَ الإجابةِ الصحيحةِ لكلَّ ممَّا يأتي:

1 تباعُنُ مجموعةِ البياناتِ الآتية مُقرَّباً إلى أقربِ متزلاً عشريةٍ هو:

11, 13, 14, 16, 18

a) 5.8

b) 2.4

c) 14.4

d) 3.8

استُعِيمَتِ العلاقة: $15 - 2x = y$ لتعديلِ مجموعةِ منَ البياناتِ. إذا كانَ الانحرافُ المعياريُّ للبياناتِ قبلَ التحويلِ هو 3، فإنَّ الانحرافَ المعياريَّ للبياناتِ بعدَ التحويلِ هو:


a) -9

b) 21

c) 3

d) 6

3 الحادثُ A والحادثُ C في شكلِ قِنِّ الآتي هما:



(a) حادثانِ شاملانِ.

(b) حادثانِ متنافيانِ.

(c) حادثانِ متنافيانِ وشاملانِ.

(d) حادثانِ متقاطعانِ.

اختبار نهاية الوحدة



في مجموعةٍ تضمُّ 25 شخصاً منْ متسبيِ أحدِ النوادي الرياضية، كانَ 13 شخصاً منْهُمْ يمارسونَ لعبةَ كرةِ السَّلَةِ، و 11 شخصاً يمارسونَ لعبةَ كرةِ القدمِ، و 6 أشخاصٍ يمارسونَ لعبةَ كرةِ السَّلَةِ وَلعبةَ كرةِ القدمِ معاً. إذا اخترتِ شخصاً منْهُمْ عشوائياً، فأجُد احتمالَ كُلِّ منَ الحوادثِ الآتيةِ باستعمالِ أشكالِ فنٍ:

15. أنْ يكونَ الشخصُ ممَّنْ يمارسونَ لعبةَ كرةِ السَّلَةِ أوَّلَ لعبةَ كرةِ القدمِ.

16. أنْ يكونَ الشخصُ ممَّنْ يمارسونَ لعبةَ كرةِ القدمِ، ولا يمارسونَ لعبةَ كرةِ السَّلَةِ.

17. أنْ يكونَ الشخصُ ممَّنْ لا يمارسونَ لعبةَ كرةِ السَّلَةِ، ولا يمارسونَ لعبةَ كرةِ القدمِ.

إذا اخترتِ نقطةً عشوائياً منْ كُلِّ شكلٍ منَ الشكلينِ الآتَيْنِ، فأجُد احتمالَ وقوعِها في المنطقةِ المُظلَلةِ باللونِ الأزرقِ.



في ما يأتي أسعارُ مجموعَةٍ منَ السياراتِ المستعملَةِ بالدينارِ:

2590 2650 2650 2790 2850 2925

3090 3125 3125 3420 3595 3740

3750 3920 3945 4050 4150 4200

9

أُمِّلِي البياناتِ باستعمالِ مُدْرَجٍ تكراريٍّ ذي فئاتٍ مُتساويةِ الطولِ.

10

أكُتبُ وصفاً للبياناتِ.

النكرار	عددُ الجرائدِ
4	81 – 85
5	86 – 90
4	91 – 95
2	96 – 100
15	المجموع

يُبيِّنُ الجدولُ الآتِي توزيعاً لعددِ الجرائدِ المَبَيعَةِ في إحدى المكتباتِ خلالَ 15 يوماً:

11

أُقْدِرُ الوسْطُ الحسابيُّ للبياناتِ.

12

أُقْدِرُ منوالُ البياناتِ.

13

أُحدِدُ الفترةُ التي يقعُ فيها وسيطُ البياناتِ.


يُبيِّنُ الجدولُ التكراريُّ التالي كمِيَّةَ الماءِ (باللترِ) التي استهلكَتْها مجموعَةٍ منَ الأشخاصِ في أحدِ الأيامِ. أُمِّلِي البياناتِ باستعمالِ المُدْرَجِ التكراريِّ.

14

النكرار	كمِيَّةُ الماءِ (L)
45	$75 \leq s < 125$
50	$125 \leq s < 150$
70	$150 \leq s < 175$
90	$175 \leq s < 225$
45	$225 \leq s < 300$

اختبارٌ نهايةِ الوحدة

معتمدًا الشكل الآتي، إذا اخترت عشوائيًّا نقطةً تقع على \overline{GJ} ، فأجد كُلًا مما يلي:




26. احتمال وقوع النقطة على \overline{HP} .

27. احتمال وقوع النقطة على \overline{GP} .

28. احتمال وقوع النقطة على \overline{HJ} .

تدريبٌ على الاختباراتِ الدولية

يُبيّن المُدرَج التكراريُّ الآتي الزمانَ (بالدقائقِ) الذي استغرقهُ عددُ من المرضى في الانتظارِ قبل دخولِهِم عندَ طبِّيِّ الأسنانِ خلالَ أسبوعٍ:



29. أجد عددَ المرضى الذين انتظروا أكثرَ من 30 دقيقةً قبل الدخولِ عندَ الطبِّيِّ.

30. أجد عددَ المرضى الذين انتظروا من 10 دقائقَ إلى 40 دقيقةً قبل الدخولِ عندَ الطبِّيِّ.

قيسْتُ أطوالُ 8 أشخاصٍ بوحدةِ السنتيمترِ، وكانت النتائجُ كالآتي:


165 170 190 180
175 185 176 184

31. أجدُ تباينَ أطوالِ الأشخاصِ الثمانيةِ.


32. أجدُ الانحرافَ المعياريًّا لأطوالِ الأشخاصِ الثمانيةِ.

أُنشِئُ جدولًا تكراريًّا لكُلُّ مُدرَجٍ تكراريًّا ممَّا يأتي:


20



21



كُبِيَّتِ الأعدادُ الصحيحةُ من 1 إلى 6 على مجموعَةِ من البطاقاتِ المُطابِقةِ، ثمَّ اخْتَيَرْتُ بطاقةً عشوائيًّا، ومُثُلَّ الفضاءُ العيِّنيُّ لهذهِ التجربةِ العشوائيةِ التي تحوي الحادفين X و Y في شكلِ قُلْبٍ الآتيِّ. أجدُ كُلًا منَ الاحتمالاتِ الآتيةِ:



22. $P(X \cap Y)$

23. $P(X \cup Y)$

24. $P(\overline{X \cup Y})$

25. $P(X - Y)$